

婦人

三錫曰婦人性多偏執陰陰以故病百倍于男子且難治大都與男子同惟經血常下胎產乳鬱差異今採輯諸名家條分如左

經水

月經古人命名月水以月盈則缺血海盈則下理可見矣然陰陽和平則應時氣血乖戾則改度故曰血者氣之配隨氣而行先期而行者氣之熱也法當清之四物加炒苓連梔子生地牡

此亦言其大段耳。先期亦有虛寒。後期亦有熱。壅要在變通。察脈不可拘泥。

丹皮系附之類。後期而行者。血不足也。法當補之。八珍之類。將行而痛者。氣之滯也。當疎氣和血。芎歸益母。玄胡索。五靈脂。青陳皮。烏藥。蓬朮。肉桂。炮薑之類。來後作痛者。氣血俱虛也。色淡不屬虛。八珍四物選用。錯經妄行者。氣之亂也。宜調其氣。紫者氣之熱也。黑者熱之甚。宜涼血和氣。四物加系附。赤芍。紫胡。炒蒼朮之類。大抵經水將畢。或正行之際。真氣方虧。切忌破氣。尅伐。雖有他證。從輕而治。乃可。如冒寒有表。

邪。補中湯加表藥。

肥盛婦。痰多。經水不調。須兼燥濕化痰。二陳海

石。二朮。芎歸。赤附等丸藥。

瘦弱人。身俸熱。或潮熱。經水或前或後。且多。屬

血熱。四物。生地。牡丹皮。黃芩。梔子。赤附。及四製

赤附丸。

將行作痛。抑氣丸效。四物加玄胡。牡丹皮。陳皮

赤附。有火加條芩。作丸服。經後作痛。為虛熱。四

物加白朮。炒黃柏。赤附。

交加地黄丸

生地 老薑 各一斤 玄胡索 當歸 川芎

芍藥 各二兩 沒藥 配木香 各一兩 桃仁 去皮 人參

各兩 香附 兩半

右為末先以生薑汁浸地黄查以地黄汁浸
生薑查晒乾皆以汁盡為度共十一味作
一處晒乾研為末醋糊丸空心

薑湯下

大抵經病肝脾血燥。四物為主。肝脾血虛補中

補中恐于血虛未
當

益氣為主。肝脾鬱結。歸脾湯為主。肝經怒火。加
味道遙散為主。

脾虛有脾胃受虧。面色痿黃。四肢怠墮。右寸關
脈弦滑無力。是食少不能生化氣血。血不盈氣。此有與陽
閉宜補中益氣。開胃進食。脾胃和而飲食進。久
之。經自行矣。

軀脂滿閉。脈沉伏。惡心。食少。肉多。色白。人虛痰多。
占住血海。所生之血亦少。宜化痰燥脾。升柴二
朮。二陳。導痰。越鞠。各加芎歸。選用。不可用地黃。

鬱悒。脉弦数。身熱潮作痛。兩脇脹。屬鬱悒。肝燥。
宜平肝氣。養肝血。是肝燥而不行也。四物加參。
附柏子仁。知母。青皮之類。

不肥不瘦。兩手俱細弱。身熱倦怠。屬氣血兩虛。

八珍湯主之

胃火胃中伏火。消穀善飢。形俸漸瘦。脉數疾。屬

此證脈多

胃燥不能生血。宜瀉火養胃。兼生血潤燥。即東

垣二論之一。是中焦源竭也。

往往有心煩驚悸。月事不來。久之微見五滴。此時當急補肝脾。扶養胃氣。兼升舉之。預防崩中。如投疏利寒涼。土敗防潰。速之崩矣。既崩猶禁參苓。木茂附。徒議止血。血必不止。即枯澁暫止。必成腫隔。腹脹不可追。

勞心有心勞太過。心血耗散。火動于中心。煩驚悸。月事不來。宜安心補血降火。相子養心丸。或補心丹。四物加麥冬。相子仁之類。內經曰。月事不來者。胞脉閉也。胞脉者。属于心。而絡于胞中。準。經。作。今。氣。上。迫。肺。有所勞心。心火亢盛。心氣不得下通。故經閉。宜先服降火之藥。次服五補丸。及衛生湯。治脾養血并屬上焦。陰虛火盛。脉弦數。空心服六味地黃丸。妙甚。大便秘結。小便雖清不利。而經水閉絕不行。右

尺脉洪數。乃下焦血海乾枯。宜調血潤燥。瀉胞
絡中大邪。經自行矣。四物紅花桃仁派二白。
母黃柏牛膝作湯。日一服。屬下焦。

月水閉而飲食形容如故。或惡心阻隔。而尺有
力是胎。即方書所謂病^有而無邪脉。此孕非病。所
以不月是也。

血枯經閉。多身板身痛。脉必澀數。肌膚乾燥不
澤。內無嘔脹。四物加桃仁紅花。脉弦細。陰虛經
脉不通。小便短澀。四物加蒼^{xy}朮牛膝陳皮甘草。

作湯。又用蒼莎丸。加蒼耳酒芍藥為丸。就煎煎
藥吞下。

行經之際。浣濯入冷。或食冷物。熱血得寒。凝滯
血海中。每行經時。腹痛不可忍。宜芎歸玄胡索

五靈脂蓬朮。色附炮薑肉桂。逐去惡紫血為佳。
此兼肺病故用。補中益氣加味。

悲哭思想太甚。月水不來。宜舒鬱益氣。補中益
氣湯。加青皮貝母香附。

大病後經閉。房虛宜補脾養血。元氣復自通。

小腹有塊作痛。時白物下。經水不通。是血瘕。宜

逐瘀流氣。

丹溪方治過期不行。杜牛膝搗汁大半碗入玄胡末一銖。考附子殼末各半銖。空心湯調下。必腰腹痛方是汚血。

汚血在血海必痛。且有形。實者可通。虛者慎之。多鬱胸人。心下脹滿不食。經事不調。身痛潮熱。漸變骨蒸。不食。忽寒忽熱。耳下結核。癰瘰。馬刀。形容枯槁。脉弦數。或細。或瀼。或沉結。久之變成瘵。益氣養榮湯神妙。方出立齋心法。多服自效。

乃屢驗者

馬刀小蜆也圓者為瘰癧長者為馬刀皆少陽經鬱結所致久成瘰癧

經水過期瘦人責之血少四物加紅花益母子

肥人過期責于氣虛有痰三君子加芎歸

過期紫色有塊血熱也四物加牡丹皮炒黃連

色附

脉數而弦細倦怠日漸羸弱潮熱月水不通房

陰虛血少陽火旺火逼水涸當養血益陰慎勿

以毒藥通之柏子仁丸澤蘭湯炒

柏子仁研炒牛膝酒拌卷柏各半澤蘭葉

續斷丸或熟地用生者三兩忌鐵飲汪燕搗膏

右為末入地黃膏加寧丸桐子大每服三十

丸空心米飲下

澤蘭湯 治同前

澤蘭煎當歸酒芍藥炒各一兩甘草五錢

右為粗末每服五錢水二鍾煎至一鍾去渣

溫服

逍遙散用歸芍白朮白茯苓甘草柴胡乃清肝和血之劑婦人肝經血分中有風有火妙品口燥

咽乾骨熱盜汗少皮膚搔痒小便澀滯悉皆
治之加丹皮梔子更佳。

四物湯 月事不調此方為主而變通之

當歸

酒洗

白芍

酒炒

川芎

熟地

吳崑醫方考曰無極之真二五之精妙合而凝
乾道成男坤道成女女以坤道用事故治婦人
者以陰為主方其二七天癸至月事以時下者
女得坤之陰陰中必有陽故以七為紀一七而
齒二七而天癸至也人受天地之氣以生故能

克肖天地月天之陰也以月而盈以月而虧故
女子之血亦以三十日而一下也血之下也同
于月故曰月事經曰月事以時下故能有子是
以月事不調宜此方為主治隨其寒熱虛實而
斟酌加減使月事調勻則陰陽和而萬物生有
子之道也是方也當歸芍藥地黃皆味厚之品
味厚為陰中之陰故能益血析而論之當歸辛
溫能活血芍藥酸寒能斂血熟地甘濡能補血
又曰當歸入心脾芍藥入肝熟地入腎乃川芎

者輒上輒下而行血中之氣者也此四物湯所以為婦人調經之要藥

脉數血色紫黑為血熱本方加炒岑連 脉遲
腹痛血凝滯為寒加肉桂炮薑重者加附子
体厚有痰加導痰湯減地黃 瘦黑有火加炒
山梔黃柏知母牡丹皮有悒鬱者加香附蒼朮
砂仁神曲 有留滯者加桃仁紅花玄胡索肉
桂 氣虛者參耆來少色淡 氣實者加青皮
枳朴來澁而痛然六有不宜者又不可拘泥氣

息機微。脉弱汗多者。忌川芎。恐其辛散也。大便
澹泄。忌膏歸。恐其濡滑。益增下注也。脉遲腹痛。
不宜芍藥。恐其酸寒。益增中冷也。病後新產。更
忌腦膈痞塞。不宜地恐其黏膩。益增泥滯也。若
明安解之。昧其誤矣。

五補丸 補諸虛安五臟堅骨髓養精神

熟地 人參 牛膝 酒浸 白朮 地骨皮
去蘆

各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服三十丸溫酒

下

。衛生湯

當歸

白芍

各二兩

黃芪

三兩

甘草

二兩

右為粗末每服五錢水二盞半煎一盞空心

服氣虛倦怠加人參一兩

血枯經閉指血少腸胃枯燥者而言故東垣分

三焦治悉以瀉火補血為主上焦得之勞心治

以三和謂四物涼膈當歸是也

以消穀善飢屬胃燥治主中焦用調胃承氣湯