

包氏醫宗

第一集第二卷

傷寒方法



經方歌括序

前人有曰。傷寒雜病論之方。乃古聖人所作。仲聖述之。後人尊之。曰經方。又曰經方能統治百病。不獨治傷寒也。愚謂其述在傷寒雜病論中。主治各症。立個方綱而已。至若互相通用。統治百病。至廣大而精微。雖曰神而明之。存乎其人。而考其論。未嘗不顯。但先師嘗舉一隅則不復也。爲學者則必知此識彼。乃可用其方也。按其方貳百伍拾有伍。皆變化無窮。先師祇撮其要。而論法卻有不同。如桂枝湯。層層襯出。乃盡其神。故自太陽中風論至婦人妊娠。及產後風止。凡貳拾叁條。如桂枝加葛根湯。寥寥數語。撮盡其神。故以太陽病。項背強几几。反汗出惡風。論只壹條。須知先師立言。多者非重。少者不闕也。苟學者能以餘方倣此。參透諸方之神。而互相通用。統治百病之道。卽在其中矣。惜夫後世之醫。不知此理。以先師之方。祇治傷寒。不治

他病。于是知音者寡。其道遂泯傳焉。故自晉唐而起。另開分類之書。按症索方。呆規相授。學之頗易。爲醫者日多。而醫方日盛。遂有八家。劉張朱李王薛李喻之方。與夫俗撰之藥。彙訂百種。雜出其間。偶得見效。各逞其神。竟不知其呆法誤人。雷同共弊。並未聞及先師活法。如何施用也。夫舉世昏迷。皆趨前轍。每臨場默想。如對症即投。不揣症源。專依方註。或不奏效。轉念他書。索盡萬方。難瘳一疾。其呆法流弊。又如如是也。至陳氏始貶其非。而獨遵傷寒雜病論之方。名曰經方。別晉唐以後之方爲時方。又其次也。爲俗方。又謂俗方卽是從時方套出。而時方又從經方套來。蓋前人所謂先師之書。爲衆方之祖。誠不謬也。由此觀之。業醫道者。豈可不尙經方乎。但其藥品兩數。製煮服次等規。稍錯釐毫。卽差千里。故陳氏作經方歌括。令人易記誦也。其未切方名。讀有忘題之弊。今以方名裁作首句。原其平仄。或七言。

或五言。而歌步題韻之。其藥有多寡。而法有簡繁。長短不拘。幾韻。總以撮盡方規爲要也。此歌淺白。閱者易知。列碼書頭。原其次第。若經已明。而後讀此。施用之法。則庶乎其不差矣。是爲序。

光緒戊子歲仲秋月閩杭包育華桃初氏作於劍津仁壽官舍西
牕軒



中國大學圖書館藏

傷寒方法目錄方歌同

〔壹〕桂枝湯成氏曰此湯名即陽旦湯別

〔叁〕桂枝加附子湯

〔伍〕桂枝去芍藥加附子湯

〔柒〕桂枝二麻黃一湯

〔玖〕桂枝二越婢一湯

〔拾壹〕甘草乾薑湯

〔拾叁〕調胃承氣湯

〔拾伍〕葛根湯

〔拾柒〕葛根黃芩黃連湯

〔拾玖〕大青龍湯

〔貳拾壹〕桂枝加厚樸杏仁湯

〔貳拾叁〕新加湯

〔貳拾伍〕桂枝甘草湯

〔貳拾柒〕厚樸生薑半夏人蔘湯

〔貳〕桂枝加葛根湯

〔肆〕桂枝去芍藥湯

〔陸〕桂枝麻黃各半湯

〔捌〕白虎加人蔘湯

〔拾〕桂枝去桂加茯苓白朮湯

〔拾貳〕芍藥甘草湯

〔拾肆〕四逆湯

〔拾陸〕葛根加半夏湯

〔拾捌〕麻黃湯

〔貳拾〕小青龍湯

〔貳拾貳〕乾薑附子湯

〔貳拾肆〕麻黃杏仁甘草石膏湯

〔貳拾陸〕茯苓桂枝甘草大棗湯

〔貳拾捌〕茯苓桂枝白朮甘草湯



〔貳拾玖〕芎藥甘草附子湯

〔叁拾壹〕五苓散

〔叁拾叁〕梔子豉湯

〔叁拾伍〕梔子生薑豉湯

〔叁拾柒〕梔子乾薑湯

〔叁拾玖〕小柴胡湯

〔肆拾壹〕大柴胡湯

〔肆拾叁〕桃仁承氣湯

〔肆拾伍〕救逆湯

〔肆拾柒〕桂枝甘草龍骨牡蠣湯

〔肆拾玖〕抵當丸

〔伍拾壹〕大陷胸湯

〔伍拾叁〕文蛤散

〔伍拾伍〕柴胡桂枝湯

〔伍拾柒〕半夏瀉心湯

〔叁拾〕茯苓四逆湯

〔叁拾貳〕茯苓甘草湯

〔叁拾肆〕梔子甘草豉湯

〔叁拾陸〕梔子厚樸湯

〔叁拾捌〕真武湯

〔肆拾〕小建中湯

〔肆拾貳〕柴胡加芒硝湯

〔肆拾肆〕柴胡龍骨牡蠣湯

〔肆拾陸〕桂枝加桂湯

〔肆拾捌〕抵當湯

〔伍拾〕大陷胸丸

〔伍拾貳〕小陷胸湯

〔伍拾肆〕白散

〔伍拾陸〕柴胡桂枝乾薑湯

〔伍拾捌〕十棗湯



〔伍拾玖〕大黃黃連瀉心湯

〔陸拾壹〕生薑瀉心湯

〔陸拾叁〕赤石脂禹餘糧湯

〔陸拾伍〕桂枝人蔘湯

〔陸拾柒〕黃芩湯

〔陸拾玖〕黃連湯

〔柒拾壹〕桂枝附子去桂枝加白朮湯

〔柒拾叁〕白虎湯

〔柒拾伍〕大承氣湯

〔柒拾柒〕猪苓湯

〔柒拾玖〕茵陳蒿湯

〔捌拾壹〕梔子蘘皮湯

〔捌拾叁〕桂枝加芍藥湯

〔捌拾伍〕麻黃附子細辛湯

〔捌拾柒〕黃連阿膠湯

〔陸拾〕附子瀉心湯

〔陸拾貳〕甘草瀉心湯

〔陸拾肆〕旋覆代赭石湯

〔陸拾陸〕瓜蒂散

〔陸拾捌〕黃芩加半夏生薑湯

〔柒拾〕桂枝附子湯

〔柒拾貳〕甘草附子湯

〔柒拾肆〕炙甘草湯

〔柒拾陸〕小承氣湯

〔柒拾捌〕蜜煎導方附猪膽汁及土瓜根


〔捌拾〕麻仁丸

〔捌拾貳〕麻黃連軹赤小豆湯

〔捌拾肆〕桂枝加大黃湯

〔捌拾陸〕麻黃附子甘草湯

〔捌拾捌〕附子湯



〔捌拾玖〕桃花湯

〔玖拾壹〕猪膚湯

〔玖拾叁〕桔梗湯

〔玖拾伍〕半夏散及湯

〔玖拾柒〕白通加猪膽汁湯

〔玖拾玖〕四逆散

〔百零壹〕當歸四逆湯

〔百零叁〕麻黃升麻湯

〔百零伍〕白頭翁湯

〔百零柒〕理中丸

〔百零玖〕燒棍散

〔百拾壹〕牡蠣澤瀉散

附加 小青龍湯 真武湯

減權 四逆散 理中湯 枳實梔子鼓湯 白散 通脈四逆湯

量歌 歌 古大升歌 古劑歌 枚數歌 古稱歌 古方升

〔玖拾〕吳茱萸湯

〔玖拾貳〕甘草湯

〔玖拾肆〕苦酒湯

〔玖拾陸〕白通湯

〔玖拾捌〕通脈四逆湯

〔壹百〕烏梅丸

〔百零貳〕當歸四逆加吳茱萸黃蘗湯

〔百零肆〕乾薑黃連黃芩人蔞湯

〔百零陸〕四逆加人蔞湯

〔百零捌〕通脈四逆加猪膽汁湯

〔百零拾〕枳實梔子鼓湯

〔百拾貳〕竹葉石膏湯

〔百拾肆〕小柴胡湯 白散 通脈四逆湯

〔百拾陸〕枳實梔子鼓湯 古稱歌 古方升

〔百拾捌〕枚數歌



南京中醫藥大學圖書館藏 版權所有

傷寒方法 附經方歌括上

閩杭包育華桃初氏著

同學胞兄 鑑銘育陞

德輝

授男

德逮名一虛號識生

長孫楨孚號天白

德彰號仰山

德嘉名一琪號謙谷

全校

授姪

德崇

姪孫介孚號劍夫

德瓊



包煥輝

藍佳葵

俞漢基星五

劉廷俊杏邨

劉廷翰溥川

雷樹型典如

鄒獻玖珮琚

曾在田利人

門人

合參



南京中醫藥大學圖書館藏

仲景全書方法

閩杭包育華桃初氏編

傷寒論原方

計一百一十有方

男識生參校

太陽篇

孫天白校字

「壹」桂枝湯方

桂枝 三兩 去皮

芍藥 三兩

甘草 二兩 炙

大棗 十二枚 擘

生薑 三兩 切

右五味咬咀。以水柒升。微火煮取叁升。去滓適寒溫。服一升。服已。須臾。歠熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆令一時許。遍身縻縻微似有汗者益佳。不可令如水淋漓。病必不除。若一服汗出病瘥。停後服。不必盡劑。若不汗。更服依前法。又不汗。後服小促役其間。半日許。令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。服一劑盡。病症猶在者。更作服。若汗不出者。乃服至二三劑。禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物。



〔貳〕桂枝加葛根湯

卽桂枝湯原方加葛根

四兩

右六味。以水七升。內諸藥。煮取三升去滓。溫服一升。不須飲粥。

餘如桂枝湯法。將息及禁忌。

〔叁〕桂枝加附子湯

卽桂枝湯原方加附子

炮一枚

〔肆〕桂枝去芍藥湯

卽桂枝湯原方去芍藥。

〔伍〕桂枝去芍藥加附子湯

卽桂枝湯原方去芍藥加附子

炮一枚

右五味。㕮咀。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。惡寒止。停後服。

〔陸〕桂枝麻黃各半湯

卽桂枝湯麻黃湯各分壹壺悉合各半之數



桂枝 六兩十銖

芍藥 一兩

生薑 一兩切

甘草 一兩炙

麻黃 一兩去節

大棗 四枚擘

杏仁 二十四枚湯浸去皮尖及雙仁者後做此

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取一升。八合。去滓。溫服六合。

〔柴〕

桂枝二麻黃一湯 此方分兩依成氏本照數推之即是桂枝湯肆成貳麻黃湯貳成壹但麻桂草俱多壹銖杏仁亦多壹枚

桂枝 一兩十七銖去皮

芍藥 一兩六銖

麻黃 一兩六銖去節

生薑 一兩六銖

甘草 一兩二銖炙

大棗 五枚

杏仁 十六枚去皮尖

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。日再服。

〔捌〕

白虎加人蔘湯

知母 六兩

石膏 一劫碎棉裹

甘草 二兩炙

杭米 六合

人蔘 三兩

右五味。以水一斗。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三服。



〔玖〕桂枝二越婢一湯

此方一分兩依成氏本生薑少壹枝湯肆分壹越婢湯八分一按數核之惟生薑少壹枝湯肆分壹越婢湯

桂枝十八銖
去皮

芍藥十八銖

麻黃十八銖
去節

甘草十八銖
炙

大棗四枚

生姜二銖兩

石膏二十兩
碎綿裹

右七味咬咀。以水五升。煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。本方當裁為越婢湯。桂枝湯合飲一升。今合

為一方。桂枝二。越婢一。

〔拾〕桂枝去桂加茯苓白朮湯

芍藥三兩

甘草二兩
炙

生姜三兩

茯苓三兩
切

白朮三兩
切

大棗十二枚

右六味咬咀。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。小便利則愈。

〔拾壹〕甘草乾薑湯

甘草四兩
炙

乾薑二兩
炮



右㕮咀。以水三升。煮取一升五合。去滓分溫再服。

〔拾貳〕芍藥甘草湯

芍藥 四兩

甘草 四兩

右二味㕮咀。以水三升。煮取一升五合。去滓分溫再服之。

〔拾叁〕調胃承氣湯

大黃 四兩 酒浸 去皮

甘草 二兩

芒硝 半升

右三味㕮咀。以水三升。煮取一升。去滓。內芒硝。更上火微煮令

沸。少少溫服之。

〔拾肆〕四逆湯

甘草 二兩

乾薑 半兩

附子 一枚 生用 去皮切八片

右三味㕮咀。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人可

大附子一枚。乾薑三兩。



〔拾伍〕葛根湯

葛根 四兩

麻黃 三兩 去節

甘草 二兩 炙

芍藥 二兩 切

桂枝 二兩 去皮

生薑 三兩 切

大棗 十二枚 擘

右七味。咬咀。以水一斗。先煮葛根麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不須歎粥。餘如桂枝湯將息及禁忌。

〔拾陸〕葛根加半夏湯

即葛根湯原方加半夏 半升 洗

〔拾柒〕葛根黃芩黃連湯

葛根 半觔

甘草 二兩 炙

黃芩 三兩

黃連 三兩

右四味。以水八升。先煮葛根。減二升。內諸藥。煮取二升。去滓。分溫再服。



〔拾捌〕麻黃湯

麻黃 三兩
去餘

桂枝 二兩
去皮

甘草 一兩
炙

杏仁 七十枚
去皮尖

右四味。以水九升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服八合。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝湯法。將息及禁忌。

〔拾玖〕大青龍湯

麻黃 六兩
去節

桂枝 二兩
去皮

甘草 二兩
炙

杏仁 五十枚
去皮尖

生薑 三兩
切

大棗 十二枚

石膏 如鷄子
大碎

右七味。以水九升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。取微似汗。汗出多者。溫粉撲之。一服汗者。停後服。汗多亡陽遂虛。惡風煩躁。不得眠也。

〔貳拾〕小青龍湯

