

· 内部资料 ·
· 注意保存 ·

广 东 省

梅 县 地 面 气 候 资 料

1961—1970

广 东 省 气 象 台

梅 县 地 面 气 候 资 料

統 計 項 目

一、测站位置及观测时间

年 代	北 纬	东 经	海拔高度(米)		详 细 地 址	年 代	观 测 时 间 (北京时)	夜 间 守 班 否
			观测场	气压表				
1961—1970	24° 18'	116° 07'	77.5	78.4	梅县城郊公社梅江大队大坪上“乡村”	1961—1970	2.8.14.20	守
”	”	”	”	”	”	1967.10.17— 10.31	8.14	不守
”	”	”	”	”	”	1967.11.1— 1968.1.31	8.14.20	”
”	”	”	”	”	”	1968.2.1— 2.20	2.8.14.20	”

二、统 计 说 明

- 1.本站从1952年8月有纪录,1952.8—1960年的历年资料未列出,除9—11、18—19、25、27项外,均已参加累年统计。
- 2.记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计,但作极值的项目仍参加累年统计,若能估计到该年所缺的记录对年极值的挑选无甚影响,则该年的年极值仍予挑选。
- 3.某月(旬)记录缺测天数或有疑问但影响该月(旬)平均值(或总计值)不大的,则在该月(旬)数值外加()号。
- 4.某月(旬)记录缺测超过5(2)天,影响该月(旬)平均值(或总计值)较大的,一般按缺测处理。在该月(旬)栏内记“—”号。
凡风、天气日数同一年中因观测次数不同,该年的年数值不进行统计。
- 5.全月(旬)未出现该天气现象风向频率不足0.5%时,则该栏内记“0”。若全月(旬)无降水或微量降水则在该栏内记“0.0”。
- 6.某天气现象,日最低温度 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数,如果有一年(年度)或以上未出现,但出现的年份占观测记录的三分之二或以上时,则累年均平初、终期按出现年数统计,且在右上角加注“*”号,最早和最晚初、终日在出现年份中挑取,累年初、终间日数按实际观测年数统计(包括未出现的年份在内)最长初、终间日数照挑,最短初、终间日数记“0”。如果出现的年份不足观测记录年数三分之二的,不作累年统计。
- 7.日降水量 ≥ 0.1 毫米,即统计为降水日,若纯雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数,不算作降水日亦不参加一日最大降水量的挑选,但计入降水量内。
- 8.定时最大风速挑自24次观测记录。
- 9.天气现象每天4次观测记录不守夜班。风如为定时3次观测记录则在年份右上角加注“*”号,以示区别。
- 10.天气日数:
 - (1)大风日:凡一日中有大风出现,极大风速 ≥ 17.0 米/秒,风力达到或超过8级,即统计为大风日。
 - (2)雾日:凡一日中有雾出现,水平能见度在1000米(或3级)以下,即统计为雾日。
 - (3)雷暴日:凡一日中有雷暴或远雷暴出现,即统计为雷暴日。
 - (4)本站从1952.8—1970年没有出现沙暴现象。降雪在1967年12月29日和1971年1月31日出现微量,不另列表。

梅 县 地 面 气 候 资 料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目 1—38

1. 历年各月本站平均气压 (毫巴)	1
2. 历年各月平均气温 (摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温 (摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温 (摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温 (摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9—10
8. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初终期	11
9. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴)	12
10. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴)	13
11. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴)	14
12. 历年各月平均相对湿度 (%)	15
13. 历年各月最小相对湿度 (%)	16
14. 历年各月降水量 (毫米)	17
15. 历年各月一日最大降水量 (毫米)	18
16. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	19
17. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	20
18. 历年各月最长连续降水日数及其量 (日降水量 ≥ 0.1 毫米)	21
19. 历年各月最长连续无降水日数	22
20. 历年各月逐旬降水量 (毫米)	23—24
21. 历年各月地面平均温度 (摄氏度)	25
22. 历年各月日照时数	26
23. 历年各月日照百分率	27
24. 历年各月平均风速 (米/秒)	28
25. 历年各月定时最大风速及其风向	29
26. 累年各月各风向频率	30—31
27. 累年各月各风向最大风速 (米/秒)	32
28. 历年各月最多风向及其频率	33
29. 历年各月大风 (≥ 8 级) 日数	34
30. 历年各月雹日数	35
31. 历年各月雾日数	36
32. 历年各月雷暴日数及其初、终期	37
33. 历年各月霜日数及其初、终期	38

梅县

历年各月本站平均气压 (毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	1014.0	1009.3	1008.2	1004.1	999.7	997.1	994.2	995.7	997.6	1005.4	1009.9	1010.7	1003.8
1962	1013.3	1011.2	1008.0	1004.8	1000.1	996.8	994.4	997.8	1000.0	1005.5	1009.7	1011.6	1004.4
1963	1013.4	1013.1	1007.8	1004.9	999.8	996.2	996.4	998.0	998.6	1007.6	1009.0	1011.5	1004.7
1964	1011.0	1013.7	1008.6	1004.2	1000.4	997.1	998.3	995.3	1000.1	1004.3	1009.3	1012.4	1004.6
1965	1011.3	1008.4	1008.6	1003.9	1000.5	997.0	996.6	998.6	1001.1	1006.8	1009.5	1012.8	1004.6
1966	1012.1	1009.1	1004.9	1002.8	1000.8	998.7	997.9	996.7	1000.3	1006.9	1009.0	1010.5	1004.1
1967	1015.2	1012.9	1007.7	1004.8	999.1	995.3	995.1	995.6	1001.3	1006.3	1010.1	1015.2	1004.9
1968	1011.1	1013.8	1006.8	1007.0	1000.0	998.6	995.3	995.8	1000.0	1007.2	1010.7	1009.1	1004.6
1969	1009.8	1011.1	1008.5	1005.8	999.5	998.1	996.9	998.5	999.0	1006.3	1011.8	1014.1	1005.0
1970	1013.4	1010.5	1008.6	1006.8	1000.5	998.9	996.3	996.1	998.5	1005.3	1010.1	1010.8	1004.7
1961—70年合计	10124.6	10113.1	10077.7	10049.1	10000.4	9973.8	9961.4	9968.1	9996.5	10061.6	10099.1	10118.7	10045.4
10年平均	1012.5	1011.3	1007.8	1004.9	1000.0	997.4	996.1	996.8	999.7	1006.2	1009.9	1011.9	1004.5
1955—70年合计	16203.8	16171.3	16120.9	16072.6	16002.4	(15958.5)	15944.0	15944.9	(15993.3)	16100.1	16160.3	16188.8	16071.8
16年平均	1012.7	1010.7	1007.6	1004.5	1000.2	997.4	996.5	996.6	999.6	1006.3	1010.0	1011.8	1004.5

梅 县

历年各月平均气温 (摄氏度)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	11.5	13.1	17.5	21.6	25.4	28.4	28.4	27.4	26.4	23.8	19.9	15.2	21.6
1962	9.9	14.0	16.1	20.5	25.2	26.4	29.3	29.1	27.3	23.0	17.8	12.6	20.9
1963	8.1	12.1	17.3	22.2	28.0	27.1	27.7	29.1	27.9	22.2	19.5	13.4	21.2
1964	12.7	11.6	17.3	24.4	25.8	26.3	29.1	27.9	27.4	24.8	17.5	12.8	21.5
1965	12.9	16.4	16.8	21.2	23.9	26.6	28.2	28.7	26.4	22.7	20.3	13.4	21.5
1966	13.8	15.6	18.8	23.0	24.7	25.6	27.9	28.4	25.0	23.6	19.2	14.9	21.7
1967	10.8	12.0	18.2	22.0	26.5	28.0	29.4	28.1	25.2	22.5	20.1	10.6	21.1
1968	13.0	8.9	17.4	20.8	24.8	25.6	28.8	28.5	27.6	21.8	19.5	18.1	21.2
1969	12.9	10.8	16.4	22.1	25.8	26.0	28.8	28.5	27.9	22.2	15.6	12.0	20.8
1970	10.5	15.8	14.0	20.1	25.2	27.5	29.0	28.3	26.7	23.0	17.8	14.8	21.1
1961—70年合计	116.1	130.3	169.8	217.9	255.3	267.5	286.6	284.0	267.8	229.6	187.2	137.8	212.6
10年平均	11.6	13.0	17.0	21.8	25.5	26.8	28.7	28.4	26.8	23.0	18.7	13.8	21.3
1953—70年合计	213.3	241.2	312.7	391.1	455.2	(483.3)	514.4	511.4	(482.5)	410.6	330.9	247.4	382.8
18年平均	11.9	13.4	17.4	21.7	25.3	26.9	28.6	28.4	26.8	22.8	18.4	13.7	21.3

梅县

历年各月极端最高气温 (摄氏度)

月 份 年 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极日 值期	26.4 9	26.5 5	29.3 20	31.5 30	34.2 28	37.5 30	36.7 1	36.6 23、24	33.9 27	33.0 1、18	30.4 19	27.7 19	37.5 30/6
1962	极日 值期	26.1 14	31.5 23	29.7 15	31.6 28	33.7 28	35.0 3	38.4 31	38.7 1	36.0 24	34.6 2	31.1 14	26.9 27	38.7 1/8
1963	极日 值期	22.7 29	24.6 17	30.1 23	35.2 30	36.7 31	36.6 9	36.1 16	37.3 28	38.6 2	34.4 4	31.0 7	26.8 24	38.6 2/9
1964	极日 值期	26.5 12	27.9 9	28.4 17	34.3 22	36.6 19	36.3 30	36.9 31	38.1 7	36.6 9	34.4 5	28.6 1	27.7 9	38.1 7/8
1965	极日 值期	27.9 29	29.2 18	30.9 24	29.8 3	32.4 24、31	33.7 8	37.3 20	36.4 31	36.6 3	32.1 2	31.6 2	28.1 23	37.3 20/7
1966	极日 值期	29.0 13	29.8 17	30.7 5	33.3 24	35.3 12	35.3 27	36.2 10	37.4 10	36.5 2	34.3 11	32.5 10、13	27.7 8	37.4 10/8
1967	极日 值期	28.0 28	27.5 22	30.5 27、28	34.0 30	34.4 1	38.0 29	38.4 18	38.1 28	35.2 8	34.0 13	31.5 8	23.1 23	38.4 18/7
1968	极日 值期	27.8 29	22.5 29	30.7 16	31.4 9	35.5 12	34.5 27	37.5 30	37.0 19	35.9 4	33.7 9	29.7 27	30.7 4	37.5 30/7
1969	极日 值期	28.2 27	28.7 14	31.0 28	33.9 30	35.7 30	34.7 27	37.0 26	36.0 3	36.8 26	32.2 16	30.2 15	26.5 7	37.0 26/7
1970	极日 值期	25.9 2	31.0 25	30.2 29	30.7 16	34.3 31	35.1 30	38.4 31	38.9 1	35.0 24	33.3 12	30.8 14	26.3 22	38.9 1/8
1961—70	极日 值期 年 份	29.0 13 1966	31.5 23 1962	31.0 28 1969	35.2 30 1963	36.7 31 1963	38.0 29 1967	38.4 3天 3年	38.9 1 1970	38.6 2 1963	34.6 2 1962	32.5 10、13 1966	30.7 4 1968	38.9 1/8 1970
1952.8— 70	极日 值期 年 份	29.5 27 1959	31.5 23 1962	33.2 9 1960	35.2 30 1963	36.7 31 1963	38.0 29 1967	38.4 3天 3年	39.3 7、12 1953	38.6 2 1963	35.6 3 1954	34.9 9 1953	30.7 4 1968	39.3 7、12/8 1953

梅县

历年各月极端最低气温 (摄氏度)

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	-3.1 18	-1.5 2	8.0 27	14.9 17	12.9 5	21.3 3	22.4 9	22.4 6	22.3 3天	11.3 27	7.0 25	3.2 7	-3.1 18/1
1962	极 值 日 期	-1.6 2、27	1.1 2	5.4 25	10.5 3	18.4 22	21.6 9	23.4 3天	22.0 15	20.3 7	10.2 28	2.7 30	0.5 3	-1.6 2、27/1
1963	极 值 日 期	-3.3 16、27	1.2 1	3.2 1	6.3 9	20.5 4	22.2 9、14	22.4 25	23.4 2	19.9 25	10.0 21	7.6 28	2.6 28、29	-3.3 16、27/1
1964	极 值 日 期	3.8 20	3.3 21、26	6.2 26	16.1 8	16.5 12	17.2 6	23.1 26	22.5 27	20.0 29	18.4 31	5.2 14	1.2 18	1.2 18/12
1965	极 值 日 期	1.8 1	6.4 6	6.4 16	12.7 13	12.5 3	19.0 1	23.0 13	20.8 23	16.3 17	11.8 18	6.0 27	-0.1 31	-0.1 31/12
1966	极 值 日 期	-0.2 1	2.0 14	7.3 9	13.2 5	15.1 3	18.5 7	22.7 16	19.4 22	12.3 25	11.8 29	4.6 22	-0.1 28	-0.2 1/1
1967	极 值 日 期	-4.4 17	-0.8 15	5.6 6	12.7 5	19.3 16	19.2 11	23.4 23	21.9 18	15.0 16	10.2 28	7.3 30	-2.1 14	-4.4 17/1
1968	极 值 日 期	1.4 16	1.2 11	1.0 3	11.8 28	14.3 1	18.7 4	22.4 28	21.2 5	17.1 23	9.4 21	8.3 10	1.0 23	1.0 3/3、23、12
1969	极 值 日 期	1.8 8	-1.5 6	4.5 13	5.6 5、6	16.8 28	19.3 19、22	23.1 17、20	22.7 12	21.2 12	12.5 11	2.9 30	-1.4 10	-1.5 6/2
1970	极 值 日 期	-1.0 16、20	0.7 1	6.3 16	9.4 3	17.9 18	20.2 14	22.2 28、30	22.9 12	17.2 30	9.5 31	8.2 17	4.7 14	-1.0 16、20/1
1961—70	极 值 日 年 份	-4.4 17 1967	-1.5 2、6 61、69	1.0 3 1968	5.6 5、6 1969	12.5 3 1965	17.2 6 1964	22.2 28、30 1970	19.4 22 1966	12.3 25 1966	9.4 21 1968	2.7 30 1962	-2.1 14 1967	-4.4 17/1 1967
1952.8— 70	极 值 日 年 份	-7.3 12 1955	-3.0 21 1955	1.0 3 1968	5.6 5、6 1969	12.5 3 1965	17.2 6 1964	21.6 29 1956	19.4 22 1966	12.3 25 1966	6.8 31 1958	0.7 26、27 1956	-2.6 16 1954	-7.3 12/1 1955

历年各月逐旬

梅县

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	12.5	8.2	13.8	13.1	12.9	13.5	17.3	18.6	16.7	21.3	21.3	22.3	24.3	26.5	25.4	26.5	29.1	29.6
1962	9.6	12.4	7.9	13.9	13.4	15.1	16.0	18.7	13.8	19.7	18.8	23.0	24.9	24.5	25.9	26.4	26.0	26.8
1963	8.0	7.8	8.3	10.7	12.7	13.2	18.7	13.9	19.2	19.0	22.9	24.5	27.4	27.6	29.1	28.2	25.6	27.5
1964	15.3	14.1	9.2	14.5	12.5	7.3	16.5	18.2	17.3	22.2	25.5	25.6	24.5	25.6	27.1	25.3	26.0	27.7
1965	10.7	11.5	16.2	15.1	19.7	14.1	12.9	17.4	19.7	21.0	20.4	22.2	22.2	24.1	25.3	26.3	26.3	27.2
1966	12.1	16.7	12.7	16.5	16.2	13.5	19.1	19.4	18.0	21.4	22.3	25.2	22.5	26.3	25.3	23.9	25.5	27.6
1967	8.7	7.3	15.8	11.6	11.0	13.8	14.2	19.8	20.4	20.9	21.5	23.5	27.5	25.3	26.9	26.9	27.8	29.1
1968	12.9	12.1	13.9	6.1	9.7	11.2	15.1	20.1	16.9	22.0	19.7	20.8	25.3	25.4	23.7	24.8	25.6	26.5
1969	10.1	11.9	16.3	6.8	17.2	7.8	12.9	15.2	20.9	17.1	23.1	26.1	26.1	26.5	25.0	24.9	26.3	27.0
1970	11.6	8.2	11.6	14.6	14.6	18.9	12.3	12.7	16.8	18.5	20.0	21.8	26.3	23.2	25.9	27.0	27.2	28.2
1961—70年 合计	111.5	110.2	125.7	122.9	139.9	128.4	155.0	174.0	179.7	203.1	215.5	235.0	251.0	255.0	259.6	260.2	265.4	277.2
10年平均	11.2	11.0	12.6	12.3	14.0	12.8	15.5	17.4	18.0	20.3	21.6	23.5	25.1	25.5	26.0	26.0	26.5	27.7
1953—70年 合计	206.3	210.0	223.4	235.4	247.6	242.3	289.8	314.2	332.6	367.9	385.8	420.1	451.5	452.8	460.8	468.6	(480.7)	501.0
18年平均	11.5	11.7	12.4	13.1	13.8	13.5	16.1	17.5	18.5	20.4	21.4	23.3	25.1	25.2	25.6	26.0	26.7	27.8

平均气温 (摄氏度)

梅县

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
28.3	28.3	28.5	26.5	27.4	28.2	26.7	25.3	27.0	25.5	23.9	22.1	20.8	21.4	17.4	14.0	17.4	14.4	1961
28.6	29.8	29.5	29.1	28.7	29.4	26.4	28.0	27.6	26.3	23.7	19.3	18.3	20.7	14.5	10.3	15.0	12.6	1962
27.3	28.0	27.9	28.8	29.1	29.3	29.3	27.6	26.8	24.9	22.1	20.0	21.6	20.2	16.8	14.5	13.5	12.2	1963
28.4	29.8	29.0	28.6	27.5	27.7	28.3	27.1	26.8	25.7	24.7	24.1	21.2	16.8	14.6	14.0	11.9	12.6	1964
28.3	28.5	27.9	28.3	29.2	28.6	28.3	25.1	25.9	25.5	21.6	21.1	23.1	21.4	16.5	15.4	12.8	12.2	1965
28.0	28.4	27.5	29.8	27.8	27.5	27.1	24.8	23.0	24.5	23.5	22.8	20.1	20.2	17.2	14.8	17.9	12.3	1966
28.6	29.8	29.7	28.9	27.2	28.3	27.8	24.7	23.1	22.3	23.2	22.1	22.2	19.2	19.1	11.5	9.6	10.8	1967
27.7	29.1	29.7	27.4	29.6	28.3	28.5	28.2	26.2	24.0	22.2	19.4	20.1	18.6	19.7	21.6	16.7	16.4	1968
28.9	28.9	28.7	28.3	28.4	28.9	29.3	27.4	26.9	21.8	22.9	21.8	17.2	16.3	13.3	11.2	11.0	13.7	1969
29.4	28.4	29.4	28.8	28.9	27.5	27.2	26.6	26.4	23.2	24.9	21.1	18.1	17.4	17.8	15.6	14.8	13.9	1970
283.5	289.0	287.8	284.5	283.8	283.7	278.9	264.8	259.7	243.7	232.7	213.8	202.7	192.2	166.9	142.9	140.6	131.1	1961—70年 合计
28.4	28.9	28.8	28.5	28.4	28.4	27.9	26.5	26.0	24.4	23.3	21.4	20.3	19.2	16.7	14.3	14.1	13.1	10年平均
508.7	519.5	516.3	511.5	514.2	508.8	499.5	(481.1)	467.1	437.5	415.4	382.3	364.4	337.0	291.8	250.2	252.6	241.2	1953—70年 合计
28.3	28.9	28.7	28.4	28.6	28.3	27.8	26.7	26.0	24.3	23.1	21.2	20.2	18.7	16.2	13.9	14.0	13.4	18年平均

梅县

历年各月逐旬日最高

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	10	10
1962	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	4	8	7	8	8
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	10	10	11	9	5	10
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	6	5	8	8	6	7	10
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	8	8	5	9
1966	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	7	4	6	9	2	5	8
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	3	10	8	8	9	10	10
1968	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	5	8	7	2	6	4	6
1969	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	9	7	6	7	5	8	8
1970	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	7	4	7	9	9	10
1961—70年 合计	0	0	0	0	0	2	2	3	8	15	17	40	60	63	75	68	71	89
10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.8	1.5	1.7	4.0	6.0	6.3	7.5	6.8	7.1	8.9
1953—70年 合计	0	0	0	0	1	2	13	9	14	26	39	76	110	106	130	(118)	(134)	167
18年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	0.5	0.8	1.4	2.2	4.2	6.1	5.9	7.2	6.6	7.4	9.3

气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

梅县

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
9	9	11	10	9	9	7	3	8	8	5	3	0	2	0	0	0	0	141
10	10	11	10	10	11	6	10	10	6	4	0	0	1	0	0	0	0	139
8	9	11	10	10	11	10	9	9	5	2	0	4	0	0	0	0	0	163
8	10	11	8	10	10	10	9	8	6	5	1	0	0	0	0	0	0	158
10	9	10	10	10	11	10	9	6	4	2	1	5	0	0	0	0	0	133
10	9	9	10	7	11	10	8	9	10	6	5	2	1	0	0	0	0	154
10	10	11	10	9	9	9	7	5	2	4	6	4	0	0	0	0	0	159
8	10	10	10	10	10	10	10	8	4	0	0	0	0	0	1	0	0	134
10	10	11	10	9	11	10	9	8	0	2	1	0	2	0	0	0	0	151
10	9	11	9	10	11	7	8	8	2	5	4	0	2	0	0	0	0	147
93	95	106	97	94	104	89	82	79	47	35	21	15	8	0	1	0	0	1479
9.3	9.5	10.6	9.7	9.4	10.4	8.9	8.2	7.9	4.7	3.5	2.1	1.5	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	147.9
168	173	190	171	172	185	163	(149)	138	96	70	41	24	15	3	1	0	0	2704
9.3	9.6	10.6	9.5	9.6	10.3	9.1	8.3	7.7	5.3	3.9	2.3	1.3	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	150.2

梅县

历年各月逐旬日最高

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7
1962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	9	6	1	1
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	1
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1961—70年 合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	14	8	8	17
10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.7	1.4	0.8	0.8	1.7
1953—70年 合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	15	(8)	(13)	31
18年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	0.4	0.7	1.7

气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

梅县

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
3	1	5	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
6	9	8	3	8	9	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
2	2	3	4	5	10	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
5	8	8	4	2	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
0	2	2	0	3	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
1	4	1	9	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
4	7	11	5	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
0	4	9	2	9	2	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
0	4	6	3	4	7	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
6	3	8	5	8	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
27	44	61	35	47	50	29	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368
2.7	4.4	6.1	3.5	4.7	5.0	2.9	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8
50	86	105	62	89	82	46	(22)	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	(634)
2.8	4.8	5.8	3.4	4.9	4.6	2.6	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2

梅县

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及初、终期

年 度	月 旬	十一			十二			一			二			三			全 年	初 日	终 日	初、终间 日 数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1960—61		0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	5	17 / 1	2 / 2	17
1961—62		0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	5	2 / 1	28 / 1	27
1962—63		0	0	0	0	0	0	3	4	6	0	0	0	0	0	0	13	8 / 1	31 / 1	24
1963—64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1964—65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1965—66		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	31 / 12	1 / 1	2
1966—67		0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	1	0	0	0	0	7	28 / 12	15 / 2	50
1967—68		0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11 / 12	30 / 12	20
1968—69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	6 / 2	8 / 2	3
1969—70		0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	5	4 / 12	21 / 1	49
1970—71		0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	8	4 / 1	11 / 1	8
1960—70年合计		0	0	0	2	3	3	13	15	11	3	1	0	0	0	0	51			200
日数11 初终期9年平均		0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	1.2	1.4	1.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	2 / 1*	24 / 1*	18.2
1952—70年合计		0	0	0	3	7	3	22	25	12	4	3	2	0	0	0	81			325
日数19 初终期17年平均		0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.2	1.2	1.3	0.6	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	4.3	4 / 1*	22 / 1*	17.1

梅县

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	9.6	12.1	16.7	20.8	25.2	29.6	30.7	30.6	29.3	21.7	18.1	13.8	21.5
1962	8.2	12.0	14.9	18.9	26.5	30.3	31.2	29.6	27.6	20.8	15.6	11.0	20.6
1963	5.7	10.6	15.5	20.2	26.5	29.1	29.8	30.3	28.8	20.4	18.6	12.0	20.6
1964	12.9	11.9	16.0	23.7	25.6	28.8	30.3	30.5	28.5	24.6	13.6	10.6	21.4
1965	11.0	15.3	14.9	21.3	23.8	28.5	29.8	28.9	25.5	22.3	19.9	13.0	21.2
1966	12.8	14.8	18.3	23.4	23.0	28.6	30.2	28.8	21.5	20.5	15.8	13.7	21.0
1967	9.8	11.5	16.6	21.2	27.6	28.5	30.6	30.1	25.3	18.2	17.1	8.4	20.4
1968	10.4	9.2	15.9	18.8	25.6	28.2	30.2	30.3	25.4	19.4	15.7	16.6	20.5
1969	13.5	11.0	15.6	20.4	26.8	27.8	30.5	29.7	26.9	20.0	13.1	10.0	20.4
1970	9.9	13.8	13.9	18.4	26.2	29.1	29.4	29.5	28.9	22.0	15.2	13.7	20.8
1961—70年合计	103.8	122.2	158.3	207.1	256.8	288.5	302.7	298.3	267.7	209.9	162.7	122.8	208.4
10年平均	10.4	12.2	15.8	20.7	25.7	28.9	30.3	29.8	26.8	21.0	16.3	12.3	20.8

梅 县

历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

月 份 年 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	20.3 10	19.2 5	24.4 20	28.0 25	34.1 20	33.9 17、26	35.4 21	34.6 4	35.4 27	30.0 6	26.5 19	23.0 18	35.4 21/7、27/9
1962	极 值 日 期	17.3 14	22.8 11	24.4 20	27.2 7	34.0 27	35.0 27	36.1 8	34.4 6	32.8 17	31.6 4	25.4 2	18.9 14	36.1 8 / 7
1963	极 值 日 期	12.7 4	15.9 7	22.0 10	28.6 24	32.9 31	34.1 12	36.8 17	37.5 24	34.6 8	29.7 4	24.5 8	19.8 9	37.5 24 / 8
1964	极 值 日 期	24.2 13	22.3 8	22.6 31	28.3 26	33.7 22	35.4 30	35.9 6	35.3 28	33.5 3	30.5 14	21.9 4	16.8 9	35.9 76/7
1965	极 值 日 期	18.5 29	21.5 21	23.6 23、31	28.2 23	32.3 14	33.0 25	34.0 13	34.6 11	33.1 6	30.4 2、4	26.8 2	23.4 22	34.6 11 / 8
1966	极 值 日 期	20.3 12	23.5 22	26.3 22	29.6 24	33.7 12	34.0 27	35.0 27	34.4 17	33.4 10	29.5 13	24.9 14	25.8 19	35.0 27 / 7
1967	极 值 日 期	21.6 28	21.8 22、23	24.8 31	29.0 10	36.4 31	36.3 28	35.6 4	36.6 19	34.1 10	27.4 1	25.7 9	15.0 5	36.6 19 / 8
1968	极 值 日 期	18.5 7	16.3 29	23.7 20	24.8 10	30.9 6	33.6 18	36.2 23	39.1 19	32.9 20	28.6 9	21.0 21	24.6 2	39.1 19 / 8
1969	极 值 日 期	23.0 20	19.5 19	25.0 25	27.9 25	34.7 19	34.9 29	35.4 2	34.5 3	35.3 25	26.0 15	23.3 14	20.6 7	35.4 2 / 7
1970	极 值 日 期	18.1 28	22.3 20	25.1 30	26.9 11	32.8 24	35.9 10	35.1 5	33.8 25	35.9 1	29.4 11	24.4 14	20.1 22	35.9 10/6、1/9
1961—70	极 值 日 年 份	24.2 13 1964	23.5 22 1966	26.3 22 1966	29.6 24 1966	36.4 31 1967	36.3 28 1967	36.8 17 1963	39.1 19 1968	35.9 1 1970	31.6 4 1962	26.8 2 1965	25.8 19 1966	39.1 19 / 8 1968