

中寒諸方

中寒門

S2942

5-2<2

醫門法律

醫門法律二卷中寒門目錄

陰病論

論辨中寒證要法五條

論治中寒病用藥八難

論朱丹谿述中寒二條

論戴元禮述中寒一條

中寒色脉六則

律三條

比類傷寒論陽虛陰盛治法并死證三十一則

比類金匱論水寒五則

比類金匱論胃寒四則

比類金匱論胸腹寒痛十七則

比類金匱論虛寒下利六則

中寒論六則

論寒氣論中寒一則

論寒氣論中寒二則

論寒氣論中寒三則

論寒氣論中寒四則

論寒氣論

論寒氣論二卷中寒四則

中寒門諸方卷之二

①附薑白通湯 治暴卒中寒厥逆嘔吐瀉利色清

氣冷肌膚凜慄無汗盛陰沒陽之證

附子

炮去灰

乾薑

炮各五錢

蔥白

五莖取汁

猪膽

大者半枚

右用水二大盞煎附薑二味至一盞入蔥汁

并猪膽汁和勻溫服再用蔥一大握以帶輕

束切去兩頭留白二寸許以一面熨熱安臍

上用熨斗盛炭火熨蔥白上面取其熱氣從

臍入腹甚者連熨二三餅又甚者再用艾炷

灸關元氣海各二三十壯內外協攻務在一

時之內令得陰散陽回身溫不冷。次用第三方。

②附薑湯

治卒暴中寒。其人腠理素虛。自汗淋漓。

身冷手足厥逆。或外顯假熱躁煩。乃陰盛於內。逼其陽亡於外。卽前方不用蔥白也。

附子

炮去皮臍

乾薑

炮各五錢

右用水二大盞煎至一盞。略加猪膽汁。蛤蜊壳。侵和溫冷服。不用蔥熨及艾灼。

③附薑歸桂湯

治暴病用附薑湯後第二服隨用。

此方繼之。因附薑額主回陽。而其所中寒邪。

先傷榮血故加歸桂驅榮分之共纔得藥病相當也。

附子炮去皮臍 乾薑炮 當歸 肉桂各二錢五分

右用水二大盞煎至一盞入蜜一蛤蜊壳溫

服

④附薑歸桂參茸湯 治陽氣將回陰寒少殺略有

端緒第三服即用此方。

附子炮去皮臍 乾薑炮 當歸 肉桂各二錢五分

人參 甘草各二錢

右用水二大盞煨薑三片大棗三枚自汗不用煨薑

煎至一盞入蜜三蛤蜊壳溫服

⑤辛溫平補湯

治暴中寒證服前三方後其陽已

回身溫色活手足不冷吐利漸除第四方卽用此平調藏府榮衛俾不致有藥偏之害

附子

炮去皮臍

乾薑

炮各五分

當歸

一錢

肉桂

五分

人參

甘草

炙

黃芪

蜜炙

白朮

土炒

白芍

酒炒各一錢

五味子

十二粒

右用水二大盞煨薑三片大棗二枚劈煎至

一盞加蜜五蛤蜊壳溫服

⑥甘寒補氣湯

治中寒服藥後諸證盡除但經絡

間微有窒塞。辛溫藥服之不能通快者。第五

方用甘平助氣藥緩緩調之。

人參 一錢

麥冬 一錢

黃芪 蜜炙二錢二分

白芍 一錢酒炒

甘草 炙七分

生地黃 二錢

牡丹皮 八分

淡竹葉 鮮者取汁少許更妙乾者用七分

石川水二大盞煎至一盞加梨汁少許熱服無梨汁用竹瀝可代。

六方次第昌所自訂者也。然仲景卒病方論

無傳難以徵信。再取傷寒論并金匱治虛寒

諸方發明爲例。見治熱病雜病之虛寒者。用

藥且若此。而治暴病之說可深信不疑矣。更

取諸家方治評定得失大意以昭法戒傷寒十四方金匱十二方評定通用成方十則共得四十二方

⑦桂枝湯加附子方 治傷寒發汗過多汗漏不止

惡風小便難四肢微急亡陽之證方論集見本

桂枝 三錢

芍藥 三錢

甘草 二錢

附子 炮去皮 三錢

煨薑 二錢

大棗 二錢

右用水二大盞煎至一盞溫服

按漏汗亡陽之證煨薑辛散酌用一錢可也

⑧真武湯 治太陽誤汗不解悸眩瞤振亡陽之證

又治少陰腹痛下利，有水氣之證。

茯苓 三兩

芍藥 三兩

生薑 三兩

白朮 二兩

附子 一枚炮去皮

右五味以水八升，煮取三升，去滓溫服七合。

日三服。

若欬者，加五味子半升，細辛、乾薑各一兩。

細辛、乾薑之辛，以散水寒；五味之酸，以收肺氣而止欬。

若小便利者，去茯苓。

茯苓淡滲而利竅，小便利，即防陰津暗竭，不當更滲。

若下利者，去芍藥，加乾薑二兩。

芍藥收陰而停液，非下利之所宜。乾薑散寒而煖土，土煖則水有制。

若嘔者，去附子，加生薑足成半斤。

嘔加生薑宜矣，乃水寒上逆為嘔，正當用附子者，何以反去之耶？蓋真武湯除附子外，更無熱藥，乃為脾胃素有積熱，留飲慣嘔而去之。又法外之法耳。觀後通脈四逆湯嘔者，但加生薑，不去附子，豈不甚明，所以暴病之嘔，即用真武，尚不相當也。

⑨芍藥甘草附子湯

治傷寒發汗不解，反惡寒、陽

虛之證。

芍藥

三兩

甘草

二兩

附子

一枚炮去皮臍破八片

右三味以水五升，煮取一升五合，溫服半升。

⑩茯苓四逆湯

治傷寒汗下屢誤，陰陽兩傷，煩躁

之證。

茯苓 六兩

人參 一兩

甘草 二兩

乾薑 一兩

附子

一枚生用去皮破片

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合

日三服

①桂枝去芍藥加附子湯

治傷寒下之後脉促胸

滿微惡寒陽虛之證。又治風濕相搏之證。

去芍藥加白朮亦治風濕相搏。

桂枝

三兩去皮

甘草

二兩炙

附子

一枚炮

生薑

三兩切

大棗

十二枚傍

右五味咬咀以水七升微火煮取三升去滓
適寒溫服一升

③乾薑

附子湯

治傷寒下之後復發汗晝煩躁夜

安靜脉沉微陽虛之證

乾薑

一兩

附子

一枚
去

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

④甘草

附子湯

治風濕相搏煩疼掣痛短氣惡風

陽虛之證

甘草

二兩

附子

二枚
炮去皮

白朮

二兩

桂枝

四兩
去

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升

日三服。初服得微汗則解。能食汗止。復煩者服五合。恐一升多者。宜服六七合為妙。

固

附子瀉心湯

治傷寒心下痞。惡寒汗出。熱邪既

盛。真陽復虛之證。金匱有大黃附子湯。亦同此意見二十九方。

大黃 二兩

黃連

黃芩 各二兩

附子 一枚 炮 藁汁

右四味切三味以麻沸湯漬之。須臾絞去滓。

內附子汁分溫再服。

金

四逆湯

治三陰經證。四肢厥冷。虛寒下利。急溫

其藏之總方。

甘草

二兩 炙

乾姜

三兩 炙 兩

附子

大者 破 生去皮

右三味以水三升煮取一升二合分溫再服

（大）通脉四逆加減湯 治厥陰下利清穀裏寒外熱

厥逆惡寒脉微欲絕之證即前四逆湯方

面色赤者加蔥九莖

而色赤陽格於上也加蔥通陽氣也故名通脉

腹中痛者去蔥加芍藥二兩

腹中痛真陰不足也去蔥惡其

解陽也加芍藥收陰也

嘔者加生姜二兩

咽痛者去芍藥加桔梗一兩

咽痛陰氣上結也去芍藥惡其

欬氣聚陰也加桔梗利咽也

利止脉不出者去桔梗加人参二兩。利止邪脉仍不出陽氣未復也。脉者氣血之先陽氣未復亦兼陰血不充故加人参補其氣血也。去桔梗者惡其上載而不四通也。

⑦白通湯 治少陰病但見下利藏寒陰盛用此以通其陽勝其陰。

葱白

四莖

乾薑

二兩

附子

一枚生去皮

右三味以水三升煮取一升云滓分溫再服。

⑧白通加猪膽汁湯 治少陰下利脉微與上白通

湯服走利不止厥逆無脉乾嘔煩者用此加猪膽汁湯為鄉導服湯脉暴出者死微續者

莖白 四莖 乾薑 二兩 附子 一枚生去皮破六片 人尿 五合

猪膽汁 一合

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁入尿和令相得分溫再服若無膽汁用人尿亦可

①附子湯 治少陰病一二日口中和背惡寒陽虛

之證灸後用此方又治少陰身體痛手足寒脉沉陽虛之證

附子 一枚去皮破六片 茯苓 二兩 人參 二兩 白朮 四兩

芍藥 三兩