

清·孫豐年 撰

治痘藥性說要



清·孫豐年 撰

治痘藥性說要





## 治痘藥性說要 · 解題

清·孫豐年撰。成書於乾隆五十年（公元一七八五年）。

孫豐年，字際康。白下（今江蘇江寧）人。

此部分為該書卷下之內容，將治痘藥物分爲穀、菜、蟲、鱗介、禽、獸、人、金石水火土八部，記述了近一百六十種治痘常用藥，各藥述性味及在治療痘疹中的功效。

今據清·乾隆五十年（公元一七八五年）劉葆初刻《孫豐年先生幼科三種》本影印。此本有缺。

（王味味）



治痘藥性說要卷下

白下小田子孫豐年際康氏著

穀部

粳米

粳稻即人所常食

之長味甘淡氣平

治痘藥性說要

髓。周身筋骨肌肉

最多八九月收者

者兼益肺小

甚佳。陳年米尤

土虛有熱者藥中堪尸

晚米

晚米，即粳米中之十月收者。飽露

氣而解熱。痘起灌肺熱未淨者最宜之。

糯米

糯米亦粳稻中之一種。多宜溽田。糯者柔也。對粳米而立名。稟上中之陽氣。味甘氣溫。質軟而粘膩。爲補脾胃益肺氣之品。但性溫而滯。脾肺虛寒者宜之。痘瀉瘳時。能濃漿汁。故保元湯中用之。作糕餅性雖運化。作糜粥功益甚大。

炒米卽糯米水疎

極則輕鬆

氣且止滑瀉。痘長灌脾

糖丸成。得火力不

服且炒時微用桐油。澆

雖性甘溫。滋結難化。相傳

治痘藥性說要

卷下

二

龍痘兒似亦無取

小米

小米卽北地粟米。味鹹淡微寒。養胃調脾。其餘黍稷米秫米種類尚多。其性寒溫微別。要皆相地土種植。而與各方人質相宜。不越水旱二種。早中晚三收。南方地下土早多宜水稻。北方地平土澤。多宜旱稻。西南邊地亦有燒山地爲畝田。種旱稻者謂之火米。故南人宜粳。北人宜粟。

鍋粳

鍋粳得米力之凝聚。受火力最專。大振脾元。鼓動胃氣。能

健能開。小兒煮食。或磨粉爲點。最妙。痘中泄瀉者。高珍。惟香乃益土。惟煖乃生土也。世以香煖動火。家常物反棄之。而以糝糯膩滯之品爲重者。亦愚甚。

### 米粃

米粃卽椿米篩出細糠。味甘平。通腸胃。下氣消積。澤肌膚。其性運動。又能治暴噎。年荒亦可充饑。昔陳平食糠而肥。是也。

### 麥

麥類亦數種。而充麩供人常食者。惟大麥小麥。大麥穗粒。

### 治痘藥性說要

卷下

四

苗葉皆大於小麥。粒有芒刺。亦猶粟稷之種。近百。主治總不甚相遠。秋種冬生。春實夏收。得春升之氣最早。爲五穀之長。察其性之優劣。則南北土地所產不同。北地之麥。日開花。其性溫。益人氣力。南麥夜開花。性多陰寒。助濕生痰。故北人以麩代飯。并不似南麥之食多作脹也。小麥味甘微寒。養肝氣。去客熱。止煩渴。利小便。止漏血。吐血。養心。虛令婦人得孕。穠麥味甘微鹹。氣微溫。調中益氣。寬藏。化穀滑肌。肥體。釀酒甚于小麥。初熟時人多炒而食之。有火能助熱。乾麩益胃。強肝。濕麩生痰。助濕。痘初見。近人

多以麩絲食之。雖取春生之意。而南麩不可多服。有酸者更宜忌。麩皮多筋。性寒能發肝風。傷脾氣。且最難消化。受其傷者。惟草菓仁能消去之。小兒暑月。痘瘡潰爛不能着席。用夾褥盛麩逢合。令兒臥之。藉其涼軟。且善收暑濕。誠妙法也。麩筋甘涼解熱。和中勞熱人煮食之。寬中益氣。小粉乃麩洗筋澄出。甘涼補中益氣。脈和五藏。調經絡。又炒一合湯服。晰下痢。醋熬成糊。敷一切癰腫湯火傷。浮小麥乃淘麥上淨者。味甘鹹氣寒。輕虛入肺。能歛盜汗。自汗。退虛熱。

治痘藥性說要

卷下

五

蕎麥

蕎麥易長。易收。莖弱而翹。然故名。味甘平。微酸。氣寒。寔腸胃。益氣力。能鍊五藏滓穢。治婦女帶濁。多食難消。久食動風。令人頭眩。痘瘡潰爛者。蕎麥麩頻敷之。炒黃研末水調。并敷湯火傷如神。

巨勝子

巨勝子。卽黑芝麻。稟天地冲和之氣。分稼穡之甘。質潤性溫。入足少陰。專補腎藏。陽虛兼行肝心脾肺四經。平補五藏。最仁最厚。但不苦桂附之雄健耳。八穀之內。神仙所珍。

痘後營分不足者。以此益脾補肺。降心包之火。澤肝木之陰。明耳目。清風濕。最堪選用。以紫黑栗色者爲良。白者名曰油麻。潤肺除燥。下通脾約便難。赤者專發痘症。腎經之毒。錢氏以之送百祥丸。子製浴痘五妙湯。中用之。亦通血脈達腎邪也。

### 黑豆

黑豆。甘平。生食則涼。炒食則溫。煮食則寒。色黑屬水。能通腎寧心。下氣利水。消腫脹。解毒稀痘瘡。小者名馬料豆。鹽水煮食。尤能補腎。

### 治痘藥性說要

卷下

六

### 黃大豆 穀 虎皮豆 神黃豆

黃大豆。甘溫。寬中下氣。利大腸。消水腫。脹毒。痘後癰毒。初起。令母嚼爛厚敷。卽散。得五更津唾更妙。燒黑研末。油調。并治痘後一切瘡癰。穀煎水。洗痘風癬。一種虎皮豆。名黎豆。又名狸豆。亦益氣和中。不入痘治。神黃豆。產緬甸。形如槐子。能解毒稀痘。一陽日清水磨服。

### 赤小豆 相思子

赤小豆。卽紅豆。以色紫黯。顆粒緊小者佳。味甘酸。氣平。性下行。而通小腸。行水散血。消腫排膿。清熱解毒。理脾氣。下

行乳汁爲末敷一切瘡疽甚神。近有以半粒黑半粒赤者爲紅豆。不知乃相思子。出雲南。雖亦解毒。功效迥別。

### 白豆

白豆一名飯豆。甘平。補五藏。煖腸胃。調中助十二經脈。

### 青豆 毛豆

青豆入肝。多服作膨悶。角生毛者名毛豆。青豆類也。最美于秋令。以金節而專木色。不甚益人。痘中忌。

### 菜豆

菜豆。稟土中之陰氣。味甘氣涼。行十二經。清熱毒而解渴。

### 治痘藥性說要

卷下

七

去浮風而潤膚。利小便。消熱脹。厚腸胃。清脾土。裏寒者不宜食。穀較豆尤涼。清火眼。散翳解毒。痘瘡毒火熾盛。又值暑令。流行者可速肉煮汁服。古方三豆飲。治天行痘瘡。令兒豫服。疎解毒。菜豆黑豆赤豆各一升。甘草節二兩。以水八升。煮極熟。任意吞豆飲汁。可服七日。主出痘稀少。又痘後癰毒初起。以上三豆等分。晒燥研爲細末。醋調時時搽塗。較外症諸藥簡便而效神也。真菜豆粉一味。蜜調治痘後腫毒屬陽者。乾撲治痘瘡濕爛不痂。并治一切癰疽。

名三豆膏

豌豆

豌豆甘平。最善清利。除熱。煮食和中。調營衛。治消渴。并痘瘡紫黑惡疔。古方四聖散用以拔毒。

白蘊豆

白蘊豆。稟土中冲和之氣。味甘氣溫。入足太陰陽明經氣。分通利三焦。升清降濁。治暑月吐瀉霍亂。婦女帶下血崩。久服補五藏。此豆性極中和。痘兒回期最爲調攝。平劑。葉氣味同豆。亦主轉筋霍亂。搗汁入醋少許。溫服甚效。又治蛇傷。搗敷甚良。花治血崩。赤白帶下。乾末米飲下。

治痘藥性說要

卷下

八

虹豆

虹豆甘鹹平。益氣理中。健胃補腎。開花結莢。必兩兩并垂。有習坎之義。豆子形似猪腰。如人腎樣。昔盧廉夫教人補腎氣。每日空心煮虹豆入少鹽食之。蓋得此理。小兒腎元不足者宜服。痘中亦妙。

刀豆

刀豆形如挾劍。味甘氣溫。調中下氣。利腸胃。益腎歸元。其子止呃逆功更倍。同雞猪肉煮食極美。

蠶豆

色白。較黃者佳。甚多不入藥。

此豆可藥可食。可鹹。早上食。

蠶豆。豆莢如蚕。又蚕時始熟故名。味甘微辛。氣溫。炒食主快胃。利五藏。微嫌閉氣。煮食多則發脹。昔一女懷吞針入腹。醫藥罔治。一人教煮蚕豆同韭菜食之。針自大便出。蓋韭取其糾纏。裹在針外。蚕豆滯利。粘在針上。協同護針。不傷藏府而下。此利五藏之一微也。醫非潛心格致。難以語此。

淡豆豉

淡豆豉。味苦。氣寒。苦泄肺。寒解熱。調中下氣。主傷寒頭痛。寒熱煩悶。熱鬱陽明。發班嘔逆。疫氣瘴氣。血痢溫瘧。蓋豆

治痘藥性說要

卷下

九

經蒸罍。則能升能散。故發汗生用。止汗熟用。有鹹淡二種。淡者入藥。鹹者佐食。痘中發表。亦能解肌宣毒。但必熱在陽明。胃中懊懣者。可用。然大伐胃元。虛症必忌。若不論虛實。以痘必兼疫。藥為用之。殊不審慎。造政法用黑豆淘淨。伏天水浸一宿。蒸熟攤乾。蒸覆三日。候黃取晒。下甕貯實桑葉覆蓋。泥封七日。取出又晒。酒拌入甕。如此七次。再蒸如前。

薏苡米

薏苡甘寒。升少降多。能祛脾濕。清肺熱。及虛勞咳嗽。肺痿

薯蕷補脾乃德  
去麻溫而脾安  
耳術補之行

肺癰。虛火上乘等症。皆可用為下引。又能利筋去濕。治風濕脚膝痺痛。然惟濕熱者宜之。若因寒筋急及陰寒轉筋。津枯胃弱及孕婦皆不可用。今人以為補劑一藥。常服。悞者多矣。痘後土濕不痂者堪用。

罌粟米 穀

罌粟米一名御米。甘寒潤燥。治反胃化胃中痰滯。粟穀

若咳嗽胸有風  
寒或發火未清  
出病尚有結毒  
精遺再于濕結

味澆性溫。祛痰嗽。止下痢。肺虛精滑。臉紅者宜之。止瀉。蜜炙。止痢。醋炒。阿芙蓉又名鴉片。乃罌花之初苞。午後以針刺其外面青皮。勿傷裏面。次早津凝苞外。以竹刀刮

治痘藥性說要

卷下

十

不可止毒者極  
勿誤用痘中更  
宜審切

取入礮器陰乾。其氣味與壳相同。而其酸澆更甚。小兒痘瘡行漿時。泄瀉不止無毒者。用四五厘至一分。飲澆神驗。他藥莫能述也。房術藥中多用之。

穀芽

穀芽古名米蘗。卽梗稻釀出萌鬚。味甘氣溫。具生化之性。消積健脾開胃之要藥。

麥芽

麥芽古名麥蘗。以水浸大麥而成。味鹹氣溫。助胃宣中。消食與穀芽相同。而此消化之力更緊。蓋二芽既經發萌。雖



能升騰滯氣。未免耗伐腎元。瘧中腹脹而漿不起者。只可酌用。麥治麴積。穀治米積。

神麴

酒麴亦能消食。麴以神名。意深遠矣。味甘辛氣溫。入陽明胃經。其功專於去宿。逐雜。入消化食積。痰飲霍亂。瀉痢。然有積能消。無積則大耗元氣。毒神用更宜慎。

玩回乳墮。脾胃虛者。自當知忌。痘兒非極傷。穀。疳食積。不可輕用。造神麴法。伏日用白麴百斤。以象白虎。八青蒿汁三斤。以象青龍。蒼耳汁三斤。以象勾陳。野萊四斤。以象騰蛇。杏仁去皮尖搗爛。四斤。及用北河水。以象元武。赤

治瘧藥性說要

卷下

十一

小豆煮搗爛三斤。以象朱雀。更擇諸神聚會之日。以淨室焚香。位置六神。方次調和作餅。或麻葉或楮葉包。譬如造醬黃法。待生黃衣。晒收之。

紅麴

紅麴甘溫。色赤。入營而破血。活血。燥胃消食。治婦人經血阻滯。赤白下痢。夫人水穀入胃。中焦濕熱。薰蒸。游溢。精氣化爲營血。此麴以白米飯。雜麴母。得濕蒸。蒸。晉。卽變爲紅。皆造化自然之微妙也。故紅麴主血分。瘧中血滯而來食積者。亦可取用。

飴糖

飴糖即麦芽或穀芽煎熬而成。味甘氣溫。入脾經。氣分潤。肺氣止。乳嗽。補虛冷。益津氣。仲景桂枝湯用治腹痛。皆取甘以緩急。溫以行滯也。痘後木土相尪。中元虧憊。與桂枝并用最妙。

蒸餅

蒸餅。煎食中其來最古。是小麥麩。醇精發成。甘平消食。養脾益胃。和血止汗。利小便。通三焦。惟臘月或寒食日。製造蒸至皮裂。去皮風乾。以水浸脹。搗爛。泡過。可和脾胃。及三

爲。獨者亦微類。

治痘藥性說要

卷下

十一

焦藥。最助消化。且麪已過性。不助濕熱。以果菜糖膩單物爲陷者。不堪入藥。痘兒以純麪精發者。能助升發之氣。險發者不可用。

酒

穀類多種。蘊釀各異。以糯米者爲勝。清淡味甜。吞爲無灰酒。

酒性大熱。嚴冬不冰。其性熱而升走。其氣悍。醉則體軟。神昏。振寒戰慄。本草言其有毒。蓋以溫中發熱。近于相火也。甘者性醇。苦者性烈。清淡者利水。陳久者少熱。色赤者通血脈。養脾胃。色白者升清陽。益元氣。以及扶肝悅顏。行藥勢。則酒之功也。他如資痰濕。燥精助火。醉當風臥。成惡風。

醉浴冷水成痺痛。醉後房色成虛癆。則酒之爲害大矣。藥中借爲導引。可以通行一身之表。引諸藥至極高之分。痘中亦不可少。○蜜酒釀化胃痺。行室清達表煖中尤速。燒酒一名火酒。得火則燃與火同性。其治陰寒腹痛最捷。但燦金耗水。燥悍尤甚。

醋一名苦酒

醋有數類。入藥惟米釀陳久者良。味酸苦氣溫。消癰腫。散水氣。燒炭滓。澆安產後血暈。解不正之氣。北人感冒風寒。用醋湯胡椒雞翅。熱食汗之。以北方苦寒。得雞椒溫行。發脾胃生發之氣。又恐溫行太過。藉醋消散而飲。亦猶白芍之監桂枝意耳。東南人多不喜醋。然斂肝亦所以益土。觀調敷藥消癰腫。是飲中有散。散中有飲。痘兒食物中亦在用者之神明耳。

醬

醬之品類亦不一。惟豆醬陳久者入藥。味鹹酸。性冷利。主除熱止煩渴。及敷湯火瘡疥。并殺虫蛇蜂蠱。一切魚肉蔬菜野菌毒。秋油乃醬之精華。氣味輕清。堪作藥。治病無取。

治痘藥性說要

卷下

十三