

四庫

全書

四庫全書

全書

第七六〇册

四庫全書

●上海古籍出版社

本冊目次

輟
全
書

上海古籍出版社

普

濟

方（二四）

明朱橚撰……………一

卷十六〇冊

欽定四庫全書

子部
普濟方卷三百八十四

詳校中醫院恩禮臣孔毓秀
編修臣倉聖脈履勘

總校官進士臣繆 瑒
校對官修撰臣吳錫齡
臚錄舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十四 明 周王朱楠 撰

嬰孩諸熱痘腫門

諸熱 附論

經曰火氣不調舉身蒸熱風氣不調令身強直水氣不調身體浮腫土氣不調四肢不舉凡小兒之疾多因風熱不順乳氣不調致生諸疾潮熱驚熱夜熱餘熱食熱疳熱壯熱煩熱骨熱風熱虛熱客熱癖熱寒熱血熱疹熱十六者大同而小異凡熱必乘陽邪而發經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實邪正分爭客搏於皮膚或恍惚啼叫或悶亂啼驚其變多端或在表或在裏或似實而似虛或半表而半裏或半實而半虛皆由血氣盛實臟腑生熱陰陽氣交薰蒸於外致令身熱焉凡病熱者左臉先赤肝受熱也額上先赤心受熱也右臉先赤肺受熱也大抵熱則風生風生則驚悸潮熱發歇有時驚熱顫叫恍惚夜熱夕發旦止餘熱寒邪未盡食熱

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十四

肚背先熱疳熱骨蒸盜汗壯熱一向不止煩熱心躁不安積熱煩赤口瘡風熱汗出身熱虛熱困倦少力客熱未去不定癖熱涎嗽飲水寒熱發如瘡狀血熱發辰已耳鼻尖冷諸熱得之各有所歸其間有三兩證交互者宜隨其輕重而治之潮熱者血氣盛實臟腑生熱或傷寒時疫觸受邪氣陰氣不足陽氣有餘陽邪暴傷則血氣凝滯不即通流壅遏無歸傳於陽明之經遂成潮熱休作有時其夜間發熱者乃是陰中有陽邪也潮熱或留宿寒夾伏熱者大便黃而臭氣滯宿寒者大便白而酸臭潮熱者實熱也當日間潮熱或即增寒手足俱冷能乳即瘦再加盜汗此食疳之候也發熱日可夜間熱甚天明復涼謂之傷寒餘熱失解小兒傷乳者或時發熱發熱有退時熱退後但復熱或夜間熱者此傷乳食也夜熱者由宿食在小腸當暮發熱明日復止諸家所說夜熱各自不同皆有應驗食疳亦能夜熱傷寒失解亦能夜熱風傷脾胃亦能夜熱寒熱者陰陽盛也先寒

而後熱陽不足先熱而後寒陰不足寒多而熱少陰勝陽也熱多而寒少陽勝陰也寒熱相半陰陽交攻也寒熱隔日陰陽乍離也陽盛發熱陰盛發寒寒而頰赤陰中有陽邪也熱而面青陽中有陰邪也寒而面青陰中有陰邪也熱而頰赤陽中有陽邪也其有頭疼汗出者有陰邪也寒而面赤陰中有陽邪也其有頭疼汗出者有嘔吐不食者有增寒而飲水者壯熱而欲湯者有筋骨疼痛者或秘或瀉或內寒而外熱或內熱而外寒又有寒而腹中痛熱而腸中鳴是有食積也大抵寒熱因於露風或觸暑毒致陰陽不順邪正不和逆順之法當從乎天地順乎陰陽順之則安逆之則危小兒寒熱多因食積而得當下之次用補助先寒後熱寒多熱少小柴胡湯加桂先熱後寒熱多寒少用白虎湯加桂寒熱相半小柴胡湯壯熱者亦由血氣盛實五臟生熱邪火蒸鬱於內則眠臥不安精神恍惚薰發於外則連滯不已舉動驚惶表裏發熱則煩躁喘麤甚則發癰也潮熱者因其解脫風邪所傷客於皮毛入於臟腑則惡風發熱呵欠面青目澁

多睡陽氣有餘身熱無汗陰氣有餘身寒有汗陽氣有餘無

寒而寒陰氣有餘素問云汗出而身熱者風熱也錢氏論云風溫潮熱

者時而發熱過時即退來日依時發此為熱壯熱相以

潮潮則發驚也壯熱者一向熱而不已甚則發驚癇也

風熱者身熱口中氣有風熱渴壯者但溫而不熱也急

飲乳者不能食者由客熱入兒脾流入心脾經即舌厚

唇生瘡下盛則腰腿癰腫表裏俱盛則精神恍惚煩

赤口乾大小便澀過身體發熱下之即退有後熱者是

裏熱已去表熱未退汗之則解表熱去後再熱者表裏

俱虛陽浮於外陰沉於內所以又熱者乃虛也因傷寒

及諸熱汗下之後去津太過氣血未調食飲勞傷致令

虛熱困倦少力具有久嗽久瀉久痢久血久瘧致諸疾

之後而成者皆虛熱也凡病久者則氣血虛氣虛則發

厥血虛則發熱血氣虛則身熱而手足厥冷熱者由乳

母好食肥膩恣食甘酸或喜怒氣浮醉飽勞傷乳兒遂

成疳熱或兒食無常生冷過度致令骨熱不除羸瘦煩

渴頰赤面黃不長肌肉凡疳食之熱先起於腹背皮膚

欽定四庫全書

卷三百八十四

五

不堪熱近之骨間如火或睡中有汗久變疳勞者渾身

如火手足如冰孫氏云骨熱如渴蒸瘧熱者由兒不肯

食哺而但欲飲乳乳壅不能消化伏結腹中致成涎癖

塊也或痰嗽而驚或嘔逆而渴日中熾煎夜間啼呌辰

熱申涼與潮相類也先與白米散滋養津液次珍珠九

積血熱者每日已午間發熱而遇夜則涼是陽中有陽

血氣盛實也蓋血者榮也氣者衛也榮行脉中衛行脉

外營周不息已午者當心火用事之時也心生血氣行

至已午則陽氣盛陽氣盛則與正相擊故至期而發熱

非其時非血熱也客熱者為陽邪干於心也心若受邪

則熱形於額故先起頭面次而身熱恍惚多驚聞聲恐

悸良由真氣虛而邪氣勝邪氣勝真邪交爭發渴無時

進退不定如客之往來故曰客熱陽氏曰第一傷寒

塞井多涕呵氣漸傷肢此病非難治因知及早醫若

逢筋脉冷傷寒宜第二變茶熱唇上赤生光四

肢多熱毒涕乳亦為殃熱躁運啼哭煩當解腸涼三

旬餘兩日一度定非常第三食積熱氣急不尋常寒

熱常如瘧渴渴要壺漿與食頻煩躁多痰更滑傷寒

要合地外本是積為缺此候先當取積消熱只用平

欽定四庫全書

卷三百八十四

五

欽定四庫全書

卷三百八十四

胃散治之次常服進食九第四虛驚熱長啼汗出多
 糞青蒸吐乳而眼微雲和咬乳流涎出脚冷病難蘇
 若達頭仰視早治莫誑訖此候宜服薄荷散并紅錦
 散急退熱解驚可以療之第五麻豆熱赤麻豆出將呈
 目時寒熱起困食不名耳冷服天行之病又乃時呈
 或時寒熱起困食不名耳冷服天行之病又乃時呈
 溫涼藥治之法與傷寒相此後當發散使毒氣出
 則出細氣在臟發也若無散便是傷寒又熱變成
 惡證十死八九小兒瘡癤出之熱腹痛而腮赤呵欠
 眼困眼淚多膿乃瘡癤欲出之候急與解肌散二服發汗
 三服如未有前證則不可用先與解肌散二服發汗
 使氣出散毒如汗後熱退只用升麻湯汗後尚熱宜
 平瘡出瘡癤如已見兩三點於皮膚加紫草少許如熱
 平瘡出瘡癤如已見兩三點於皮膚加紫草少許如熱

欽定四庫全書

卷三百八十四

夾宿寒故也而人有小兒壯熱者是熱氣薰發於外故
 令身體壯熱其發無漸大體與溫壯相似有小異者熱
 加甚也此候宜服輕藥惺惺散羌活散皆可如有宿寒
 宜服四味理中湯加桂煎服若有伏熱宜服五苓散并
 白虎湯二藥俱效 有驚熱即有風熱此言驚風熱又
 有邪熱乃感風成病類同傷寒熱又傷寒熱類同瘡疹
 熱又瘡疹麻豆之有餘毒作熱傷寒後亦有餘毒作熱積
 熱有同瘡熱又有膚熱其信如潮總曰潮熱潮發有期丹
 熱瘡熱不類諸證血熱即遍體生瘡疥癩疥癬痒及重
 發作丹毒龍帶之屬骨熱即外冷內熱其病骨蒸熱也
 實熱即氣脉壯實五臟氣充大便硬少或閉不通虛熱
 三焦不順五臟不和欲作疳候啼哭煩躁夜出虛汗或
 瀉疾後有熱三焦熱即上膈虛煩作渴煩赤驚悸夜夜
 啼哭睡中言語五心熱虛煩多驚小便赤澀睡不安穩
 氣匱或作瘰癧肝經熱眼目赤腫疼痛多淚羞明或筋
 脉拘急有夾風痰肺經熱鼻塞生瘡不聞香臭或餘毒

體熱名曰溫壯大便黃而臭者內有伏熱大便白而酸臭
 伏熱挾宿寒皆傳於胃致胃氣不和留滯壅塞故蘊積
 不宜服藥命兼急宜服惺惺散要加南星白附子
 溫壯者由臟腑不調內有
 八風風熱就起早還涼藥水無時度病飲亦知其積
 多喘呼候氣急宜為昌志宜頻進藥莫待服驚張此
 候乃瘡作而朝涼夜熱即宜用金星九或氣弱不
 宜服藥命兼急宜服惺惺散要加南星白附子
 溫壯者由臟腑不調內有

不散胎熱兒在胎中受母食毒榮衛不順有餘毒之熱發作衆疾或從降生之後常作熱證傷寒後餘毒熱雖曾解表餘熱傳脉或入經絡久而不散瘡疹餘毒熱其兒多患瘡大瘻皆因有餘熱留滯在百脉之間項上生核作熱軟大微紅者名驚氣核更有大小相連長短相雜者是為餘毒熱亦名驚瘡初生乳幼者患之三焦蘊熱毒攻咽喉之外名疳熱氣血凝滯經絡不行熱毒攻注故生癰癤麻豆作熱類似疹候麻子乃腑受病屬陽故易調理雖不服藥亦能自愈只恐喫毒冒風為之逆也又或襲溫熱毒氣致令小兒添時氣之症未經患瘡疹者即薰蒸之相搏也皆作是疾小腸熱心經不利小便淋瀝或胃脘內疼痛胃熱作氣口臭或發嘔逆不思飲食亦有胃家虛熱得之脾熱口苦昏困喜睡困喫食毒物積聚在脾不化脚稍冰冷邪熱肺經或受寒邪陰陽二氣不正痰涎咳嗽寒熱謂先寒後熱其狀如瘧乃虛中有積凡兒患瘡癰癤皆作寒熱潮熱傷風熱鼻

聲重頭疼脚熱類如傷寒候傷暑熱煩躁引飲頭目昏重時正盛暑或曾感冒榮熱即血熱也衛熱即氣熱也榮衛不順即血氣不相參虛之致也筋熱咬指甲見血腎熱病作崩砂齒黑斷爛以至馬疳極候煩熱即啼之不已躁熱即哭之不已皆由三焦不順心中積熱虛煩躁悶變蒸熱只在五百七十四日之內三十二日一變六十四日一蒸在其數發作者應也大腸熱肺家有熱在裏流入大腸秘結不通癰疹熱乃是肺經有風在表肺主皮毛故生癰疹風痰熱因感風生痰在上膈久不化熱吐逆惡心驚氣熱良由小兒受驚其驚氣不散留在上膈無得自化故作熱毒攻在順項之間肚熱即是積熱證若加脚冷當與下之客熱初生之兒親戚外來兒觸其邪以亂其正故作熱癰熱驚風不散聚在經絡或入臟腑其候常發不省人事痰涎熱驚之所受入經未傳散畧作搐搦小兒有病惟熱最多明理論曰發熱者怫怫然發於皮膚之間煖然散而成熱也輕重不思

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

有所謂翕翕發熱者若翕所覆明其熱在外在表屬乃風寒客於皮膚陽氣抑鬱所致宜發汗而散之所謂蒸蒸發熱者謂若薰蒸之蒸明其熱在內屬裏乃氣下陷而入陰中也法當攻下以滌之表證未罷邪氣傳裏裏未作實是為半表半裏之間則表裏俱發熱又輕於絕在表也發熱惡寒發於陽也無熱惡寒發於陰也陽明裏實熱盛當攻之以裏大陽風寒外搏陰盛惡寒雖熱尤當溫散少陽宜和解雖屬小柴胡湯如微熱不渴又

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

夫升降陰陽則來復母三九薄荷湯研下小兒表裏俱熱面黃頰赤唇燥口乾小便赤澀大便秘黃先以四順清涼飲為之疏利其熱即去既去而復熱者裏已消而表未解也隨當用惺惺散或即用紅綿少加去節麻黃以取微汗則表熱盡除其或裏已解而熱又屬表裏俱虛氣不歸元陽浮於外不可再用涼藥再與解表當為和其胃氣使陽斂而身體大涼參苓白朮散姜棗粳服熱重者用銀白散

朱監薄子歲忽發熱醫曰此由心熱肥赤唇紅煩燥引飲遂用牛黃

九三服以一物瀉心湯下之朱曰不愈反加無力而不能食又下之便利黃沫錢曰心經虛而胃中津液以生犀角散治之朱曰大便黃色如何錢曰胃氣正即瀉自止虛熱也朱曰需用瀉心湯如何錢曰瀉心湯者惟黃連虛熱若實熱何以瀉心瀉下之不安又如面黃煩赤五心煩燥不食而引飲醫曰既虛熱何大便秘沫錢笑曰大便黃沫者多服瀉心湯故也錢後與胡黃連九治愈藍簿子五歲夜發熱晚即如鼓栗醫有作傷寒者有作實熱者以涼藥解之不愈其候多涎而加腫他醫以鐵初因去涎病益甚至五日大引飲錢氏曰不可下之乃取白朮散末一兩煎藥汁三升使隨其意取足朱曰飲多不作瀉否錢曰無生水不能作瀉不足清也但不可下耳朱曰先治何病錢曰止瀉治痰不渴神昏此藥也至晚服盡錢曰更可服三升又煎白朮散三升服盡得稍安三日又服白朮散三升其子不渴無涎又投何

欽定四庫全書

卷三百八十四

膠散三升服而安鄒人齊郎中者家好執藥散施於人
其子或感熱自取膏三服併一服而解之服膏金
至三服五行其子困睡齊言子睡多亦驚或與膏金
膏一服又渴二行加口乾而身熱錢氏曰或與膏金
命多煎白朮散時服之後又用香炭九十三日乃
愈皇都徐氏子三歲病潮熱每日面則發身微熱而
目微露睛四肢冷而喘大便微黃錢氏與李醫同法錢
何曰病何據則有風厥心熱內何喘曰據之甚也曰何
以治之曰建經九鼻中澀之必搗之錢又問曰既胃風
病壯搗引目斜露睛內熱冷及搗甚實也故今搗也
治之李曰皆此藥也錢曰不煎搗者肺實也故今搗也
目斜微露而身微熱者肺潮熱用事肺主身也熱也為
肺虛熱所以目微斜露睛者肺潮熱相勝也股冷者脾虛
也肺若虛甚母脾亦虛水氣乘脾四肢即冷治之當先
用益黃散阿膠散得脾虛調和退後以瀉清九道赤散
涼驚九治之後九日愈切初新書云巢氏病源曰張戶
侍其子女歲猶結聚已經年矣其候腹滿壯熱大小便
則不食諸藥皆云虛熱作胃寒下食既不能食自熱
大小便少或作疳熱有藥俱試而無一日當服廿次大黃
日間未扣或作疳熱有藥俱試而無一日當服廿次大黃
強其說言以前諸生逆我者死侍郎云吏有無甘遂而
次於藥力者可否余護令即服大承氣湯二服而愈次
日見之尚餘滓實必過數日再投以閉藥前藥始可除
根數日復然再五歲六月結再投以閉藥前藥始可除
一醫作傷寒治用溫熱藥取汁不令見風治之三日其
證熱盛狂躁煩渴昏悶驚搐作驚見證變以珍珠九下
痰熱後用驚藥又易一驚作豆搐有作急者伏熱生痰
潮搐神昏怕明驚大便秘而常息視之曰伏熱生痰
燥多憂見食悲向明情不樂入暗稍相宜無故閉雙目

欽定四庫全書

卷三百八十四

時時動四肢渴燥尋冷地毒作驚危足不見兒怕明就
時時赤面紅唇口乾燥身熱煩渴手足不冷他處冷
處持水而飲見水欲飲按於內知其者然之甚也以甘
露散雪水或新汲水調二錢再須冷服飲七分生須潮
熱稍輕進之一服更以白虎湯調服半盞少時煎藥
相濟強疾三日即思飲食後以白虎湯調服半盞少時煎藥
驚藥何據定也答曰孫氏云熱名不安煩久而驚風多
不定引於肝風熱相搏所以知其潮搗也蓋因暑熱深甚心
不定引於肝風熱相搏所以知其潮搗也蓋因暑熱深甚心
而安若認爲驚風則無效後之春胃所以暑熱深甚心
錢唐石三觀國子五歲六月身熱心躁煩渴吐逆而
不食名三五醫家俱作傷寒用溫熱藥取汁不令兒見
風治三日其證熱盛狂躁喘鳴胸膈涎流吐逆不令兒見
聲手青唇黑面黑多汗驚搐神昏狀若角弓反張惡視曰
暑毒傷心狀若驚頭赤熱渴煩燥無聲昏沉喘涎視曰
微汗手足搐搦服間晴此乃暑毒發驚非聲寒也以甘
露散下偏銀九醫曰寒胃增過主人曰何知傷風暑答
曰傷寒者惡寒伏暑者惡熱蓋見兒身熱神昏驚搐大
飲水不食而死文問吐逆不食如何答曰暑毒發驚所
作不食亦胃熱不食也主人聽之令兒就地暑毒發驚所
水近風涼遇以甘露散水調送下偏銀九自與腥散升
不疾而愈矣亨秀才調治三歲身熱微汗惡視之具目睛
麻風鼠赤湯并驚神恍惚大便如常惡曰風熱也主人曰
青解脫赤湯并驚神恍惚大便如常惡曰風熱也主人曰
何知風熱答曰素問云汗出兒身熱微汗惡視之具目睛
目即之問曰素問云汗出兒身熱微汗惡視之具目睛
水寒而靜故為陰風而燥生其病風熱盛則引於肝風
而波生大性生心火生則肺金鎔故風火相搏則正
肝有風則心火生心火生則肺金鎔故風火相搏則正
壅而驚搐當以驗風膏連進三服風止則大減火減則

金堅於是乃史與琰珠九下涎後不再服驚藥驚搐即定也主人曰何不用驚藥而更安對曰已涎退肝風熱心大即自戒墮下肺經逆驚風方始安對曰渴涎止沸不若絕其火利瀉痰涎不若清其源大抵治病不可究其源也小兒四歲六月中秋熱心躁大便如常與四順飲三服微利熱或再日復作未與四順飲雖大便如常黃熱微從末日舌白乾躁仍舊潮熱自此通日四順飲雖大便利十余日纔瀉退來日依然大柴胡瀉澤而熱減未日復熱自得其病用藥瀉辛月餘日尚未除若更瀉則生患否愚曰能久勝寒藥必有火熱能久服熱必有大寒此而又勝寒藥熱尚未退知有大熱甚明瀉之不妨與調胃承氣湯連三服瀉數次尚未全除又二服自此五日服承氣湯連三服前後二十日全除服之始熱除後忽左膝疼伸縮艱難將結痲又無紅腫處但筋骨間疼行力不能用藥淋洗膏藥貼治十餘日不退遍尋小兒方書皆無此證惟有異童

寶鑑云風冷寒筋四肢全不仁疼因失冷熱痠是過
生又無治法也素問云風冷寒筋四肢痠熱氣血則痛
痺不仁寒寒氣傷形故為腫痛又云寒傷形熱氣傷
形痛傷腫亦無治法思之病在筋則屈而不能伸病在
骨則伸而不屈風冷傷筋骨則疼困閱其藏方左經
九稱手足膝腕軟不能行立治愈遂合二服即減三分
通日進服十餘日如舊復有一兒十餘歲麻脫痰
較舉動呻吟與左經九乳膏洒下三兩服即時全效又治
熱涼同病身熱強直者欲作急驚肝經風熱驅風膏四
順飲或加細辛或加獨活兼用涼藥身涼強直者欲作
慢驚肝經虛風神寶丹虎珀散續命湯若大便秘實無虛
證驅風膏琥珀散身熱不能食者脾胃熱不能食必大

使堅或焦黃四順飲或洗心散八正散身涼不食者脾胃
氣虛或因吐瀉後以益黃散并食藥或傷食不食必噉
哺與食藥如大便秘不化紫九下後補脾身熱飲水者
熱在內或中暑吐瀉而渴者五苓散香薷散白虎湯甘
露散便堅或寒邪所作四順飲身熱不渴熱在外宜解
表薄荷麻黃黃芩湯活人書云身熱不渴表有熱小柴
胡湯加桂身熱有渴不啜水但要湯者是內寒故也五
苓散姜棗煎連進則退身涼飲水者因吐瀉失亡津液

多與白朮散如大渴不止龍涎散藕漿散魚涎散擇用之或以史君子湯加訶子汁身熱身黃者傷寒小便不利必發黃茵陳湯并煎茵陳汁調五苓散三四服立效身涼身黃者瀉黃散散痞熱并三黃九如大便秘前牽牛子汁吞下與取食積藥下之後并益黃散身熱咳嗽者寒邪在表無汗而嗽五味子麻黃湯洗心散潤肺湯涎盛鉄粉九下之嗽而有汗羌活散惺惺散鼠粘湯涎盛下之有傷食嗽其狀嗽嘔下之小兒嗽證下之立効

欽定四庫全書

卷三百八十四

五

參朮散人參九更於嗽方中擇用之身涼嗽咳者寒邪在內肺失解潤散致冬散胃冷嗽喉中呀呷乳食不化因胃寒肺冷人參九又因久嗽咯膿血者肺虛難治補肺散阿膠散如久嗽膿血喘急聲啞膿如黃疱瘡內膿者必死又一等因傷暖嗽急咯血者易治栢枝散犀角地黃湯胃冷嗽不因風得名胃嗽霍香散身熱喘急者麻黃杏仁散湯五味子湯潤肺散身涼喘急者蘇子阿膠散甚者疑氣杏霜九人參九身熱有痰者小柴胡湯

欽定四庫全書

卷三百八十四

五

苓散黃龍九身熱嘔吐者妙九子感應九消食藥微微送下後沉香九身熱洩瀉者黃龍九五苓散香需散杏仁九身涼洩瀉者千金九益黃散人參膏川椒九身熱吐瀉五苓散香需散黃龍九白虎湯身涼吐瀉者千金九金粟散升如聖九飲身涼下痢者小車九阿膠九如聖膏金粟散身熱瀉血者胃風湯刺蘇湯三效散五倍九身涼瀉血者訶灰散箭葉桂心散三效散身涼衄血者栢枝散藥皮散龍胆九身熱衄血者犀角地黃湯青苔散并龍胆九身熱吐血者黃芩膏獨金散桂心散身涼吐血者桂心散秦光散刺蘇散身熱淋瀝者王漿散立效八正散桃膠九身涼淋瀝者龍香九桃符九身熱自汗者麻黃散參芪湯鼈甲九粉汗九身涼自熱者參煎散鼈甲九參朮散黃芪湯粉汗散凡驚熱癩熱驚風氣熱癰癧熱客忤心熱傷寒熱傷風熱傷暑熱夾食熱疳熱虛熱煩躁熱筋熱骨熱腎熱以上並宜與服葱根脫甲散風熱痰熱變熱蒸熱肝熱大腸熱癰瘡熱並

宜加麥冬丹熱食熱三焦小腸熱龍帶熱並宜加大黃

及燈心瘡癰疹熱麻子食已出證熱溫氣熱未出證熱

並宜加紫草川芎當歸餘毒熱胎熱肺熱傷寒後餘毒

熱瘡疹後餘毒熱並宜加薄荷項上生核作熱乍顯熱

癰癰毒熱並宜加大黃朴硝以上宜服大連翹飲子隨

證加前件湯使潮熱榮熱衛熱瘴氣兩日一發三日一

發熱積熱脾熱胃熱痞熱肚熱瘧熱邪熱寒熱脾熱瘧

鬼瘧夜發單瘧獨熱以上宜服梨漿飲子八種虛痢作

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

十九

熱吐熱瀉熱霍亂吐瀉熱以上並宜服正氣丸調胃散

調助胃氣不可以涼藥退熱補胃氣和其熱自散虛中

積熱腹痛積熱以上並推下積

方

龍膽湯 治因胎驚月內氣盛心驚發熱足胎風撮口

壯熱皆可服

龍膽草 鈎藤 柴胡 赤芍藥 茯苓 甘草

各半 兩 蛻娘翅足大黃 一錢溫紙 黃芩 一錢 防風

麥門冬 去心各一錢

右吹咀每服一錢水一小盞北棗二枚同煎七分

凝神散 出永類 收飲胃氣清涼肌表

人參 白朮 茯苓 山藥 白扁豆 粳米

知母 生地黃 甘草 淡竹葉 地骨皮

麥門冬

右吹咀每服二錢水一鍾生薑二片棗子二枚煎至

七分去渣不拘時服 凡經汗下熱已去而復作者

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

十九

由表裏俱虛氣不復元陽浮于外熱自發也非實熱

證當和其胃使六陽真氣復歸于內身體即涼凝神

散一方神異所施輒效不可不知也

寒水石散 出千金方 治小兒身熱不能服藥粉兒方

寒水石 芒硝 滑石 赤石脂 青木香 大

黃 黃芩 防風 麻黃根 石膏

右各等分為細末蛤粉一升藥末三合相和再篩細

粉兒日三外臺以牡蠣代防風餘並同

清解散

一名散毒散
出直格方

治感風發熱頭疼鼻汗流涕無汗

惡風溫壯噴嚏

北參

防風

天麻

北前胡

茯苓

北梗

錢二

錢二

錢二

枳殼

甘草

各一錢

細辛

柴胡

各一錢

川芎

錢三

右末每服一錢

小蓋薄荷乾三葉略煎溫和服

五服化毒丹

出和劑

治小兒

溫積毒熱驚惕狂躁煩赤

咽乾口舌生瘡

夜臥不寧

謔語煩渴頭身體多生瘡

癖服此清膈涼血

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

三

右為末入研藥令勻

煉蜜為丸每兩作一十二丸

每

一歲兒

一丸分服用薄荷水入研化下及瘡疹毒上

攻口齒瘡生犀角水下涎血臭氣以生地黃自然汗化

一九用雞翎掃安口熱疳內黃瘦雀目不見物陳粟

水泔水下食後卧時服

清涼飲子

出仁

治小兒由將養乖節或犯寒暑乳哺失

時乍傷饑飽致令血氣不調傷胃不和或發寒熱散

變驚癇小兒血氣脆弱病作變動證候百端若見其

證即使治之使不能成聚病治之若晚其病即成至

羸瘦而難療此藥主兒百病變蒸客忤驚癇壯熱分

解涎壅躁悶煩渴項頸下熱頭面生瘡痂

大黃

連翹

生

芍藥

生

羌活

生

當歸

炒

草

山梔

去仁

各

右為咬咀每服一大錢水半蓋煎至三分去滓不計

時候

牛黃膏

醫方

治小兒熱及傷風溫壯疳熱引飲

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

三

牛黃

一錢

甘草

末

川甜硝

分

腦子

一錢

寒水石

研

鬱金

末

萊豆粉

半

右為末研勻煉蜜和九薄荷水化半皂子大食後服

地骨皮散

出醫方

治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

知母

柴胡

甘草

炙

人參

地骨皮

赤茯苓

半夏

湯泡

各

右咬咀每服二錢水一盞薑二片煎食後溫服量兒

大小加減

洗心散

出全
嬰方

治小兒遍身熱頭目碎痛背膊拘急火熱

上衝口苦唇焦夜臥舌乾喉腫痛涕唾稠粘痰壅氣

粗乳食不進心神躁熱眼溢睛痛傷寒四肢沉重語

聲不出百骨節疼大小便不利楚瘡豆疹時行瘟疫

狂語多渴及治天吊驚風

大黃

甘草

當歸

赤芍藥

荆芥

白朮

一麻黃

去節七兩活
人書用四兩

右咬咀一錢水半盞生薑薄荷煎服了仰卧仍去枕

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

三

少時如五臟壅實煎四五錢若要澹轉則熱服

靈砂歸食丹

治小兒臨積邪熱潮熱不除頰赤口乾

心膈躁煩痰涎不利睡卧不安或發驚癇潮涎潮搐搦

又療積滯不調不利多日腹中疔痛煩渴嘔噦服藥

調和不能愈者並可服之

牛黃

龍腦

麝香

膩粉

辰砂

金箔

研九
十片

巴豆

去心膜皮炒熱研如
面油三百一十五粒

右合研勻煉黃臘六兩入白沙蜜三分同煉合勻為

九如萊豆太母服二九金銀箔薄荷湯下更量兒大

小加減如驚癇搐搦用腦膩粉蜜湯下服藥先以冷

水浸少時服見效尤速

人參

前胡

退餘熱及寒熱往來

半夏

黃芩

前胡

人參

桔梗

甘草

兩

右咬咀每服二錢水半盞生薑三片棗子半枚煎至

二分去滓服一方不用棗煎一方治瘧加地骨皮

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

三

大黃散

出十
金方

治小兒腹大短氣熱有進退食不安殺不

化

大黃

黃芩

甘草

麥門冬

芒硝

石膏

兩桂心
二錢

右咬咀以水三升煮取一升分三服甚歲以上下小

兒作五服服之

天竺

飲子

出和
方

治大人小兒臟肺積熱煩躁多渴舌煩

生瘡咽喉腫痛面熱口乾目赤鼻衄丹瘤結核癰瘡

腫痛又治伏熱暑氣煩躁疹瘡餘毒及大便下血小

便赤澀

方見精熱痢
冷門諸熱類

清肌散

出醫方
妙選

治小兒初春不問有病俱宜服疎積

熱

當歸

川大黃 微
泡人參 去蘆各
一兩

犀角末 芍藥

甘草

各半
兩

右咬咀每服一錢水一盞入生姜三片竹葉二片同

煎五分去滓溫服乳後大小加減

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

犀角人參湯

出和
劑方

治小兒虛熱及吐瀉煩渴不止及疎

轉後並宜服之

生犀

二錢
半 人參 十
兩

茯苓

二十
五兩

甘草 五

桔梗 乾

葛

各二
兩半

右為細末每服一大錢水一盞入燈心五莖同煎六

分溫服不拘時候若煩渴入新竹葉同煎

大黃湯

出十
金方

治小兒肉中久挾宿熱瘦瘡熱退休作無

時

大黃

甘草

芒硝

各半
兩

桂心

石膏

一
兩 大棗 五
枚

右咬咀以水三升煮取一升每服二合

生犀散

出錢
氏方

治小兒熱

生犀

錢
末

地骨皮

目
錄

赤芍藥

柴胡根

乾葛

各一

甘草

半兩
炙

右為麤末每服一二錢水一盞煎七分食後溫服

云此妙陽
明相分也

治小兒熱

葵菜子煮半生搗取汁含之亦可作蘇蒸

欽定四庫全書

普濟方
卷三百八十四

食之

李根湯

出切
新書

治少小暴熱得之二三日

李根

葱

芒硝
各二
分

甘草

麥門冬

去心
各
四兩

右以水三升煮一升半為三服一方有桂無葱

李葉湯浴

出千
金方

治小兒身熱用李葉無多少咬咀以水

煮去滓將浴兒良

柳枝浴湯

出千
金方

治小兒生一月至五月乍寒乍熱

用柳枝細切煮汁以浴兒若渴更用冬瓜絞汁服