

血痺虛勞病衄并治第六

問曰。血痺病從何得之。師曰。夫尊榮人。骨弱肌膚

重。因疲勞汗出。臥不時動搖。加被微風。遂得之。但以

衄自微瀋。在寸口關上小緊。宜鍼引陽氣。令衄和緊。

去則愈。

吳子曰。歷節傷氣故痛。血痺傷血。但麻木。文按痺閉也。血中有邪。陽氣不得宣通。故用鍼。

血痺。陰陽俱微。寸口關上微。尺中小緊。外證身體不



仁如風痺狀。黃耆桂枝五物湯主之。黃耆桂枝五物

湯方。黃耆芍藥桂枝各三兩。生薑六兩。大棗十二枚。

右五味。以水六升。煮取二升。溫服七合。日三服。一方

有人參。有此一。句。足見仲景所用。皆現成古方。稍有

加減。必自申明。慎重古制。如此。文故曰。仲景

乃用方之聖。非

製方之祖也。



虛勞

夫男子平人。脈大為勞。極虛亦為勞。○寸口脈浮而遲。浮即為虛。遲即為勞。虛則衛氣不足。勞則榮氣竭。

此條錯簡在第十四消

人年五六十

未五

文按當是人年未五十，必是寫

誤。何也。人老火衰。

其病脈大者痺。

痺閉氣血不循經脈流行也。

俠

成勞者。文罕見之。

背行。

氣血不流行。故背曲不直。

若馬刀俠瘰者。

痺於經背微曲，痺於絡成惡瘡也。



皆為勞得之。

皆氣血不足致腠理及空隙處，為微邪所踞，曲背刀瘰，證作矣。

○馬石 文按

生於兩腮後如馬蹄刀瘰，今之粟子筋流串，軋鴨蛋，石疽之類，此等皆以少用心思，逍遙自尋快樂，血氣復原，自愈者不少。若信市醫忌口，外敷諸藥，內服消散湯劑，必致腫潰，一二年而死。文附二方於左。若初起結塊，或似核，急用火硝、硫黃生半、夏三味等分，加飛麵少許，置播盆內，加好燒酒拌勻，汾陽燒酒尤妙。打五千下，燉熱之，以手力揉塊核上，必揉的塊核根盤活動了，乘熱塗上藥，約半寸厚，包好，勿令脫落，明日加燒酒再打，再如法塗，凡七晝夜，勿脫落，其中發極痒，藥性到了可消，但治以早為貴，久患者難效。又

若已穿破，但流滋水薄膿者，用蘆甘滑石并藥底生  
甘草各一錢，銅綠一分，研極細末，收磁瓶內，每日  
指乾滋水，搽少許於破口上，貼藥店買的清涼膏，每  
日勤指滋水吃，滋補肉食，切忌吃藥，及市醫方藥，及  
仙方單方，必實心行一二三  
年方效，奈富紳人不余信也。勞之為病，其脉浮大，手  
心熱，故喜聽霜降信炮。足煩，春夏劇，秋冬瘥，陰虛精自出，酸削不能行。○男

子，脉浮弱而瀦。

大而無力。

為無子，精氣清冷。○夫失精家

少腹弦急，陰頭寒，目眩髮落，脉極虛芤遲，為清穀亡



血失精。脈得諸。孔動微緊。男子失精。女子夢交。○脈  
弦而大。弦則為減。大則為孔。減則為寒。孔則為虛。虛  
寒相搏。此名為草。婦人則半產漏下。男子則亡血失  
精。桂枝龍骨牡蠣湯主之。桂枝加龍骨牡蠣湯方。桂  
枝芍藥牡蠣生薑各三兩。甘草龍骨各二兩。大棗十  
二枚。右七味。以水七升。煮取三升。分溫三服。  
四條承上脈大



為勞詳其脉

失精臨臥時並緊兩足提吸丹田氣

證以出治法

○三口令上升乃臥又手心擦兩足心

又夢遺了切勿胆怯恐傷腎反致連遺同房一次反

可不遺若久客或男子及時不娶每多此證非病也

慎勿服金鎖固精蓮鬚金櫻膏仲景

男子脈虛沈弦

為陰虛不能藏陽者而設非瀦精也

無寒熱短氣裏急小便不利面色白時目瞑兼衄少

腹滿此為勞使之然○男子面色薄者主渴

舌每無津液也

及亡血卒喘悸男子平人脉虛弱細微者善盜汗也



方書盜汗屬陰虛。屢治無效。文用芍藥附子甘草湯。加黃芪桂枝愈。脈沈小遲。名脫氣。

其人疾行則喘喝。手足逆寒。腹滿甚。則溏泄。食不消。

化也。○虛勞裏急。悸衄。腹中痛。夢失精。四肢痠疼。手

足煩熱。咽乾。口燥。小建中湯主之。虛勞裏急。諸不足。

黃芪建中湯主之。黃芪建中湯方。於小建中湯內。加

黃芪一兩半。餘依上法。若氣短胸滿者。加生薑。腹滿





者去棗加茯苓一兩半及療肺虛損不足補氣加苓

似有闕文

夏三兩

四條承上極虛為勞明脉證出治法文按義訂正之

半夏得生薑苓芪大補胃氣

虛勞腰痛少腹拘急小便不利者八味腎氣丸主之

腎氣丸利小便之神劑六味丸潤大腸之妙藥

虛勞虛煩不得眠酸棗湯主

之酸棗湯方酸棗仁二升甘草芎藭各一兩知母茯苓

苓各二兩石五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸



藥煮取三升分温三服。文取蓮子心八九根食益約五分許開水泡涼之服臨臥

再服。五勞極虛羸瘦腹滿不能飲食。緩中補虛。言皆裏氣虛所

致當以建中。食傷憂傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡諸法補虛。

營衛氣傷內有乾血。七種傷均能阻氣血蓄於人之藏府經絡非指婦女乾血勞也

肌膚甲錯兩目黯黑。大黃廩蟲丸主之。瘵不去新不生榮衛不能

澤肌膚故甲錯。大黃廩蟲丸方。大黃蒸十分黃芩二兩甘草

三兩芍藥四兩。乾漆一兩。

燒枯

乾地黄十兩。杏仁桃仁

蝨蟲蟻螬各一升。麤蟲半升。水蛭百枚。右十二味末

之。鍊蜜為丸。小豆大。酒飲服五丸。日三服。○虛勞諸

不足風氣百疾。

說不盡許多病情，故曰百疾，不能一定也。

薯蕷圓方主之。

薯蕷圓方。薯蕷

山藥

三十分。當歸桂枝乾地黄豆黃卷

各十分。麴甘草二十八分。人參七分。白朮川芎芍藥



麥門冬杏仁各六分。柴胡桔梗阿膠七分。乾薑三分。

茯苓五分。白藜二分。防風六分。大棗百枚為膏。右二

十一味末之。煉蜜和丸。空腹酒服。一九。一百丸為劑。

風字內虫字。風氣生虫。此虫勞也。用杏仁白藜去風殺虫。文按仲景論勞。虛則建中腎。八味。心。酸棗。未嘗有云必死者。乃今之勞最速者。百日。或一二年。何也。蓋居心比人深刻一層。而不得其正。自作孽。名孽。勞病後。或小有病。信市醫。開洩。藏氣。藥毒晚發。名藥勞。先天不足。童年得之。名天勞。此三者不治。



肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證并治第七

問曰熱在上焦者因欬為肺痿肺癰之病從何得之

師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從

便難又被快藥下利重亡津液故得之痿猶草木之少雨露而枯

痿也重亡津液是病根文妄擬生津液方人參麥冬

甘草白芍桂枝生薑法半夏等分研為丸每丸重一

兩日煎一丸去渣加冰曰寸口脈數其人欬口中反

糖阿膠再煎烱勻三服

市委雅

百九



有濁唾涎沫者何。師曰為肺痿之病。若口中辟辟燥。欬即胸中隱隱痛。衄反滑數。此為肺癰。欬唾膿血。脈數虛者為肺痿。數實者為肺癰。○問曰病欬逆。衄之何以知此為肺癰。當有膿血吐之則死。其衄何類。師曰寸口衄浮而數。浮則為風。數則為熱。浮則汗出。數則惡寒。風中於衛。呼氣不入。熱過於榮。吸而不出。風

傷皮毛。熱傷血脉。風舍於肺。其人則欬。口乾。喘滿。不

渴。時吐濁沫。時時振寒。熱之所過。血為之凝滯。畜結

癰膿。吐如米粥。始萌可救。膿成則死。此下原文有肺癰喘不得臥。葶

藶大棗瀉肺湯主之。方葶藶熬令黃色。搗光如彈子。大棗十二枚。右先以水三升煮棗。取二升。去棗。內葶藶。煮取一升。頓服。又肺癰胸滿脹。一身面目浮腫。鼻塞。清涕出。不聞香臭。酸辛。欬逆上氣。喘鳴迫塞。葶藶大棗瀉肺湯主之。方證不合。市醫屢用殺人。譌文也。余刪之。附錄於註。而不讀。文按葶藶大棗湯為支



飲不得息主方也。文用苡薏仁附子敗醬散煎服。治肺癰神效。方內加西洋參生甘草連喬壳食鹽。曾愈多人。市醫反笑余以肺癰作腸癰。余未暇與之多辯。只求病好而已。有用陳芥菜露。惜必再發。效而

胸滿振寒。衄數。咽乾不渴。時出濁唾。腥臭。久久吐膿。如米粥者。為肺癰。桔梗湯主之。桔梗湯方。桔梗一兩。

甘草二兩。右二味。以水三升。煮取一升。分溫再服。則

吐膿血也。

此正治肺癰方也。惜桔梗已絕種。市中以他藥代之。故亦屢用不效。不若多用苡薏





仁勿炒連根煎  
湯常服尤妙

肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必

遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此為

肺中冷必眩多涎唾甘草乾薑以溫之若服湯已渴

疑有訛

者屬消渴甘草乾薑湯方甘草四兩乾薑二兩炮右

咬咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服