



鐵

樵

新

著

傷寒論義



第一種第十六期

# 傷寒

## 論 第十六期

傷寒發熱。汗出不解。心中痞鞭。嘔吐而下利者。大柴胡湯主之。中玉函正脈作下方本汪本同

程云。心中痞鞭。嘔吐而下利。較之心腹濡軟嘔吐而下利爲裏虛者不同。發熱汗出不解。較之嘔吐下利表解者乃可攻之。竟用下藥。湯者又不同。況其痞不因下後而成。并非陽邪陷入之痞。而裏氣內拒之痞。痞氣填入心中。以致上下不交。故嘔吐而下利也。大柴胡湯雖屬攻劑。然實管領表裏上中之邪。總從下焦爲出路。則攻中自寓和解之義。主之是爲合法。丹云。案金鑑云。下利之下字。當是不字。若是下字。豈有上吐下利而以大柴胡湯下之之理乎。此說似是而實非也。所謂下利。乃是熱利。若改作不利。則與小便何別。可謂失考矣。

鐵樵按。程註以裏虛及表解兩條比較爲言。十棗湯有疑義。自不可同日

而語。大柴胡方中既有大黃。當然是裏實。且此所云心下痞。鞭。必是連及脇下者。云嘔吐必口苦者。蓋胸脇痞滿。方是柴胡的證。裏面是實熱而兼少陽。則口無不苦。經文簡單。讀者當自己理會也。至於金鑑改下利之下字爲不字。全書實無此句法。丹氏駁之甚是。然熱利何以當攻。亦一問題。鄙意旁流與協熱利皆體工反應之見。證腸胃皆主降。所謂降。謂使食物下行也。自食物下嚥。在食管中。卽起降之作用。其方法。食管之壁包裹食物處。略略膨脹。食物所在之上部管腔與下部管腔則較小。然食物上部之管腔收縮力甚大。下部之收縮力較小。如此食物下降則順。上行則逆。故下嚥不久。便達於胃部。至胃中則略停頓。以營消化工作。消化既竟。胃之迫食物下行。如亦食管胃腔上口收縮。下口開放。食物仍是上行。則逆。下行則順。繼此至十二指腸。再營消化之工作。是爲二次消化工作。二

收精華。使入血分。以成血液。與小腸相通之腎藏毛細管。承剩餘之液體。以事排泄。繼此食物入大腸。已成完全之糞塊。仍復迫之下行。至於直腸。以出肛門。故食物從入嚥起。至出肛止。一路下行。非由其重量爲地心吸力吸收而下行。乃生理作用迫之使下行也。從嚥至胃。其行速在胃中。因須營第三次消化工作。則停頓入十二指腸。因須營吸二次消化工作。則亦停頓入小腸。因須營吸收與排泄之工作。則行緩入大腸。因既成糞塊。亦行緩入直腸。則無復餘事。乃行速。胃下口曰幽門。有括約筋。司啓閉。凡食物之未完全消化者。不許通過。是幽門括約筋之設施。其目的在使食物得停頓胃中。而不致急遽下行。觀直腸之設施。可以悟大小腸之迴環曲折。因各種工作之未竟。有藉此迴環曲折。使其行迂緩。得各部份從容。竟其工作之意味。又從咽至胃。迫食物下行之方法。在上部收縮下部微弛。在胃與小腸。則收縮方法之外。更加一蠕動。在大腸則蠕動方法之外。

閉而積

傷寒論

第十六期

四

因大腸

不放便

腸胃吸收

便中黏液

金州李煥

更於腸壁放出液體濡潤之。以爲之助。故吸鴉片者。與患藏燥者。容易病。便閉與積聚。卽因大腸壁不但不放液汁濡潤。且吸收糞塊中黏液。致令非常燥結故也。又胃中之消化工作。乃磨礱消化兼化學消化者。十二指腸之消化。乃純粹化學之消化。胃中之胃酸。十二指腸之膽汁。胰液。其重要成分也。然觀於糞便中之有胆汁。尿液中亦有胆汁。則可知胆汁不但有消化作用。兼有迫令食物下行之作用。胆汁亦主降者也。因此可以悟得內經苦降之義。而川連所以能治嘔。正因胃氣上逆得苦則降之故。患肝病者。往往便閉。其甚者。致作噤嘔吐。皆因肝鬱。胆汁不能循常軌輸送。至十二指腸。第二次消化工作不健全。故胃逆。胆汁入小腸者少。糞便不能下降。故便閉也。至於泄瀉。就實地經驗言之。大都是寒感寒固泄。飲冷亦泄。再就藥効執果溯因以求之。泄瀉爲寒。因亦確理中之姜朮附子。

之事實也。西醫籍用藥大都無所謂寒熱。獨於泄瀉則謂與冷熱有關。謂冷則腸蠕動亢進。故瀉熱則反是。故滌腸當用略涼之水。熱則不效。顧腸之蠕動亦神經爲之。通常冷則能安神經。以故熱病豫防腦炎則用冷枕。何以腸病得冷反使蠕動亢進。是可知溫涼各有所宜。頭部雖嚴冬。严寒苟御。狐腋之冠。老年尙嫌其太熱。腹部雖盛夏酷暑。苟爲風露所侵。卽疼痛而雷鳴中。醫籍太陰指脾。然不當死。煞句下腹部者太陰之領域也。故傷寒太陰證重要之證據曰腹滿少陽指胆亦不當死。煞句下頭目乃少陽之領域。故頭昏目眩者謂之肝陽胆火。惟其如此。故身半以上爲陽。身半以下爲陰。而陽明從燥化。太陰從濕化。乃不煩言而可解。十二經之陰陽太少皆本此意。推勘入細之言耳。昧者不察。一開口卽云太陰濕土。陽明燥金。求其故而不得。造爲種種曲說。復不能明內經之旨趣。專拾一二玄談。借其艱深。自文淺陋。愈趨愈遠。遂致不可究詰。是則晉唐以後先哲

小腸中

後生理  
月地反

亦不得辭其咎也。至於旁流爲反應。其事極易明瞭。吾嘗謂各種疾病。

皆體工之本能驅逐病毒而起之變化。例如咳嗽。乃因氣管內有作梗之

物而起之反應。是欬嗽非病。前已言之。茲不復贅。旁流之爲反應。其理正

同。因病熱之故。腸中起變化。當消化者。既不有充分消化。當吸收者。復不

得充分吸收。於是養生之食品。反爲胃腸之阻梗。生理乃起反應。欲驅而

去之。其去之之法。不外乎腸蠕動。與腸壁分泌液汁。驅之不去。則蠕動愈

劇。而分泌愈多。劇則痛多。則泄矣。凡治病之法。無非順生理。以藥力助之。

苟見泄瀉。不知其爲旁流。而用理中以止之。是與生理爲難也。則其治爲

誤。其病當劇。以承氣或麻仁丸下之。則爲順生理之需求。而以藥爲之

助。是爲正當之治法。而其病當退也。所謂協熱之利。亦屬反應者。協熱多

半由於誤下。誤下則表熱陷裏。其在胃者。則溫溫欲吐。溫溫欲吐之意義。

因熱聚於裏。胃中不通。則體工起反應。而驅逐其熱。其驅逐之法。以嘔而

利局

藥力復持之。使不得嘔。故溫溫欲吐而復不得吐。其在腸者。則蟬重以爲驅逐。驅之不得。更分泌液體以佐之。則爲利協熱之利。雖由誤下而來。然下之則爲順。生理之需求。故雖因誤下而陷。有時揆度形勢。仍當用下法。以爲救濟。若嘔且利者。純用下法。則中焦因抵抗藥力之故。或更呈劇烈之反應。而協熱又不得不下。於是用柴胡疏達。少陽以安胃氣。一面仍用大黃以治協熱。遂成大柴胡表裏分疏之局。此其幹旋之功。用意之精。在二千年前有如此醫術。洵不愧醫聖兩字。夫豈西國之希伯克來。東國之吉益東洞。所能望其項背者。自金元以迄盛清。醫家無有不尊仲景者。然真能知仲景者。實無一人。劉河間彷彿大柴胡法。製雙解散。以麻桂消黃並用。是僅懂得表裏分疏。彼又甯知大柴胡之爲方。有如許曲折。故以雙解散與大柴胡比較。貌似神非。精粗判若霄壤。余因簡單言之。必然解人難索。故不辭詞費。備論之如右。

病如桂枝證。頭不痛。項不强。寸脉微浮。胸中痞鞭。氣上衝喉咽。不得息者。此爲胸有寒也。當吐之。宜瓜蒂散。頭上項上脈經有其字千金翼作頭項不强痛喉咽玉函成本作咽喉此爲胸有寒千金作此以內有久痰

成云。病如桂枝證。爲發熱汗出惡風也。方云。頭不痛。項不强。言太陽經中

無外入之風邪。以明非中風也。寸侯身半已上微浮。邪自內出也。胸中痞鞭。

痰涎塞膈也。氣上衝咽喉者。痰湧上逆。或謂喉中聲如曳鋸是也。寒以痰言。

喻云。寒者痰也。痰飲內動。身必有汗。加以發熱惡寒。全似中風。但頭不痛。

項不强。此非外入之風。乃內蘊之痰。窒塞胸間。宜用瓜蒂散以湧出其痰也。

周云。寒飲停蓄。阻遏胸中之陽。使衛氣不能外固。故發熱惡寒。汗出也。

程云。邪氣蘊蓄於膈間。此爲胸有寒也。痞鞭一證。因吐下者爲虛。不因吐下。

者爲實。實邪填塞心胸。中下二焦爲之阻絕。自不得不從上焦爲出路。所謂

在上者因而越之是也。丹云。案方氏諸家。以寒爲痰。蓋瓜蒂能吐膈間之

單爲風寒之寒。亦恐不爾。厥陰篇瓜蒂散條云。邪結在胸中。又云。病在胸中。程說有所據。

因汗下而返應之痞爲客氣。風寒外襲。食積應之爲邪氣。卽程氏因吐下者爲虛。不因吐下爲實之說。作邪字妥當。

### 瓜蒂散方

瓜蒂一分熬黃

赤小豆一分玉函作各六銖

右二味。各別搗篩爲散。已合治之。取一錢匕。以香豉一合。用熱湯七合。煮作稀糜。去滓。取汁和散。溫頓服之。不吐者。少少加。得快吐爲止。諸亡血虛家。不可與瓜蒂散。一錢七千金翼作半錢七

鑑云。胸中者。清陽之府。諸邪入胸府。阻遏陽氣。不得宣達。以致胸滿痞鞭。熱氣上衝。燥渴心煩。溫溫欲吐。脈數促者。此熱鬱結也。胸滿痞鞭。氣上衝咽喉。不得息。手起寒冷。欲吐不能吐。脈遲緊者。此寒鬱結也。凡胸中寒熱。與氣與

飲鬱結爲病。諒非汗下之法所能治。必得酸苦湧泄之品。因而越之。上焦得通。陽氣得復。痞鞭可消。胸中可和也。瓜蒂極苦。赤豆味酸。相須相益。能疏胸中實邪。爲吐劑中第一品也。而佐香豉汁合服者。藉穀氣以保胃氣也。服之不吐。少少加服。得快吐卽止者。恐傷胸中元氣也。此方奏功之捷。勝於汗下。所謂汗吐下之大法也。今人不知仲景之和之精義。置之不用。可勝惜哉。然諸亡血虛家。胸中氣液已虧。不可輕與。特爲申禁。汪云。傷寒一病。吐法不可不講。華元化云。傷寒至四日。在胸。宜吐之。巢元方云。傷寒病三日以上。氣浮在上部。胸心填塞滿悶。當吐之則愈。仲景以此條論特出之。太陽下篇者。以吐不宜遲。與太陽汗證相等。當與兩三日間。審其證而用其法也。條辨以胸有寒爲痰。亦通。蓋胸有風寒。則其人平素飲食之積。必鬱而成熱。變而爲痰。所以瓜蒂亦湧痰熱之藥也。尙論篇以此條證竟列入痰病中。誤矣。賁作

極。古方選注曰。瓜蒂散乃酸苦涌泄重劑。以吐胸寒者。邪結於胸。不涉太陽表實。只以三物爲散。煮作稀糜。留戀中焦。以吐之。能事畢矣。瓜蒂性升。味苦而涌。豆性酸斂。味苦而泄。恐其未必卽能宣越。故複以香豉湯陳腐之性。開發實邪。定當越上而吐矣。

外臺祕要。張文仲瓜蒂散。主傷寒胸中痞塞。瓜蒂赤小豆各一兩。右二味。搗散。白湯服一錢匕。又范汪療傷寒及天行。瓜蒂散方。同上二味。搗作散。溫湯二合。服一錢匕。藥下便臥。若便吐且急忍也。候食頃不吐者。取錢匕散二合。湯和服之。便吐矣。不吐復稍增。以吐爲度。吐出青黃如菜汁者。五升以上爲佳。若吐少病不除者。明日如前法復服之。可至再三。不令人虛也。藥力過時。不吐。服湯一升。助藥力也。吐出便可食。無復餘毒。若服藥過多者。益飲冷水解之。和服之下。活人書有以手指攏之五字。

東垣試效方曰。若有宿食而煩者。仲景以梔子大黃湯主之。氣口三盛。則食

傷太陰。填塞悶亂。極則心胃大疼。兀兀欲吐。得吐則已。俗呼食迷風是也。經云。上部有脈。下部無脈。其人當吐。不吐者死。宜瓜蒂散之。類吐之。經云。高者因而越之。此之謂也。

醫方集解曰。治卒中痰迷。涎潮壅盛。顛狂煩亂。人事昏沈。五癰痰壅。上膈。及火氣上衝。喉不得息。食填中脘。欲吐不出。量人虛實服之。吐時須令閉目。緊束肚皮。吐不止者。葱白湯解之。良久不出者。含砂糖一塊。卽吐。丹云。案張子和不用豆豉。加入參甘草。蠶汁調下。吐不止者。用煎麝香湯。瓜苗聞麝香卽死。所以立解。

活人指掌辨疑曰。瓜蒂卽絲瓜蒂。俗名藤蘿。丹云。案此說。本草所不載。錄以俟試驗。舒氏亦云。如無甜瓜。絲瓜蒂可代。

鐵樵按。氣上衝咽喉。此證常遇之。乃胃不能降肺氣。因以上逆之故。與痰。

文敷衍致讀者無可遵循瓜蒂散一方今人絕少用之者殆以此古  
寒飲寒痰各說是注家節外生枝不可爲訓本文此爲胸中有寒也句寒  
字可疑例如「膈上有寒飲乾嘔者不可吐也」「乾嘔吐涎沫頭痛者吳  
茱萸湯主之」以上兩條皆屬寒而云不可吐又一少陰證飲食入口則  
吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下  
也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯一皆言寒  
不可吐是其他無標準可言而寒之不可吐已確寒字旣不得強解爲熱  
亦不得強解爲邪直誤字耳至於氣上衝胸如桂枝白朮甘草湯一條由  
吐下後心下逆滿而起者氣上衝咽喉如經脉動惕久而成痿一條由於  
吐下後發汗虛煩脉微八九日心下痞硬而起者皆屬虛證非可用瓜蒂  
散者然則本條所云豈非全無憑準竊疑胸中有寒句不但訛字兼有脫  
落吾儕若從根本著想則雖脫落亦尙無妨所謂根本者無他卽上節所

釋。順。生。理。爲。治。一。語。是。也。凡。病。爲。日。淺。正。氣。未。虛。邪。熱。內。攻。胃。不。能。容。生。理。起。反。應。而。嘔。者。皆。可。吐。也。其。要。點。在。病。須。陽。證。正。氣。未。虛。否。則。禁。吐。此。爲。鄙。人。歷。數。十。次。經。驗。無。一。或。誤。者。用。以。治。嬰。兒。之。病。奏。效。尤。捷。而。無。流。弊。

病脅下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者此名藏結死。玉函脈經病下有者若二字入陰筋作入陰挾

陰筋

程云其人脅下素有痞積陰邪之伏裏者根柢深且固也今因新得傷寒未察其陰經之痞誤行攻下致邪氣入裏與宿積相互使藏之真氣結而不通因連在臍旁痛引少腹入陰筋故名藏結蓋痞爲陰邪而臍旁陰分也在藏爲陰以陰邪結於陰經之藏陽氣難開至此而結勢已成於法爲死錢云其痛下引少腹入厥陰而控引睪丸之陰筋者此等藏結以陰氣過極陽氣

見藏結可生而亦可死也。

傷寒若吐若下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥。

而煩。欲飲水數升者。白虎加入參湯主之。

白虎加入參湯脈經千金千金翼作白虎湯傷寒下成本有病字

成云。若吐若下後七八日。則當解。復不解而熱結在裏。表熱者身熱也。裏熱者內熱也。本因吐下後。邪氣乘虛內陷爲結熱。若無表熱而純爲裏熱。則邪熱結而爲實。此以表熱未罷。時時惡風。若邪氣純在表。則惡風無時。若邪氣純在裏。則更不惡風。以時時惡風。知表裏俱有熱也。邪熱結而爲實者。則無大渴。邪熱散漫則渴。今雖熱結在裏。表裏俱熱。未爲結實。邪氣散漫。熏蒸焦膈。故大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升。與白虎加入參湯散熱生津。錢云。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升。則裏熱甚於表熱矣。謂之表熱者。乃熱邪已結於裏。非尙有表邪也。因裏熱太甚。其氣騰達於外。故表間亦熱。卽陽明篇所謂蒸蒸發熱。自內達外之熱也。汪云。時時惡風者。乃熱極汗多。不能