

亥 21

31-22

医学全针  
(三)

韓國醫學六种



南京中医药大学图书馆版权所有

醫學金鍼卷五

長樂陳念祖原本

吳縣潘青齋增輯不

熱證

傷寒

傷寒頭痛項強發熱惡寒身疼痛而喘無汗而煩躁用大青龍湯溫病發熱不惡寒而口渴用麻杏甘石湯四時感冒時法用九味羌活湯表

熱也。陽明經身熱自汗而渴。或服桂枝湯後。大渴飲水用白虎人參湯。中熱也。不惡寒。但惡熱。潮熱。譫語。便閉。用三承氣湯裏實而熱也。發班譫語時。法用三黃解毒湯。犀角地黃湯裏熱也。頭痛惡寒。發熱而譫語。小便短赤。大便閉者。用防風通聖散。表裏俱實俱熱也。法詳傷寒門。不贅。

○傷寒表熱詩

景樂刻念脈稿本



南京中医药大学图书馆版权所有  
Nanjing University of Chinese Medicine Library

太陽煩躁無汗者用大青龍湯。麻杏石甘湯。溫病宗九味湯。羌活、杏仁、沖和、又名沖和湯。易老製能令表裏

自肌鬆。

○傷寒中熱裏熱詩

汗渴心煩白虎湯。陽明經熱救中方。三黃解毒散。犀角地黃湯。熟歸裏。結實未成此法良。

○傷寒熱入於裏而實及表裏熟實詩  
補潮便結語言狂。熟結陽明承氣湯。無汗不

便表裏實。防風通聖。散有兼長。

大青龍湯

麻黃去節參錢

桂枝去皮

炙草各壹錢

杏仁拾枚

皮尖

生薑伍分

大棗貳枚

石膏貳錢

伍分

水煮麻黃去沫內諸藥同煎溫服取微汗

麻杏甘石湯

麻黃去節

杏仁柒枚去皮尖

炙草壹錢

石膏肆錢

水煎同上



白虎湯

見瘟疫

承氣湯

見祕結

調神丸一付

九味羌活湯

西風羌活草與苦甘本付各壹錢伍分

羌活

入太陽陽入太陰

蒼朮

入太陰周行通身

防風

各壹錢伍分

白芷

入陽明

川芎

入厥陰陽

黃芩

入少陽作汗

少生地黃

養液以細

辛

入少陽

甘草

各壹錢和諸藥

加生薑伍片

加生薑伍片

蔥頭貳根

如傷風自汗去蔥頭加白朮倍防風胸滿去

地黃加枳殼桔梗喘加杏仁夏加石膏知母



汗下兼行。加大黃。

按生地黃、黃芩雖能退熱。然初起不可遽用。  
苦寒不如用萎蕤柔潤以養汗源。且能助正  
氣而驅風邪。

○歌曰

沖和湯內用防風。羌活辛蒼草與芎。汗本於  
陰芩地妙。三陽解表一方通。

三黃解毒湯

一名黃連解毒湯

黃柏

黃芩

黃連

梔子

各貳錢

甘草

壹錢

水煎服

○歌曰

黃連解毒君黃連黃檗梔芩並水煎主治太

陽邪外束陽明溼盛熟初傳

犀角地黃湯

生地

參錢

犀角

貳錢

丹皮

貳錢

芍藥

貳錢

水

煎服

柯韻伯曰。氣爲陽。血爲陰。陽密乃固。陽盛則傷陰矣。陰平陽祕。陰虛者。陽必湊之矣。故氣有餘。卽是火。火入血室。血不榮經。卽隨逆氣而妄行。上升者出於口鼻。下陷者出於二便。有在經在府之分。要皆心肝受熱所致也。心爲營血之主。心火旺則血不安。故用生犀生地。酸鹹甘寒之味。以清君火。肝爲藏血之室。肝火旺則血不守。故用丹皮芍藥。辛苦微寒。

之品以平相火。此方雖曰清火。而實滋陰之  
劑。蓋失血則陰虛。陰虛則無氣。故陰不足者。  
當補之以味。勿得反傷其氣也。若用芩連膽  
草梔柏以瀉其氣。則陽之劇者。苦從火化。陽  
已衰者。氣從苦發。燎原而飛越矣。

○歌曰

犀角地黃芍藥丹。血升胃熱火邪干。斑黃陽  
毒皆堪治。或益柴芩總伐肝。

# 防風通聖散

見中風

附

## 三黃湯

治三焦實熱，一切有餘火證，大便祕結者。

黃芩 大黃 黃連

各等分

水煎服

二黃湯

治上焦火旺，頭面大腫，目赤腫痛，心腎咽喉口舌耳鼻熱盛，及生瘡毒者。

黃芩 黃連

甘草

各等分

水煎食後服

○歌曰

三黃湯泄三焦熱，並用芩連與大黃。  
若祇上焦邪火旺，芩連甘草二黃湯。



人三黃石膏湯

治傷寒陽證、表裏大熱而不得汗、或已經汗下、過經不解、六脈洪數、面赤、鼻乾、舌燥大渴、煩躁不眠、譫語、鼻衄、發黃、發疹、發斑、諸證、凡表實無汗而未入

裏成實者、均宜主之。

出石膏

參錢、黃芩

、梔子

、黃連

、黃柏

、吳麻

單黃各壹錢、淡豆豉貳錢、加葱壹根、水煎熱服、

黃伍分

○歌曰  
口三黃倍用石膏煎。麻豉梔芩與檗連。有汗減  
麻添用桂。便塘去石葛根先。

口糜齦爛喉痺雙單

口糜齦爛出血心肺胃之火盛也。宜甘露飲主之。俗名雙單蛾卽方書所謂喉痺也。雙蛾易治單蛾難治。由心腎之火乘肺也。宜刺手大拇指出血又以導赤散加桔梗貝母射干治之。是爲反治法。二證若服涼藥不愈。宜用附子片以白蜜蒸熟含嚥其汁。又以通脈四逆湯加猪膽汁人尿與服。又以桂附八味湯加黃連少許水浸。

冷服是爲從治法。此證不可純用涼藥。恐上熱未除。中寒復起。毒氣乘虛入腹。上喘下泄。手厥冷。爪甲青。口如魚口者死。

○口糜齦爛詩

口糜齦爛火之炎。只盼慈雲甘露飲。霑喉婢

生蛾導赤散。從治

以熱攻熱、謂之從治。四逆通脈四逆湯、加桔梗

或桂附八味湯冷服。繼鍼砭。

甘露飲

見食

通脈四逆湯

見暑證

腎氣丸

見痰

導赤散

生地

參錢

木通

甘草

各貳錢

竹葉

貳拾肆片

水煎

○歌曰

導赤原來地與通。草梢竹葉四般攻。口糜莖  
痛兼淋瀝泄火功歸補水中。

涼膈散

治心火上盛中焦燥實口渴目赤頭眩口瘡脣裂吐血衄大小便祕諸風

瘧癰、胃熱、發斑、發狂、及  
小兒驚急、痘瘡黑陷、

連翹

肆兩

大黃

酒浸

黃芩

酒炒

甘草

各貳兩

子炒

薄荷

各壹兩

芒硝

伍錢

研末

每服叁錢

竹葉生蜜煎

○歌曰

涼膈硝黃梔子翹。黃芩甘草薄荷饒。再加竹葉調蜂蜜。膈上如焚一服消。

清胃散

治胃經溼熱、齒齦腫痛。  
或牽引頭腦、或面發熱。

升麻

甘草

生地黃

丹皮

當歸

黃

連

各等分

研末水煎服

○歌曰

清胃散君生地黃歸連甘草用爲良佐以丹皮疏血滯升麻直達味辛涼

血證

吐血咯血、欬血、鼻衄、齒衄、舌衄、大便血、血淋、血崩等證，皆爲血不循經之病。經者常也，血所常

