

校正醫宗必讀

錦章圖書局
印行
卷九

酒積者葛根神效黃連白豆蔻甚者用甘遂牽牛 氣積者木香枳實厚朴枳殼甚者枳實牽牛 血積者

乾姜桃仁牡丹歸尾赤芍藥紅花甚者大黃蟲水怪石山甲見慈石 痰積者半夏瓜蒂甚者深痰九老痰

海石瓦楞子痰在皮裏膜外白芥子 水積者五苓散甚者商陸甘遂芫花 茶積者黃芩之麻甚者朱黃

椒薑 癖積者三棱蓬朮甚者巴霜大黃 穀積者麥芽殺芽神麴砂仁甚者雞內金 肉積者山查

阿膠甚者礞石硝 蛋積白豆蔻枳殼紅豆豉薑汁 茶積丁香肉桂麝香 麴積蘿蔔子薑酒醋 魚蟹積

紫蘇橘皮木香薑汁 治積 狗肉積杏仁山 積積雄黃錫灰枳榔雷丸蕪荑樞子使君子 蟲積 單果

反胃噎塞 反胃者食入反出是無火也 噎塞者食入不下是火也 內經曰三陽結謂之膈 三陽者太陽陽明少陽也 此者結於胃脘也 此者結於胃脘也

黃帝針經云胃病者膈噎不通飲食不下 上膈者食入反出也 中膈者食入不下也 下膈者食入下而反出也

液衰耗胃脫乾槁槁在上者水飲可行食物難入名曰噎塞槁在下者食雖可入良久復出名曰反胃 故內經止有三陽結謂之膈 一語潔古分吐証為三端上焦吐者皆從於氣食 中焦吐者皆從於痰食 下焦吐者皆從於血食

痛或先痛而吐下焦吐者皆從子寒朝食暮吐暮食朝吐粟氏浪於五噎十 吐中焦吐者皆從於痰食 下焦吐者皆從於血食 惟張難峰以為神

思間病法當內觀靜養斯言深中病情大抵氣血虧損復因悲思憂怒則脾胃受傷血脈新耗鬱氣生痰痰則塞而不 通氣則上而不下妨碍道路飲食難進噎塞所由成也脾胃虛傷運行失職不能熟腐五穀變化精微朝食暮吐食難

入胃復反而出反胃所由成也二者皆在膈間受病故通名為膈也噎塞之心即潔古之上焦吐反胃之吐即潔古之 下焦吐王太僕云食不得入是有火也食入反出是無火也噎塞大都 胃大都屬寒或不可拘也脉大有加當

作熱治脉小無力當作寒此之黃白而枯者為虛寒色之紅赤而澤者為實熱以脉合証以色合脉庶乎無誤經曰 能合色脉可以為全此証之所以疑難者方欲健脾理痰恐燥劑有妨于津液 欲養血生津恐潤劑有碍於中州

其陰虧火旺者當以養血為要脾陽陰虛者當以溫補為先更有憂思鬱火大學既結神不大衰脉猶有存當以倉公 河間之法下之小小湯丸累累如用開局自透膈間痰微微湧出因而治下均易行設或不行當溫下導始終勿

引自然宣通此皆虛實陰陽之辨臨証之難行也 王叔和法偏主清潤若是者皆 引自然宣通此皆虛實陰陽之辨臨証之難行也 王叔和法偏主清潤若是者皆

引自然宣通此皆虛實陰陽之辨臨証之難行也 王叔和法偏主清潤若是者皆 引自然宣通此皆虛實陰陽之辨臨証之難行也 王叔和法偏主清潤若是者皆

引自然宣通此皆虛實陰陽之辨臨証之難行也 王叔和法偏主清潤若是者皆 引自然宣通此皆虛實陰陽之辨臨証之難行也 王叔和法偏主清潤若是者皆

引自然宣通此皆虛實陰陽之辨臨証之難行也 王叔和法偏主清潤若是者皆 引自然宣通此皆虛實陰陽之辨臨証之難行也 王叔和法偏主清潤若是者皆

引自然宣通此皆虛實陰陽之辨臨証之難行也 王叔和法偏主清潤若是者皆 引自然宣通此皆虛實陰陽之辨臨証之難行也 王叔和法偏主清潤若是者皆

賴病合法耳宜云治病乎

死證年滿六旬者難治其脈微弱或如羊屎者不治口吐白沫者不治胸腹噎病如刀割者死

脈候緊而滑者吐逆小弱而滑者反胃或沉緩無力或大而約為氣虛數而無力或滑小為血虛弦為痰滑為痰

痰寸繁尺滿胸滿不能食而吐難經曰脈革則吐逆

醫案

邑宰夫人憂怒之極得食輒噎胸中隱隱痛余診之曰脈紫且滑痰在上脫用二陳加公伯元曰平

夏燥乎余曰溼痰滿中非此不治遂用四劑病尚不減改大半夏湯服四貼胸痛乃止又四而時服二十劑而

安若況半夏為燥而以他藥代之豈能愈乎惟痰不減形不肥者不宜與也

江夏太學方春和年近六旬多愁善怒患噎三月日進粉飯幾腐變且吐其平六脈細軟此用理中湯加人乳

和理一劑便減十劑而日進糜粥此用理中湯加人乳

南都一用人參黃耆當歸白朮陳皮枳仁牛乳噎不進食實之物不能下咽惟用人乳醃酒吐沫不已求治于余余曰口吐白沫法在不治脈猶未散

姑冀萬一用人參黃耆當歸白朮陳皮枳仁牛乳嘉定之通二十五歲以鼓盆之戚悲哀過度不能食又十餘日粥亦不能食隨食隨吐二便閉滯自謂必死求余診

余曰脈按有力非死証也以酒蒸大黃加桃仁當歸砂仁服凡五服而下燥屎乾血甚多病若去數日之

間能食倍常

大半夏湯治肥人痰厥胃反嘔吐

半夏五錢人參三錢白朮三錢水三鍾和蜜揚之二百四十至八分服

香砂寬中湯治氣滯胸膈木香一錢白朮一錢陳皮一錢香附一錢白豆蔻一錢砂仁一錢青皮一錢檳榔一錢半夏一錢茯苓一錢

厚朴二錢甘草一錢水二鍾薑三片煎一杯人參二錢白朮一錢橘紅一錢茯苓一錢黃耆一錢砂仁一錢甘草一錢半夏一錢

補氣運脾丸治脾虛嘔噎人參二錢白朮一錢橘紅一錢茯苓一錢黃耆一錢砂仁一錢甘草一錢半夏一錢

水二鍾薑三片煎一杯食連服

滋血潤腸湯

治血虛大便燥結

當歸 生地黄

紅花 桃仁

大黃 枳殼

木通

平煎七分入煎汁平酒鹽食前服

人參利腸丸

治血少便燥腸氣之聖藥也

木香

檳榔

人參

當歸

甘草

枳實

厚朴

治虛寒嘔吐噎塞不逆

白木

香附

砂仁

人參

丁香

木香

丁沉透腸湯

治虛寒嘔吐噎塞不逆

白木

香附

砂仁

人參

丁香

木香

肉果

桂煎八分服

秦川菊紅丸

治血虛成腸氣

雄黃 礞石

木香

三棱

蓬朮

黃仲

乾漆

為和麵糊丸桐子大每服五十九丸未飲下

四生丸

治一切結熱

北黃

黑丑

皂角

芒硝

石為和

水丸桐子大每服二三十丸

白湯下

昆布丸

治噎塞妨礙飲食不下

昆布

麥門冬

訶梨勒

天門冬

木通

大黃

枳殼

治噎塞妨礙飲食不下

枳殼

麥門冬

訶梨勒

天門冬

木通

大黃

每服三十丸酒下

枳殼

治噎塞妨礙飲食不下

枳殼

麥門冬

訶梨勒

天門冬

木通

大黃

白木牛膝

治噎塞妨礙飲食不下

白木牛膝

麥門冬

訶梨勒

天門冬

木通

大黃

甘厚汁

治噎塞妨礙飲食不下

甘厚汁

麥門冬

訶梨勒

天門冬

木通

大黃

驢屎

治噎塞妨礙飲食不下

驢屎

麥門冬

訶梨勒

天門冬

木通

大黃

雄猪脂

治噎塞妨礙飲食不下

雄猪脂

麥門冬

訶梨勒

天門冬

木通

大黃

猪脂

治噎塞妨礙飲食不下

猪脂

麥門冬

訶梨勒

天門冬

木通

大黃

猪脂

治噎塞妨礙飲食不下

猪脂

麥門冬

訶梨勒

天門冬

木通

大黃

猪脂

治噎塞妨礙飲食不下

猪脂

麥門冬

訶梨勒

天門冬

木通

大黃

猪脂

治噎塞妨礙飲食不下

猪脂

麥門冬

訶梨勒

天門冬

木通

大黃

猪脂

治噎塞妨礙飲食不下

猪脂

麥門冬

訶梨勒

天門冬

木通

大黃

先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧。其間二日者邪氣與衛氣客于六腑而有時相失不能相得故休數日乃作也。瘧瘧者邪氣與衛氣客于六腑而有時相失不能相得故休數日乃作也。何也岐伯曰此應四時者也其病形者反四時也。春病者惡風夏病者多汗溫病者得之冬中於風寒秋病者寒甚冬病者寒不甚。春病者惡風夏病者多汗溫病者得之冬中於風寒秋病者寒甚冬病者寒不甚。春病者惡風夏病者多汗溫病者得之冬中於風寒秋病者寒甚冬病者寒不甚。暑熱體燥肌肉消脬理發泄或有所用力邪氣與汗皆出病成。暑熱體燥肌肉消脬理發泄或有所用力邪氣與汗皆出病成。感則熱妄寒則氣復返入入則陽虛陽虛則寒矣故治瘧者肺虛者肺虛有熱氣盛于身厥逆上衝中氣實而不外泄有所用力脬理開風寒舍于皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛其氣不及于陰故但熱而不寒。感則熱妄寒則氣復返入入則陽虛陽虛則寒矣故治瘧者肺虛者肺虛有熱氣盛于身厥逆上衝中氣實而不外泄有所用力脬理開風寒舍于皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛其氣不及于陰故但熱而不寒。遇按經言夏傷于暑秋為瘧瘧又言瘧瘧皆生於風又言風寒之氣不常又言汗出遇風及得之以浴此皆以風寒暑濕為言也語溫瘧則曰風寒中腎語瘧瘧則曰肺素有熱夫冬寒既可以中腎則心肺脾肝四臟獨無冷氣之邪可以入客乎肺熱既可以入瘧則肝脾心腎之氣鬱而為熱者獨不可以成瘧乎然語六氣者道其常語五臟者盡其變也須知風與暑陽邪也寒與水陰邪也風者陽中之涼氣也暑者熱中之寒邪也由是則四者皆屬于寒夫夏傷于暑汗出脬開當風冷水淅淅之寒伏于皮膚及遇秋風新涼束之表邪不脫外越陰欲入而陽拒之陽欲出而陰遏之陰陽相搏而瘧作矣此者病在三陽隨衛氣以為出入而一日一作深者病在三陰邪氣不能與衛氣並出或間日或三四日而作作愈遲者病愈深也經之論瘧無漏義焉而不發月滿又分發與食飲與血痺與勞與此此不過瘧之義証耳非因而成瘧者也故治病者察其邪正淺深証之陰陽令其自發而府散而越之邪去則安古法有汗散其無汗養正為先無汗散其有汗散邪為急然邪在陽者取汗易邪在陰者取汗難不便由陰而陽由要而早乃得之也又熱多者涼藥為愈寒多者溫藥為主至于瘧食血飲瘧勞與乳之七証各隨其甚者而兼理之世俗又有鬼瘧之名此為時行瘧氣投平胃散無不應者總之脈實証實者攻邪以治標脈虛証虛者補正以治本久瘧不愈惟人冬生瘧各一兩連投二服于未發之前莫不應手取效貧困者白朮可代血虧者當歸時代近世不明表裏虛實輒用知母石膏不遵統制若表未解而得此寒涼則寒邪愈固或用常山草果皂莢硫磺若正已虛而得此壯熱則元氣轉虛故夫瘧延不已者皆

醫之要略

發散瘧疾多因風暑寒濕天之邪氣所傷當分經絡而發汗其七情痰食水血皆寒見之候隨証治之

風瘧惡寒自汗煩燥頭疼必先熱後寒宜柴胡解表藥網平白芷羌活生薑之類

溫瘧受冬月之寒復因暑風而發必先熱後寒如熱多者以解表多者以清熱

寒瘧納涼之風寒沐浴之寒其先受于腰中復因秋風涼肅而發先寒後熱宜羌活柴胡生薑之類散其太陽之邪次

用柴胡湯近來不問何經但用柴胡者非也

瘧瘧肺素有熱陰氣先絕陽氣獨發少氣煩冤手足熱而嘔此但熱而不寒或暑發者以解表以散涼發者以清熱

淫瘧汗出染谷或胃而或淫製其証身體重而痛嘔逆脹滿

北瘧陽氣虛常感暑時乘涼飲冷陰虛陽虛故但寒而不熱也

食瘧或肥甘無度或生冷受傷食滯痰生其証飢而不能食食則脹滿嘔吐腹痛青皮草果豆蔻砂仁神連山查之類

瘧瘧瘧南地者天氣炎山氣濕多有瘧瘧之毒發時迷悶甚則狂妄亦有不能言者皆由血瘀于心並聚於脾腹脹通

六府

勞瘧或素有弱証或因瘧成癆

瘧母治之失宜營衛虧損邪伏肝經膈下有塊此証當以補虛為主急使塊者多致不效

鬼瘧俗以夜發為鬼瘧非也陰入邪分發于六陰

觀瘧法瘧發四五遍後曾經發散者方可截之

隨收却止之劑必致綿延難愈或變他証不可不謹也

瘧候瘧脉自弦 弦數多熱 弦遲多寒 弦而浮大可吐之 微則為虛 代散者死

醫家

太史公曰瘧疾間日脉見 寒而發瘧者不可支且不能忘口便得瘧之食曰邪未盡而強截之未去復發即使截住

必變他証不若治法得所一二劑間令其自止升麻柴胡各二錢提陽氣上升使達于陰而寒可止黃芩知母各一錢

五分引陰氣下降使達于陽而熱自止以生薑三錢散邪歸正甘草五分如其陰陽一劑而減半再劑而竟止矣

新安趙氏患瘧每日一發自己午時起直至次日寅卯而熱退不踰一時則又發矣已及一月因頓減苦命兩郎君叩

首無藥以求速愈余曰頭痛惡寒脈浮而大表証方強此非失汗必誤也武修云某家素有瘧疾九百發百中弟服

之病勢增劇何也余曰邪未解而遽止之邪不能伏請以八劑四日服盡決效耳石膏黃芩各三錢抑陽明之熱使其

退就太陰白豆蔻三錢生薑五錢就太陰之寒使其退就陽明脾胃為夫妻使之和合則無陰陽乖亂之憾半夏換柳

各一錢五分去胸中之痰將藥三錢發越太陽之邪就陽一錢斷入陽明之路甫三劑而瘧止改用小柴胡倍人參服

四劑補中益氣服十劑而瘧

相國魏氏丙辰秋患瘧吐衄則不思食六脉沉細余曰瘧傷太陰中氣就動也用理中湯加烏梅三個黃連五錢連四

劑後胸中豁然寒熱亦減就亦不吐去黃連如費者二錢生薑五錢五劑而瘧止

清脾飲

甘草五分 水二錢薑五片煎一錢服

白虎加桂枝湯 治但熱不寒及有汗者 水鍾平 薑五片煎八分服

柴胡飲 小柴胡湯 補中益氣湯 涼膈散 理中湯 十全大補湯 六君子湯 香薷散

二術柴胡湯 諸瘧必用

白木柴胡湯 柴胡 陳皮 甘草 水鍾平 薑五片煎八分服 一日一發及午前發邪在陽分如桂

苓茯苓平裏熱甚口渴加石膏知母各三錢或午後及夜發者邪在陰分加四物湯調好黃連

常山飲 治瘧疾在胸用此吐之 常山 水二鍾煎一錢空心服

常山 水二鍾煎一錢空心服

靈寶丹 治疫癘寒症 生靈靈速皮傷諸毒一宿靈心服
更如雙解散子 治疫癘神效 肉大瘰癧 單可靈 厚朴 甘草 生薑 水二錢煎一錢空心服

疫母丸 元氣不虛者宜此 青皮 桃仁 紅花 麥芽 二錢 薑中 紅海粉 杏附 三錢 蓬朮 水一

十味俱用醋煨神效 如桐子大每服三錢薑湯送下 知母 五錢 貝母 九錢 柴胡 七錢 枳實 八錢 陳皮 五錢 山查肉 枳實

桂枝散 三錢後可用因耳裏而減之立效 水二錢煎一錢灌用水二錢煎八分俱靈一宿臨發日五更服頭煎未發前一睡服

二散 截瘧散 虛人久瘧不止此極見效 黃耆 二錢 人參 白朮 茯苓 各一錢 甘草 六分 砂仁 草果 橘紅 各一錢 五味

子 烏梅 水二錢 薑十片 大皮 薑二枚 煎一睡服

何首烏 為末酒調下三錢臨發先服或煎湯服

獨蒜 二枚 桃仁 一錢 桂枝 一錢 枳實 一錢 黃丹 九錢 薑五錢 知母 九錢 每服九錢發而五更而東酒送下

桃仁 一味研爛不犯水加黃丹九錢五月五日合

常山末 二錢 薑五錢 高梅肉 研爛為泥此截瘧之方 薑是常山發吐不知其有神功但炒透即不吐耳

生薑 中 薑五錢 黃丹 為末烏梅肉為丸每服三錢

痢疾 古經云 痢下 帝曰 腸澼便血何如岐伯曰 身熱則死寒則生 帝曰 腸澼下血何如岐伯曰 腸澼下血何如岐伯曰 腸澼下血何如岐伯曰

帝曰 腸澼便血何如岐伯曰 身熱則死寒則生 帝曰 腸澼下血何如岐伯曰 腸澼下血何如岐伯曰 腸澼下血何如岐伯曰

曰 腸澼則生脈浮則死 帝曰 腸澼下血何如岐伯曰 腸澼下血何如岐伯曰 腸澼下血何如岐伯曰 腸澼下血何如岐伯曰

大則生 帝曰 腸澼下血何如岐伯曰 腸澼下血何如岐伯曰 腸澼下血何如岐伯曰 腸澼下血何如岐伯曰

以試期之 帝曰 腸澼下血何如岐伯曰 腸澼下血何如岐伯曰 腸澼下血何如岐伯曰 腸澼下血何如岐伯曰

然未明虛實不辨也晚近不足論即在簡證固有偏僻如局方與復原例行辛熱可開機丹湯東南苦寒何其執而不
圓相去天壤耶夫病起夏秋溼熱鬱本乎天也固熱未涼也各生念由于人也氣壯而傷于天者熱居多氣弱而
傷于人者陰寒為甚蓋土寄旺四時或從于火則陽土有熱而濕熱為病經所謂地阜是也或從于水則陰土不足而
寒溼為病經所謂卑監是也言熱者遺寒言寒者廢熱豈非立言之過乎至以赤為熱白為寒亦非確論果爾則赤白
相兼者宜真寒熱同病乎必以見証與色脈辨之而後寒熱不有也須知寒者必虛熱者必實更以虛實細詳之而更
熱愈明且脹滿惡食惡痛推按者實也煩渴引飲喜冷是熱者熱也脈強而實者實也脈數而滑者熱也外此則虛非
虛寒矣而相似之際尤當審察如以口渴為實熱似然不知亡津液液亡于下則津潤于上安得不更
當以喜熱喜食分虛實也以腹痛為實熱似矣不知相火出於下焦傷脾胃血利腐安得不痛更當以痛之緩急按之
可否藏之陰陽腹之脹與不脹脈之有力無力分虛實也以小便之黃赤短少為實熱似矣不知水從剽去洩而不長
液以陰亡弱因色變更當以便之熱與不熱沉之潤與不潤色之澤與不澤分虛實也以裡急後重為實熱似矣不知
氣陷則倉廩不藏陰亡則門戶不閉更當以病之新久質之強弱脈之盛衰分虛實也至于治法須求何邪所傷何液
受病如因於濕熱去其溼熱因於積滯去其積滯固于氣者調之固于血者和之新感而實者可以通因通用久病而
虛者可以塞因塞用是皆常法無待言矣獨怪世之病痢者十有九虛而醫之治痢者百無一補氣本下陷而再行其
氣後重不亦甚乎中本虛衰而復攻之補元氣不愈竭矣溼熱傷血者有宜調和若通行推滯血不轉傷矣津亡作渴
者自宜止澀若但與參朮津不轉耗也世有庸工專守痛無補法且曰直待痛止方可補耳不知因虛而痛者愈攻則
愈虛愈痛矣此皆本末未明但據現在者為有形之疾病不思可慮者在無形之元氣也請以宜補之証悉言之脈來
微弱者可補形色虛弱者可補因攻而創者可補然尤有至要者則在脾胃兩臟如先瀉而後補者脾胃傳腎為微邪
難療先補而後瀉者腎傳脾為微邪易療是知在脾者病淺在腎者病深腎為胃關開於二陰未有久痢而腎不損
者故治痢莫知補腎非其治也凡四君歸脾十全補中皆補脾虛未嘗不善若病在久恙土位無母設非桂附大補命
門以復腎中之陽以救脾家之母飲食何由進門戶何由固月元何由復也畏熱不食前僅以參朮補土多致不起俗醫
積小新舊舊積者溼熱食寒也法當下之新積者下後人虛寒也或熱或寒補不可單攻若因虛而利者雖舊積亦不可

下。但用藥功散虛回而後止丹。若有先內者補之。膏肓而後下。無亦一。雖虛者宜之。

色黑有二。焦黑者熱極反蒙勝已之化。如黑之尤者。瘀血也。如黑之淡者。虛也。

裏急裡急而不得使者大也。裏急者。裏急見汚衣者。虛也。裏急者。裏急見汚衣者。虛也。裏急者。裏急見汚衣者。虛也。

後重邪迫而後重者。至固稍減。未幾復甚。虛者而後重者。固後不減。以得解。愈虛故也。下後仍後重者。當

甘草緩之。升麻舉之。

虛坐努責。虛坐而不得大便。血虛故也。宜歸身地黃芍藥陳皮之屬。

噤口。食不得入。到口即吐。有邪在上。膈大氣中逆者。噤口。食不得入。到口即吐。有邪在上。膈大氣中逆者。噤口。食不得入。到口即吐。有邪在上。膈大氣中逆者。

陳米湯調下。有肝氣。噤口。食不得入。到口即吐。有邪在上。膈大氣中逆者。噤口。食不得入。到口即吐。有邪在上。膈大氣中逆者。

休息痢。虛止。虛發。久不愈者。名曰休息。多因勞過度。早積熱未清。如薑汁細細呷之。如吐再吃。但得一呷下咽。便開。

者。搗根白皮。煮引者。水浸一日。去黃皮。每兩配人參一兩。煨木香二錢。糯米三錢。煎湯飲之。如黃連。

腹痛。因肺金之氣。鬱在大腸之間。宜結梗開之。白芍藥甘草陳皮木香當歸為主。忌寒加甘薑。忌熱加黃連。

肛門痛。熱留於下。宜槐花木香。扶寒散熱。

蛭蟲。其形極細。九虫之一也。胃弱腸虛。則蛭蟲聚之。或蟻或蠅。道中溢出。方見。內服桃仁槐子。煎煮。

死証下。純血者死。如屋漏水者死。大孔如竹筒者死。存者。遺尿者死。發熱不休者死。色如魚腦。或如脂。肝

者。皆半生半死。脉細皮寒。氣必泄利。前後飲食不入。是謂五虛。死。惟用米附十可救一。

脉候沉小。微細者。皆洪大滑數者死。仲景云。沉絀者。重脉大者。為未止。微弱者。為欲自止。雖發熱不死。

醫案。已院孫瀟湘夫人。下痢四十日。口乾發熱。飲食不進。腹中脹悶。完穀不化。尚有痢。其邪熱不凝。數者計服香連散。枳實

桂厚朴等三十餘劑。絕後五日。命在須臾。迎余診之。脉大而數。按之熱無。詢得腹痛而喜于按。小便清利。此大虛不能

生。知內真寒。而外假熱也。亟附子理中湯。水令與服。一劑而痛止。六劑而熱退。食進。再服八味丸。二十餘劑。而愈。起

芍藥膏各湯

黃芩 芍藥 甘草

水鍾煎八分服

香連丸

黃連 枳實 芍藥 甘草

右為細末醋糊丸桐子大每服三錢空心米湯送下

通氣湯

木香 枳實 黃連 枳實 芍藥 甘草 分二服水二鍾煎一鍾食

前服

真人養臟湯

治虛寒痢疾久而不愈

白芍藥 木香 人參 白朮 當歸 訶子肉 二錢肉果

理中湯

治中陽虛弱

水二鍾煎一鍾食前湯服 補中益氣湯 異功散 四君子湯 十全大補湯 歸脾湯

金匱湯

治葉口痢乃熱毒冲心

人參 茯苓 甘草 訶子 川芎 羌活 獨活 桔梗 柴胡 枳殼

陳倉米

水二鍾煎三片煎一鍾服

訶梨勒丸

治休息痢 檳白皮 訶子 五錢母子香

右為細末丸桐子大每服三錢陳米湯入醋少許送

下日三服

蕉莢丸

治久痢及下部有虫

蕉莢 黃連 二錢蛇胆 為末蜜丸桐子大每服二錢食前杏仁湯下

瓜蒌散

治五已痢

瓜蒌 枳實 芍藥 甘草 研細末作一服溫酒調下

大斷下丸

治寒久痢

高良薑 芍藥 乾薑 細辛 龍骨 枳殼 赤石脂 肉豆蔻 訶子肉

牡蠣

石榴皮

右為細末醋糊丸桐子大每服三錢米湯下

泄瀉

經曰春傷於風夏生飧泄邪氣留連乃為洞泄

不瀉下利流注也又曰清氣在下則生飧泄

又曰暑注下迫皆屬于熱

又曰暑注下迫皆屬于熱

又曰暑注下迫皆屬于熱

之泄也統而論之脾土弱者自能脾濕無泄則不泄故曰泄多成五泄若土虛不能制濕則風寒與熱皆得干之而為病法有九一曰淡滲使濕從小便而去如寒人治泄導其下流雖虛卑臨不憂巨瀉經云治泄不利小便非其治也又云在下者引而竭之是也一曰升提氣屬于陽性不上升胃氣注逆而瀉下陷升柴是為之類鼓胃氣上騰則注下自止又如地上渾澤風之即乾故風藥多燥且瀉為土病風為木藥不可勝土風亦勝濕所謂下者舉之是也一曰清熱熱濕所至暴注下迫苦寒之劑用將燥藥猶當海善伊得之時而商國城然候動則火熾如失矣所謂熱者清之是也一曰疎利痰氣滯食積水停皆令人濕隨証祛逐勿使積留經云實者瀉之又云通因通用是也一曰甘緩瀉利不已急而下趨食趨愈下泄何由止甘能緩中其意速且緩緩作甘為土味所謂急者緩之是也一曰酸收瀉下有日則氣散而不收無能統攝注泄何時而止酸之味能助收瀉之機經云散者收之是也一曰燥勝土侮濕經水邪不瀉故濕皆成于土濕瀉皆本于脾虛虛者虛得濕水穀善分虛而不培淫淫轉甚經云虛者補之是也一曰溫經腎主二便封藏之本况又屬火真陽為少火生為大為土母此火一衰何以運行三位熟腐五穀乎故積虛者不換寒解虛者不補經云寒者溫之是也一曰固瀉注泄日久曲門道流難挽溫補未克奏功須行法則則變化不恆度合經所謂滑者益之是也夫是九者治瀉之大法當無遺焉如先後緩急之機豈能擇提瀉証之導固機實要可以胥天下于焉嘆矣

難經五泄胃泄飲食不化色黃脾泄泄腹脹滿泄注食即嘔吐泄中泄大腸泄食已窘迫大便色白腸鳴切痛泄瀉

小腸泄瀉而便膿血少腹痛泄大腸泄瀉急後重數至圊而不能便泄中痛泄腎泄五更瀉泄久而不愈是腎虛失閉藏之職也五更亦有食積者寒提

泄泄中寒積物不化色如黃是泄瀉清冷小便清白

陰泄水穀不化而完出也風邪干胃木乘土清氣在下

洞泄五更瀉下多水也水液去多善而轉筋血傷故筋急也

痰泄痰留于肺大腸不固脉必弦滑以藥探吐其人神必不寐色必不養

火泄腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣火也張長沙謂之協熱自利

直腸泄食方入口而即下極為難治下利

脈候胃脈虛則泄脈滑按之虛者必下利腎脈小甚為洞泄肺脈小甚為泄泄脈洪大者逆下利日十餘

行脈反實者死腹鳴而滿四肢清泄其脈大者十五日死腹大脹四末清脫形泄甚不及一時死下則泄瀉上

則吐痰皆不已為上下俱脫死

醫案

大柴胡湯主寒夏初本池完穀不化曾服胃苓湯及四君子湯不效余曰經云春傷于風夏生飧泄謂完穀也用升陽

除實湯加人參二錢三劑頓止

大司寇姚崇治吐痰泄瀉見食則惡面色萎黃精神困倦自秋及春無劑弗效經久不愈比余診之口不能言蓋以補

中益氣去雷驚加肉果二錢熟附一錢炮薑一錢半夏二錢人參四錢日進二劑四日而下止但腹不減且余曰此蓋

水泛為痰非八味凡不可應與補中湯並進凡四十日服人參一斤飲食大進痰亦不吐又半月而漸對如常矣

胃苓湯一名胃氣散子神治暑濕停飲泄瀉小便不利

蒼朮一名厚朴厚朴一名陳皮甘草一名白朮茯苓一名桂枝猪苓

水二錢薑三片薑一錢煎八分服

蒼朮湯治夏月暑濕感成痢疾香薷一錢黃連一錢厚朴一錢厚朴一名扁豆扁豆一名猪苓猪苓一名澤瀉澤瀉一名白朮白朮一名茯苓茯苓

甘草一名水二錢薑三片煎八分服

六一散一名益元散治傷暑水瀉加紅麴名青六九加蓮花名溫六九滑石一名甘草甘草一名新汲水新汲水

戊己丸黃連一名白芍藥白芍藥一名吳茱萸吳茱萸一名升陽除濕湯升陽除濕湯治受風陰濕及虛弱不思飲食便黃赤四肢困倦蒼朮一名柴胡柴胡一名澤瀉澤瀉一名猪苓猪苓一名升麻升麻

水鍾半量三片煎七分服

漿水散治暴瀉如水一身盡冷汗出脈弱氣少不能言甚者嘔吐此為急病半夏一名良薑良薑一名乾薑乾薑一名肉桂肉桂

甘草 附子

右為細末每服四錢水二鍾煎一鍾服

連理湯

人參

白朮

乾薑

甘草

茯苓

黃連

水二杯煎一鉢食遠服

養榮斷下丸

治虛府虛寒腹痛泄瀉大效

吳茱萸

赤石脂

乾薑

艾葉

附子

肉豆蔻

附

子一

右為細末每服三錢水送下

大斷下丸

右為細末每服三錢水送下

固腸丸

枳實

滑石

為末

此丸性燥

未盡者勿服

理中湯

理中湯

補中益氣湯

四君子湯

六君子湯

異功散

養榮湯

理中湯

理中湯

理中湯

金匱腎氣丸

八味丸

八味丸

八味丸

八味丸

八味丸

八味丸

八味丸

八味丸

八味丸

八味丸

八味丸

四神丸

治脾胃虛寒大便不實飲食不思

肉果

補骨脂

五味子

二

吳茱萸

一

為末

生薑

紅棗

紅棗

一百按

按

按

按

按

按

按

按

按

按

按

按

萬花解脫湯

治酒傷吐瀉

青皮

枳實

橘紅

人參

茯苓

白朮

神曲

澤瀉

乾薑

白朮

錢白豆蔻

萬花

砂仁

為末

每服三錢

白湯調服得汗即愈

白湯調服得汗即愈

白湯調服得汗即愈

白湯調服得汗即愈

白湯調服得汗即愈

白湯調服得汗即愈

白湯調服得汗即愈

枳朮丸

消食止渴

枳實

白朮

為末

每服三錢

白湯調服得汗即愈

白湯調服得汗即愈

白湯調服得汗即愈

白湯調服得汗即愈

白湯調服得汗即愈

白湯調服得汗即愈

胃強不復傷也

加木香砂仁各一兩

名香砂枳朮丸

名香砂枳朮丸

名香砂枳朮丸

名香砂枳朮丸

名香砂枳朮丸

名香砂枳朮丸

名香砂枳朮丸

名香砂枳朮丸

名香砂枳朮丸

名香砂枳朮丸

古吳重氏重校醫宗必讀卷之八

頭痛

頭痛

頭痛

頭痛

頭痛

頭痛

頭痛

頭痛

頭痛

頭痛

頭痛

經曰風氣備風府而上則為腦風新沐中風則為首風首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可以出

內至其風日則病少愈

內至其風日則病少愈

內至其風日則病少愈

內至其風日則病少愈

內至其風日則病少愈

內至其風日則病少愈

內至其風日則病少愈

內至其風日則病少愈

內至其風日則病少愈

內至其風日則病少愈

內至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

至其風日則病少愈

