

金匱要略五十家註卷二

海門吳隱亭考槃編纂

痙溼暯病脈證治第二

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痙。

金鑑曰。反字衍文。剛痙證應惡寒。非反也。當刪之。○陳修園曰。痙舊作痙。傳寫之誤也。當之。正

成無己曰。千金曰。太陽中風重感寒溼則變痙。太陽病發熱無汗為表實則不當惡寒今反惡寒者則太陽中風重感於寒為痙病也。以表實感寒故名剛痙。張隱菴曰。此言風傷太陽標本受病不得陰液以相滋而名為剛痙也。太陽病發熱者風傷太陽之標陽也。無汗者以陽邪而病標陽不得陰液以和之故無汗也。夫病及標陽則寒已化熱而反惡寒者太陽標本皆病陽氣過盛不得陰液以相滋故名曰剛痙。

徐忠可曰。發熱無汗惡寒本傷寒家症若痙而項強背直者見之乃衛陽與腎中真陽氣本相通。今太陽經寒溼相搏而氣侵少陰真陽不達故反惡寒也。寒性勁切故曰剛。

周禹載曰。此論痙病也。非傷寒也。非寒而何得以太陽目之。以其頭痛腰脊痛與太陽傷營無異。故以太陽定之。然既曰太陽又何以名痙其角弓反張正內經之

金匱要略五十家註卷二

海門吳隱亭考藥編纂

痙溼暯病脈證治第二

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痙。

金鑑曰。反字衍文。剛痙證應惡寒。非反也。當刪之。○陳修園曰。痙舊作痙。傳寫之誤也。當改之。

成無己曰。千金曰。太陽中風重感寒溼則變痙。太陽病發熱無汗為表實則不當惡寒今反惡寒者則太陽中風重感於寒為痙病也。以表實感寒故名剛痙。
張隱菴曰。此言風傷太陽標本受病不得陰液以相滋而名為剛痙也。太陽病發熱者風傷太陽之標陽也。無汗者以陽邪而病標陽不得陰液以和之故無汗也。夫病及標陽則寒已化熱而反惡寒者太陽標本皆病陽氣過盛不得陰液以相滋故名曰剛痙。

徐忠可曰。發熱無汗惡寒本傷寒家症若痙而項強背直者見之乃衛陽與腎中真陽氣本相通。今太陽經寒溼相搏而氣侵少陰真陽不達故反惡寒也。寒性勁切故曰剛。

周禹載曰。此論痙病也。非傷寒也。非寒而何得以太陽目之。以其頭痛腰脊痛與太陽傷營無異。故以太陽定之。然既曰太陽又何以名痙其角弓反張正內經之

所謂痙也。痙亦為寒。因故寒鬱而熱氣閉皮毛汗無由出。全為傷營本症。所異者止是不惡熱而反惡寒爾。其所以反惡寒者何也。因其人先傷於溼。後復感寒。兩陰相合。則寒雖發。終為溼氣挾持。經絡筋節之間。閉而不宣。一身之陽鬱抑而不外越。故身即熱而情則惡寒也。又溼在筋節。則寒為所挾。遂流連而不得去。正氣阻滯。邪氣獨留。又安望其屈伸如故。轉運無碍乎。角弓反張。有由來也。名曰剛者。寒氣堅勁。性使然也。

尤在溼曰。痙者強也。其病在筋。故必兼有頸項強急。頭熱足寒。目赤頭搖。口噤。反脈沉遲。弦細等症。仲景不言者。以痙字該之也。

章虛谷曰。太陽傷寒。邪在經絡。發熱無汗。則必惡寒。痙病邪深入筋。發熱而不惡寒。今反惡寒者。邪既傷筋。又外寒閉其營衛也。故惡寒而無汗與傷寒同。其筋緊急而脈沉。則不同。以其無汗。邪閉則筋更急。乃名剛痙也。

太陽病發熱汗出而不惡寒者。名曰柔痙。

成無己曰。太陽病發熱汗出為表虛。則當惡寒。其不惡寒者為陽明病。今發熱汗出而不惡寒者。非陽明症。則是太陽中風。重感於溼。為柔痙也。表虛感溼。故曰柔痙。

程扶生曰。太陽病發熱無汗惡寒為傷寒。發熱汗出惡風為傷風。發熱汗出不惡

寒為溫熱。以症有頸項強急甚則反張。故不謂之風寒溫熱病。而謂之痙也。

徐忠可曰。發熱汗出不惡寒。本傷風而併陽明症。若痙而項強背直者見之。是太陽陽明傷溼而兼風。非寒邪內侵之比也。風性溫和。故曰柔。

尤在涇曰。太陽病發熱汗出為表虛。則當惡寒。今不惡寒者。風邪變熱。外傷筋脈。為痙病也。以其表虛無寒。故曰柔痙。

陳修園曰。太陽病。病在標陽。則發熱邪中肌腠。則肌腠實而膚表反虛。故汗出。標病而本不病。故但發熱而不惡寒。以其表虛。名曰柔痙。此言太陽病有剛柔二痙。推原痙之所自始。為辨痙之法。非痙家之本症也。剛痙脉宜緊弦。柔痙脉宜溪弦。仲景未言。可以悟出。

章虛谷曰。風寒傳陽明。則發熱汗出而不惡寒。太陽風傷衛。則發熱汗出必有惡寒也。今標太陽病而現陽明症者何也。蓋營行脈中。衛行脈外。是營衛由脉而分。淺在肌表也。因其邪傷太陽之筋。筋在肌裏而近骨。肌肉陽明所主。故現陽明之發熱自汗不惡寒。而又有頭痛項強之太陽病者。名為痙也。其與風寒之在太陽經者。症狀不同矣。以其有汗。筋不甚急。故名柔痙。

考槃按。標太陽病者。明症由外感也。與素問氣厥論所謂肺移熱於腎。傳為柔痙。屬內傷者不同。

太陽病發熱脈沉而細者。名曰痙。為難治。

喻嘉言曰。發熱為太陽症。沈細為少陰脈。陽病而得陰脉。故難治也。難治初非不治。仲景治發熱脉沉。原有麻黃附子細辛之法。正當比例用之。設仍用太陽之桂枝葛根二方。則立剷孤陽之根。真不治矣。以少陰所藏者精。所宅者神。精者陰也。神者陽也。凡見沉脉即陽之微。見細脉即陰之細。沉則易於亡陽。細則易於亡陰。此其所以難治也。

周禹載曰。太陽陽經也。發熱陽症也。何以知為痝。以有或剛或柔之症見也。脉沉與細。陰脉也。沉為少陰本脉。而復不能鼓之使顯。乃有如絲者來去其間。則是無陽中又屬陰虛矣。何也。惟無陽令沉無陰因細也。陽症陰脉。豈易治乎。嘉言為難治初非不治。比類而觀。則仲景少陰例中。原有麻黃附子細辛湯之法。余以為不可也。蓋始得之反發熱脉沉者。以脉沉是本。而發熱為標。是少陰兼太陽之表。猶易為力也。若夫太陽顯少陰之脉。有不難為功者乎。況較少陰更多一細乎。雖然後一條太陽病脉亦沉細。何以不云難治。以有溼也。溼不但細宜。即沉并宜矣。然則又何以知其病之非溼乎。溼必流於關節。今關節無疼痛。故知之。

8徐忠可曰。古人以強直為瘻。外症與傷寒相似。但其脉沉遲弦細。而項背反張。強硬。如發癰狀為異耳。如前二條既以無汗有汗分剛柔為辨。此復以脉沉細為辨。謂太陽病發熱是表中風。復加以溼。纏綿經中。內挾寒氣。令筋脉抽急而背項強

直脉反沉細。沉細者寒溼用事邪欲侵陰之象也。於是項背強直故名痙。痙脉本伏弦細則元氣倦即難治。非痙病另有脉浮大者易治。而此之沉細為難治也。觀仲景前後從無一浮大字可知。

張路玉曰。發熱脉當浮數而反沉細知邪風為溼氣所着所以身雖發熱而脈不能浮數是陽症見陰脉故仲景指為難治也。

尤在涇曰。太陽脉本浮今反沉者風得溼而伏故為痙。痙脉本緊弦今反細者陰氣適不足故難治。

章虛谷曰。太陽傷風寒其脉浮以邪淺在營衛也。痙病邪深傷筋故脉沉緊弦直上下行也。其不緊弦而沉細則邪入深而氣血大虛正不勝邪邪何能出故為難治。

太陽病發汗太多因致痙。

成無己曰。太陽病發汗太多則亡陽內經曰。陽氣者精則養神柔則養筋陽微不能養筋則筋脉緊急而成痙也。

方中行曰。此承上條復原變痙之由。千金曰。太陽中風重感寒溼則變痙然則發汗太多者重感寒溼而變痙之原由也。蓋中風自汗傷寒發汗汗出過多衣被必溼溼勝寒生過時不更汗後新虛易於感受溼漬寒侵滲注關節所以有痙之變

也不然。以太陽病而發汗。安得別有所謂寒溼而可以為重感哉。

○○張隱菴曰。太陽病者。風傷太陽之氣也。發汗太多。則表氣外虛。津液內竭。不能養其經脉。致骨屬屈伸不利而成痙。

魏念庭曰。太陽中風。不宜發汗。發汗即為悞也。太陽傷寒。固宜發汗。亦不可發汗。過多也。不宜發汗而發汗。宜發汗而過多。則表益虛矣。表虛而其人汗出沾濡衣被之間。因汗為溼。因溼為邪。邪乘汗之虛而復入表。是在表初感之風寒未必一去。而乘虛以入之溼邪併為患。風而合溼。則為柔痙。寒而合溼。則為剛痙。

金鑑曰。太陽病發汗過多。津液大亡。表氣不固。邪風乘虛而入。因成痙者。乃內虛之所致也。不可以柔痙剛痙例之。宜以桂枝加附子湯以固表祛風為主治。由此推之。凡病出汗過多。新產金鎗破傷出血過多。而變生此症者。皆具類也。

陳修園曰。病在太陽。未必遽成痙也。而太陽之接壤。即是陽明。太陽之裏面。即是少陰。陽明少陰兩關津液。太陽病發汗太多。津液外脫。則少陰傷。陽明燥。筋失所養。因致痙。

章虛谷曰。本太陽傷風寒。其氣血虛者。仲景原有禁汗治虛之法。倘不如法而治。妄發其汗。汗太多。更傷津液。而筋脉枯燥。遂致拘急成痙。此明悞汗而成者也。夫風病下之則痙。復發汗必拘急。

方中行曰。風必自汗。表固虛矣。下則入虛其裏。所以痽也。仍復發汗以更虛其表。是為重亡津液。拘急者。津液重亡而強益甚也。

喻嘉言曰。風與熱合而生病。風則內應肝而主筋。熱則內應心而主脈。妄下損陰。則筋失養而成痽。妄汗損陽。則脉失養而拘急矣。

魏念庭曰。太陽中風。不解肌驅風於外。乃用苦寒下墮。風邪與下藥之寒溼相潤入裏。安得不為痽病乎。病變至此。亦惟有引風徐出。除溼於漸。表裏兼治為當耳。乃又悞為發汗。原屬風邪。本不宜汗。經悞治變痽。更不宜汗。發汗則脉道中之正氣傷。汗出則正氣更不足以勝邪。溼與風遂交戰矣。溼欲為聚。風欲為散。且溼凝其血。風鼓其氣。此經絡所以拘急也。

金鑑曰。風邪為病。不應下而下之。則傷液。不應汗而汗之。則傷津。津液枯燥。筋失所養。而病痽者。不可以外感痽病治之。當以專養津液為務也。

黃坤載曰。風病木枯血燥。下之津血內亡。則成痽病。復發其汗。津血外亡。必苦拘急。

○唐容川曰。剛痽柔痽。皆傷寒之兼見者也。乃痽症門主中之賓。非痽之正症也。此與節發汗下後亡津亡血。因致痽病。乃是此症之主。後人不知痽是亡津血所致。而誤認剛柔痽為正病正方。所差不淺。只緣讀仲景書。未能將賓主分清耳。此節

詳瘡之由。是瘡病之正症也。然仲景未出方。亦以症明而方自可知。故不再贅。以下舉三方。皆非正治法。但知兼治之法。即知正治之法矣。借賓定主。仲景文法。多如此。

考槃按

唐註以亡津亡血為
痘症之主。精當可從。

瘡家雖身疼痛。不可發汗。汗出則瘡。

方中行曰。血熱則生瘡。身疼痛者。血濇不利。乖而不和也。汗者。血之液。發而迫使之出。則血愈傷而愈不和。故致瘡也。

徐忠可曰。瘡家血本虛燥。以疼痛為風。而發其汗。則液亡。筋燥而不能和調。乃亦為瘡。

汪訏菴曰。表虛熱聚。故生瘡。汗之。則表益虛。熱愈甚。而生風。故變瘡。

魏念庭曰。瘡家則表虛血熱之人也。表虛則易感外邪而生疼痛。血熱則易致液出而汗淋漓。主治者遇此。於治表邪中必顧其正虛。於宜取汗處。必慮其血亡。若孟浪而為發汗。汗斯大出。表乃益疎。邪溼必因衣被之沾濡。遂入經隧而為患。兼有血虛之熱。溷雜於脉道之間。風溼熱三邪。相參錯於太陽之分。而瘡病成矣。黃坤載曰。瘡家膿血失亡。筋脉不營。雖感風寒。不可發汗。汗出血枯。筋脉焦縮。則成瘡病。

章虛谷曰。氣血周行。外而皮毛經絡。內而肌肉筋骨。藉以滋養。瘡家多傷經脈。氣

血耗損。雖無外邪。身常疼痛。若感外邪。仲景亦禁發汗。必用和法。如或發汗亡津。

必成瘻病。以上三條。因雖不同。同為脫液傷津之虛症。治之必當養其氣血也。

後學考槃謹按

靈樞營衛生會篇曰。每血者無汗。每汗者無血。瘡家營血已盡者復發汗。血液重傷。筋脉失潤。雖欲不瘻。不可得矣。○傷寒論原文

複見

病者身熱足寒。頸項強急惡寒。時頭熱面赤目赤。獨頭動搖。卒口噤。背反張者。瘻病也。若發其汗者。寒溼相得。其表益虛。即惡寒甚。發其汗已。其脉如蛇。卒。蒼波切。巨葉切。

成無己曰。太陽中風。熏感寒溼。乃變為瘻。身熱足寒者。寒溼傷下。時頭熱面赤目赤。

風傷於上也。頭搖者。風主動也。獨頭搖者。頭為諸陽之會。風傷陽也。若純傷風者。一身盡搖。手足搐搦。此者內挾寒溼。故頭搖也。口噤者。寒主急也。卒口噤者。不

常噤也。有時而緩。若風寒相搏。則口噤而不時開。此者加之風溼。故卒口噤也。風

寒客於足太陽。故筋脉拘急。頭項強。背反張也。若發其汗者。陽氣徒虛。而邪不復

出。且反以動其溼。而溼不去。兩相搏葛。蒂固根深。遂使衛氣更虛。較之未汗前之

惡寒。為尤甚矣。試言其脉。則因誤汗逼令真陽脫入溼中。所以形容其如蛇也。言

脫出之陽。本疾急親上。輕矯若龍。為溼氣所紐。則遲滯如蛇之象。儘力奔迸。究意

不能奮飛矣。此脉之至變。義之至精者也。按。若發其汗。下。孫趙以唐補註。

徐忠可曰。前言無汗反惡寒為剛瘡。有汗不惡寒為柔瘡。此辨瘡之法。非瘡家本症也。故復舉瘡症之最備者以言之。謂病者身熱太陽表邪本盛。乃因血夜衰少之人。寒邪復挾溼搏結衛中。陽氣不下而足寒。溼隨太陽經下項。稍侵陽明而頸項強急。真陽不達於表而惡寒。於是太陽經無非寒溼而格熱於上。而頭熱面赤目赤。獨頭動搖。太陽主開。寒溼搏之。開闔不利。不能發聲而卒口噤。液衰邪盛。筋失所養。而背反張。此瘡病本然之形證也。因而發其汗。或寒為溼所繩而不去。從汗虛其表耳。故曰寒溼相得。其表益虛。則惡寒益甚。若發汗已。脉上下不動而中行如蛇。正虧邪亦衰矣。按諸瘡項強。皆屬於溼。乃仲景論瘡前後未嘗重溼為言。即後出方藥味。亦不專主溼。僅於此云寒溼相得。畧露機微。後立三方。仍治風寒。或主驅熱。可知瘡症之溼。非溼流關節之比。但風寒為溼所搏。故仍以治本為急也。然則瘡症之溼。從何來乎。不知瘡之根原。由亡血陰虛。而瘡之溼。乃即汗餘之氣。搏寒為病也。故產後血虛汗多。則致之。太陽病汗太多。則致之。風病下之。而并耗其內。則致之。瘡家發汗。則致之。此仲景明知有溼而不專治溼。謂風寒去而溼自行耳。

程郊倩曰。瘡病在筋。種種多端。或寒溼為拘。或火熱為燥。或亡血失津。而不得滋養。皆能病筋而成瘡。是瘡之來路。不能指定一病名之。自不得不於症上定名耳。

身熱足寒。頸項強急。亞寒時頭熱面赤目脉赤。由下虛而上盛。中枯而外熾也。然此太陽中同有之症。模糊疑似之間。不足定其為何病。湏於其獨處觀之。獨者何。頭面搖卒口噤。背反張是也。有此三症。顯出筋病。則症與非症可一望而決矣。傷寒不能混也。若發其汗。下文義不屬。存疑待考。

周禹載曰。身熱足寒。傷痙而中風也。風虛溼搏。故顯出以下諸症。風主動搖。溼主拘急。風主陽。本乎天者親上。是以獨頭面搖。溼主陰。本乎地者親下。是以足脛寒逆也。若發其汗。下六句仲景復為悞治。註脚蓋發汗反惡寒者。以但用表藥而不加术故也。陽氣素虛之人。但發其汗而無术以固中祛溼。是使汗出之時。陽氣外越。脉必洪盛。汗後氣門反閉。陽氣退潛。寒溼之邪。汗藥引動。所以脉見浮緊。而指下遲滯不前。有似蛇行之狀耳。

魏念庭曰。此條乃申明痙病有屬於風邪挾溼之柔症者。歷舉諸症。示人知其辨驗。方可明於立法而知禁也。病者身熱足寒者。外感之風邪。鬱於表分。則身熱所挾之溼。阻於裏分。則足寒也。頸項強急。面赤目赤。獨頭動搖者。無非風挾溼邪。鬱開其表。溼挾熱邪。盛行於裏。風挾溼而外鬱。鬱久而熱愈深。溼挾熱而上炎。炎甚而風更厲。總為風溼挾熱之邪。內經所謂溼上甚為熱者。此也。以致血耗於內。而隧道空虛。風行於身。而拘急筋骨。為卒口噤。為背反張。無非風熱鼓蕩於中。而溼

邪留滯其間。正氣不為舒通。病邪瀰漫莫制。此瘡中最盛之邪也。法當驅風固衛。除溼清熱為治。乃發其汗。汗出而表虛生寒。且汗出而溼邪遂滋。寒溼相得。成爲一家。表正已虛。不可開散。於是惡寒更甚。而正陽愈微矣。此與太陽中風發汗。過多之亡陽相類。其陽宜乎。遲於奔脫矣。然其中間雜溼邪。雖為病氣。却是羈絆陽走之物。陽欲因汗出亡。又因溼濡滯。所以診之。而其脉如蛇。夫弦直為瘡病本脉。今又言蛇。則為瘡病變脉矣。乃欲伸因溼不能伸。欲屈因風不能屈。陽之離合去留。均在未可知也。可不急為匡救乎。此柔瘡不治風溼。而悞為發汗亡陽之禁也。凡治柔瘡者。當謹識之。勿悞也。

尤在涇曰。瘡病不離乎表。故身熱惡寒。瘡為風強病。而筋脈受之。故口噤頭項強。背反張。脉強直。經云。諸暴強直。皆屬於風。是也。頭熱足寒。面目赤。頭動搖者。風為陽邪。其氣上行而主動也。寒溼相得者。汗液之溼。與外寒之氣相得不解。而表氣以汗而益虛。寒氣得溼而轉增。則惡寒甚也。其脉如蛇者。脉伏而曲如蛇行也。瘡脉本直。汗之則風去而溼存。故脉不直而曲也。

陳修園曰。經云。諸暴強直。皆屬於風。因於風者。上先受之。故病瘡者。上而身熱。未及於下。故下而足寒。風傷太陽之經。故頸項強急。風傷太陽之氣。故通身惡寒。陽氣上行於頭面。故時頭熱面赤。太陽之脉。起於目內眚。風熱傷於經脉。故目赤。頸

項皆強急而不能動。獨頭呈風象而動搖。強急則筋不舒而牙關緊閉。且風客會厥而語言不出。所以卒然口噤。背反張者。風邪入於輕輸也。此痙病本症之形狀也。若不知其為痙而誤發其汗者。汗之沾濡衣被為溼。溼之陸續不乾而生寒寒溼相得。其表因汗而益虛。即惡寒甚。蓋痙之未成太陽原有惡寒之症。而痙之既成。陽邪用事。熱甚灼筋。何至惡寒之甚。此為誤治而一變也。發其汗已。不獨症之一變。而其強直之脉亦變屈曲如蛇。全失和緩之象矣。

暴腹脹大者。為欲解脉如故。反伏弦者。痙。

喻嘉言曰。此節不叙病之原委。突云欲解。如禪家半偈。令人何處下參耶。試一參之。妙不容言矣。蓋傷寒傳至厥陰。有欲解者。有過經不解者。此之出欲解之症。復出不解之脉。殆謂痙傳厥陰。其經已盡。解與不解。辨其脈症而可知也。欲解之症。厥陰之邪必傳脾土。尅其所勝。腹當為之暴脹。本內經厥陰在泉。民病腹脹之義。以論症。亦見厥陰不再傳太陽。而但轉太陰。邪欲解耳。解則其脈必見微浮。何以知之。於傷寒厥陰中風脈微浮為欲愈。不浮為未愈而知之也。若脉仍陰象。反見伏弦。必自病其筋脉而拘急成痙。亦如過經之例。未可定其解期矣。至於論治。溫救其陽可也。

徐忠可曰。暴腹脹大。是經絡之邪欲從內出。故為欲解。若脈仍如故。反伏而弦。是

寒邪留經痙病仍在也

魏念庭曰。痓病表症也。腹脹裏症也。痙病之邪原屬風寒。挾溼必風寒外解。不與溼邪相麗。而後溼邪無所依着。不得不順其下墜之性。入復作脹矣。風寒外解而溼下行。所以為欲愈之機也。如是診之。脉必浮而不沉緩而不弦。乃診之脉如故。且反伏弦。則邪入裏愈深也。以此可知。痙病有暴腹脹大而病不已者。以溼氣內盛所致。設圖維之於早。從表症治。何至貽溼邪內盛之憂乎。此亦醫家失於延誤之過也。

陳修園曰。此承上節汗後變症變脉外。又變一脉症也。師不出方。余於傷寒論發汗後腹脹條悟出厚樸生薑甘草半夏人參湯。俟其脹稍愈。再以法治之。

章虛谷曰。此言發汗後之變症也。邪在太陽陽明之經筋。如暴腹脹大者。邪離筋而傳陽明太陰之經絡。為欲解之兆也。若邪外出。脈必浮而調直。倘脈如故。或反伏弦者。此痙病更深矣。蓋筋為肝之合。其邪內侵。肝氣鬱逆。來犯脾土。其腹暴脹。故病更重也。弦為肝之本脈。伏弦則肝氣沉鬱可徵矣。

唐容川曰。此當與上合為一節。言太陽痙病。若發其汗而未合法者。寒溼相得。其表又因汗而益虛。即惡寒甚。其脈必緊急而痙不解矣。若發其汗而得法者。汗已後其脈變緊急為緩曲如蛇狀。謂不弦急也。變背反張為腹脹大。乃陰來和陽。其

痺為欲解。若發汗後脈仍緊急如故。反加伏弦者。其痺不解也。作如此解。文理甚通。割作兩章。則不可解。

考槃按此節突云暴腹。脈大。喻註力贊其妙。終非確義。唐註合上節解之。可謂得體。終

夫痺脈按之緊如弦直上下行。

魏念庭曰。弦者風象也。緊者寒象也。合緊與弦直上下行辨之。知風寒按溼流連於脈道。邪氣有內。而脉見直上直下之診也。並正脈失其正象。俱為邪氣所侵奪。而以病脈之形為形矣。此仲景善於形容脈情。而示人。因是以求病邪之情也。尤在溼曰。緊如弦。即堅直之象。李氏曰。上下行者。自寸至尺。皆見緊直之脈也。脈經亦云。痺病脈堅伏直上下行。

8金鑑曰。痺之為病。其狀勁急強直。故其脈亦勁急強直。按之緊勁急之象也。如弦直行之象也。

章虛谷曰。按之者。脈沉而不浮也。緊者。如絞索之狀。陰邪凝斂故也。條長如弓弦。名弦。如弦之直而上下行者。有升降而無出入也。蓋人身氣血。表裏周流。故脈有升降出入之象。自尺而上於寸為升。自寸而下於尺為降。自沉而浮為出。自浮而沉為入。因邪閉於筋。經絡之氣不得外達周流。故其脈在沉部上下行。有升降而無出入也。是為痺病之脈。與太陽風傷衛之脈浮緩。寒傷營之脈浮緊者。又不同。

矣。

痙病有灸瘡難治。

趙以德曰。痙病由風熱燥急其筋骨。不當復灸以火。且助火深入。風熱得之愈固而不散。所以難治。

徐忠可曰。治痙終以清表為主。有灸瘡者。經穴洞達。火熱內盛。陰氣素虧。即後括薑桂枝湯。葛根湯。嫌不遠熱。大承氣更慮傷陰。故曰難治。

尤在涇曰。有灸瘡者。膿血久漬。穴俞不開。婁全善云。即破傷風之意。蓋陰傷而不勝風熱。陽傷而不任攻伐也。故曰難治。

金鑑曰。痙病宜灸。如有灸瘡而不發膿。則為營衛已絕。故曰難治。

黃坤載曰。灸瘡艾火燔灼。焦骨傷筋。津血消燬。未易卒復。故難治也。

陳修園曰。痙為太陽中風之病。風為陽邪。誤用燒鍼則為逆。若見有灸瘡。則風火交煽。直陰立亡。難治。此一節言痙病誤灸之難治也。師不出方。傷寒論火逆之方。亦恐其過溫。余用風引湯減去桂薑一半。研末煎服。往往獲效。

章虛谷曰。灸瘡因火而發。血液已損而內熱也。又感外邪而成痙。若清熱養血則

太陽病。其證備。身體強几。然脈反沉遲。此為痙。括薑桂枝湯主之。

及音