

增訂洪氏女科一盤珠上卷

金川邑庠生洪金鼎玉友氏纂男源 洛泰訂

調經論 附錄

女子二十七^四天癸期至。調經察脉要分明。兩手尺脉皆沉伏。此病分明是閉經。肝大肺小應有子。兩尺不斷滑方真。心腎俱旺知是孕。肺大肝小孕不成。寸左滑寔為男脉。右尺沉滑女現形。肝肺俱浮胸膈痛。兩關沉緊腹中疼。一月一行為經信。或前或後要留心。先期而行為血熱。後期而至是寒經。經來疼痛為氣滯。行後而痛氣之虛。其色黑者多實熱。痰白而來痰多疑。塵黃水血不足。紫色由來風邪侵。行經之時宜慎重。若有憂鬱血必停。走於腰膝多疼痛。散在四肢則不仁。婦人停於血海。寒熱逆上。忡心患戰驚。此是調經真妙訣。醫人切記信有靈。

夫女體屬陰。其氣應月。月以三旬而一盈。經以三旬而一至。月月如期。故謂之月經。又謂之月信。一有不調。則失其常度。非特不孕。而諸病見矣。故婦人以調經為首重云。

丹溪先生曰。先期而至者血熱也。後期而至者血虛也。然先期而至。雖曰有火。若虛而挾火。則脉必虛而無力。而所重在虛。當以養營安血為主。亦有無火而先期者。則或補中氣。或固命門。皆不宜過用寒涼也。後期而至者。本屬血氣。然亦有血熱而燥。瘀者。尺脉必數。血必色黑。不得不為清補。有血逆而留滯者。不得不為疎利。但調經之要。貴在補脾胃。以資血之源。養腎氣以安血之室。知斯二者。則盡善矣。

行經三忌

一行經感冒風寒。不宜發汗。又不宜速用發散藥。必俟經血行盡。方可服解表退熱之劑。如羌活麻黃桂枝。防風細辛之類。
一行經之時。不宜多浴。冷水恐患四肢麻閉。又不宜多飲冷水。恐傷肺氣。必患聲啞咳嗽。無藥救治。
一行經不宜飲酒大醉。恐引血妄行。四肢又不宜發怒太甚。恐經血必停。變成經閉。又不宜驟用補藥。恐致蓄血。或四肢疼痛。或五心寒熱。為害非輕。

調經主方 不可妄用金石之藥。恐致不孕。當歸錢三川芎二錢白芍二錢地黃三錢甘草陳皮香附四錢各生薑引

一先期而來。血熱也。本方加酒炒黃芩酒炒柴胡丹皮錢一

一後期而來者。血虛也。本方加黃芪酒炒白朮杜仲故芷白苓錢一

一經來痛甚。氣滯也。本方加桃仁靈芝紅花玄胡錢一

上陽掛陽四物湯
 堂歸錢川半
 芍一錢熟地錢二黑姜半肉桂錢一吳于分六畢撥分五



行經數日不止 不與崩帶同治

經水多來皆屬熱四物柴苓湯主之五心煩燥為妙藥不拘肥瘦並相宜

生地二當歸身 白芍錢各一 川芎八分黃芩錢各一

柏酒炒阿膠炒成珠 地榆分荆芥穗錢半

經來色淡不多

經來色淡乃血虛只須八物湯主之肥人痰滯經來少再加半夏與南星

求錢甘草錢南星錢半夏錢一

經水上逆妄行婦人吐衄以調經活血為主不可過血

經來何為日妄行或吐或衄或唾行加減涼膈散來用皆由血熱不歸經

當歸川芎赤芍生地黃芩黑枝仁連翹薄荷丹皮

桔梗柴胡荆芥各等分

一行經或兼鼻血本方加柏茅根髮灰錢一

一行經或兼吐血本方加茜草丹參錢一

一行經或唾中痰中有血絲本方加砂參桑皮側柏葉錢各一

經水或前或後

或前或後不調勻當服溫經滋補湯更有歸附丸尤妙氣盛血虛抑氣湯

溫經滋補湯 治脉虛兩尺微沉眼花目眩腰膝痠痛

當歸 川芎 熟地 白朮炒白芍炒酒白苓 淮山 棗皮錢各一 玄胡炒丹皮小茴香附炒澤瀉杜仲錢一 薑棗引

歸附丸 治氣亂經期或前或後 當歸兩香附兩童便侵透晒乾再加酒醋鹽姜四製醋糊為丸


一經行小腹微痛加莪朮五錢炒 一四肢常怯寒加附子肉桂錢各五

一經行後小腹微痛人參黃芪阿膠錢各五 一血虛加熟地兩

抑氣散 治氣盛血衰前後不如期所以不孕 陳皮兩香附兩三 茯苓神朮甘草兩半 右為末每服二三錢

經閉不行三候

一則脾胃有損傷食少血虧非血停急宜補脾還養血血統氣足經自行一則憂怒損肝經肝火鬱閉經始停開鬱二陳湯急用四製女神丸亦靈一則體肥痰滯壅故令經血不能通加減導痰湯作主多服方知約有功未嫁愆期經忽閉急宜婚嫁自



然通。

補脾散

治婦人血虧經閉。黃芪當歸白朮各二錢仁志肉茯苓神人參各一錢砂仁甘草各半錢包員引

又方 治同上

血氣屢驗。并治血枯氣鬱。當歸五錢川芎三錢上肉桂半錢丹參五錢烏賊骨為錢澤蘭葉二錢酒收服加醋

開鬱二陳湯

治肝火鬱。經閉不行。蒼朮陳皮茯苓半夏各二錢當歸川芎香附橘皮枝仁炒青皮醋炒各一錢

女聖丸

治氣盛經閉。香附一錢童便浸透晒乾醋糊丸

導痰湯

治體肥痰滯。經閉不行。陳皮蒼朮南星半夏各二錢茯苓枳實甘草當歸各一錢

一白多

加乾姜肉桂丹參各一錢

經閉飽脹腹痛

經閉飽脹有主方。皆用通經活血湯。丹皮荆芥川牛夕。赤芍歸芍生地黃。桃仁肉桂與紅花。澤蘭枳殼生蒲黃。久開腹中成痞塊。更加莪朮與檳榔。又方一味丹參作丸。亦可通經。

閉經集要

一性沉多慮吞酸胸滿。經水不行。用補中益氣湯加枝仁香附。方見後崩症門。

一素有胃火口臭。牙根腫痛。消灼陰血。經水不行。用逍遙散加丹皮黑枝仁。方見後崩症門。

一久病氣血兩虛。經水不行。朝用補中益氣湯。暮用六味丸。

一寡婦尼姑經閉不行。多因情慾不遂。或因憂鬱而致。宜服開鬱加味逍遙散。

一女子年二三十歲。月水不行。又無病症。名室女終身不孕。不在閉經例論。一室女經來復止。又無病。名經歇。非病也。

一婦人終身不行經。而反多孕者。亦常有之。不必服藥。

一經閉服破血破氣藥而不應者。宜養血。俟其自行。不必再損元氣。恐生他症。慎之。

崩症三候
血崩之症。分五名。赤者。汁如洗絳形。黃如爛瓜流黃水。白猶鼻涕不流停。青則恰如青靛色。黑乃紫血黑塊凝。血未來時先發熱。此因肝火內相侵。清肝涼血有主方。加味逍遙實可尋。血虛氣弱血來崩。脾歸湯吃信為靈。白崩之症。另有方。八珍加減不



須驚。綠色肝火也黃色脾之濕熱也白色氣虛也青色肝脾實熱也
加味逍遙散 治崩症色如絳汁。靛汁。紫汁。黑汁。等症。

當歸 白朮 白芍 白苓 白苓 柴胡 丹皮 黑枝仁 銘一 薄荷葉 五

歸脾湯 治崩症。色淡白。或流黃水。人參 當歸 白朮 茯神 志肉 棗仁 炙草 密氏 銘一

一血來不止不發熱五心不煩加續斷阿膠杜仲。錢各一

一血來小腹微痛如小茴吳子。錢七

八珍湯 治崩症紅少白多。熟地 白芍 川芎 白朮 白苓 人參 炙草 半錢

一白多四肢怯寒加熟子肉桂黑薑吳子。錢七

血崩心痛

婦人血崩。血心痛甚。名曰殺血。心痛由心脾血虛也。小產去血過多。而心痛甚者亦然。用烏賊骨。炒為末。醋湯調下。即止。失笑散。靈芝。酒蒲黃為末。散合用為妙。痛止仍多服歸脾湯。失笑散。靈芝。酒蒲黃為末。

崩症四宜

一下鮮血過多宜止血。用十灰散。藕節 連喬 大小蓳三味。恐難卒崩艾草 棕 側柏葉 乾薑 乾漆 人髮各味

俱燒灰。共為細末。童便酒水調勻服之。每服三錢。

一血漸止仍發熱宜服涼血地黃湯。併兼頭痛。生地 當歸 錢二 黃連 三分 黃柏 知母 錢各一 升麻 柴胡 黃芩 防風

羌活 甘草 荊芥 蔓京 各七

一血止後又宜補虛。用補中益氣湯。加減 黃芪 人參 當歸 白芍 熟地 茯苓 各錢 升麻 柴胡 黃柏 酒 知母 水

炒 各七分 甘草 分

一崩症日久血來色淡不多宜服八味地黃丸以收全功。

崩症捷錄單方

消汚湯 治血崩。乾荷葉 一大把 煎湯 一碗 空心服 一腹痛加香附。

備金散 治血崩氣痛。香附 歸尾 靈芝 炒 共為末 醋湯調下。

靈芝散 治同上 五靈芝 炒 盡 研末 溫酒調吃。



夏枯草散 治血崩如鼓汁。夏枯草炒研細末。米飲調下。

獨聖散 治風入胞門。忽下鮮血。陰戶作痒。北防風炒研末酒調下。

黃芩散 治風熱入肝。經崩下發熱。手心灼熱等症。黃芩酒研細末。荊芥湯下。

地榆散 治血崩血熱。地榆二兩。剉片。以醋二斤煮。十餘沸。去。白芍一兩。酒炒。黃芩一兩。側柏葉一兩。酒炒。共為末。酒調服。

六一散 治血崩腹痛。白芍一兩。酒炒。黃芩一兩。側柏葉一兩。酒炒。共為末。酒調服。

柏黃散 治血崩不止。黃芩一兩。酒炒。柏葉一兩。酒炒。共為末。酒調服。

無比散 治血崩目痒。晚奎砂一兩。炒。為末。酒調服。

一笑散 治血崩如絳色。新紅絢二兩。酒炒。為末。酒調服。

香礬散 治白崩。香附二兩。白礬二兩。酒炒。為末。酒調服。

髮灰散 治血黑血塊不止。人髮四兩。皂角二兩。酒洗。淨。烘。為末。酒調服。

如聖散 治血如山崩。棕灰烏梅肉反燒。黑薑灰。共為細末。烏梅湯下。

醫按

一婦人初患血崩。下黑塊。小腹痠痛。予用四物湯去舊生新。加柴胡黃芩蒲黃香附桃仁靈芝童便涼黑為引。四劑痛止。仍下

血塊。又用歸脾湯。加阿膠續斷艾茸。二劑漸愈。後去木香。十劑全愈。一婦人行經三日。前。骨中發熱。下血如崩。諸醫皆用涼

血止血藥。不應。予用加味逍遙散。加知母黃柏。每月服七八劑。三月全愈。因素有憂鬱。而致。方見前。一婦人年愈四十。患

崩症。白多紅少。予用歸脾湯。去木香。加阿膠續斷。吳于。滾水。泡熟。地黃丸。杜仲故芷。燼水。十劑而愈。方俱見本門前

赤白帶下

赤白四物用芩黃。黃連升麻丹皮一併煎。白帶六君加蒼朮。吳于黑薑。寔可痊。方見前。白淫白濁另有方。逍遙散加枝子。炒。良

再用黃柏與知母。此為濕熱在膀胱。方見前。老年白帶多氣虛。補中益氣湯可除。增入黑薑茯苓半夏。引加薑棗自然痊。方見

前血崩門

赤白帶下單方

白芷煖宮丸 治赤白帶下。及漏下五色。白芍酒炒。白芷。禹餘糧火煨。醋碎。七次細研。黑姜灰。花椒去艾葉。炒。川芎。錢各七

共為末。煉蜜為丸。



南京中醫藥大學圖書館藏

白芷散 治赤白帶下。白芷兩烏賊骨炒五 髮灰銕共為細末。酒調吃。

崩漏帶下危症

一崩帶日久。純下臭黃水。或帶紫黑筋塊。腥穢不堪者。不治。

一崩腹滿不能飲食。不受參朮補益者。不治。

一崩帶服大劑後。反加寒熱口燥。面目足脛浮腫者。不治。

一崩帶已止。小腹不疼。後變陰戶腫脹。痛如刀割者。死期迫矣。

小便淋瀝

一淋滴小腹痛。四物湯加香附烏藥。不痛四物湯加阿膠艾葉黃芪。小腹微痛。按之即止。四物湯加人參黃芪升麻艾葉。

一白淋者。多起於鬱傷元氣。小腹不疼。宜人參養營湯加香附。或補中益氣湯下歸附丸。方俱載本門後

將成血淋。宜八珍湯。方見一血淋。月事三五日一至。積數月不愈。腹痛。四物湯加烏藥香附莪朮木香。

一小便尿血。用逍遙散加髮灰黃苓。

一小便難澀。痛不可忍。用歸附丸加童便炒黃荊子通草炙蚯蚓為引。或用六味地黃丸加通草蚯蚓。

經候撮要雜論

經水三月不至。其脉右手浮大左手反弱。其經當下。此為居經。非妊也。當抑氣養血。脉微濇者。亦非胎也。

一經水絕後一朝而便血二三日不止者。不須治。當自止。

一下痢而經不行者。痢止自來。蓋下痢則津液亡。津液復。經當自下。不必服藥。一婦人有鬼胎。癥塊。丹方服芫花一味下黑。

勿效。後用養血養氣藥。

一婦人年十七八歲。無病。月水如期不斷者。血氣有餘也。若或反多。或一月兩至者。氣虛不能統血也。宜大補氣血。

一寡婦尼姑。經不調。增寒壯熱。頭目昏花。慾不遂也。宜女聖丸。方見前又名抑慾丸。或加味逍遙散。皆見效。方見前

一娼妓本無閉經之理。間或有之。勞也。十全大補湯加肉桂。

立身以來。全不產。反斷產後。十年二十年不產。此胞門不淨。宜朴硝盪胞湯。方見求

求嗣門述古併附丸方

無男女。乾坤幾乎息矣。男女匹配。所以廣嗣。厥係匪輕。必陽道乾健而不衰。陰陰應候而不慾。陰陽交暢。精血合凝。而胎元易。



錢共為末煉蜜為丸

五子衍宗丸 此方添精補髓疏利腎氣服之令其多子 枸杞八兩 兔絲餅兩北五味一莢盆子浸一宿淨前子水炒

共為末煉蜜為丸

煉真丸 治高年體豐痰感飽飲肥甘恣情房屋上感下虛及髓臟中多著酒濕精氣不絕不能生子服之並效

大伏子 治兩便便蒼朮人參茯苓各三黃柏三兩重便乳汁鹿茸三兩大苗兩淫羊藿一兩油炒澤瀉蛇床子酒蓮

沉香切切五五味子酪一川練子三鳳眼草樹根皮無以之右約末醋糊為丸煉真者煨煉精氣使之純粹方中以大伏

子黃柏蒼朮滌除身中素溫濕熱則香茸不致反助濁濕痰氣何患年高艱嗣哉

續嗣降生丹 治男子腎虛精寒併婦人子宮虛冷

當歸酒洗杜仲炒水茯苓神益智仁炒水龍骨煨桂心切見乾薑半生熟吳茱萸開水泡川椒目去烏藥各一白芍酒炒川牛夕酒法

半夏防風秦艽石菖蒲北細辛桔梗各五附子裏煨熟取砂留為衣牡蠣四十九日用硫磺一兩為末酒

和塗煨皮紙糊定以醋鹽斤煨過為末每料用二兩糯米糊為丸

河車種玉丸 服之令人多子 紫河車一具去胞內瘀血以米泔水洗淨放石臼內生拌如泥用山熟地兩八枸杞兩白芍皮去

乳神當歸人參兔絲阿膠炒各丹皮白薇酒洗各沉香見火桂心棗皮各二香附用三兩女人不用川芎男不

用共為末煉蜜為丸

八珍益母丸 治婦人無子服一月即可受胎經不調者服之即調經不通者一料即通胎前產後諸病極穩

人參白朮炒白芍川芎各一當歸熟地各三炙甘草錢五白芍一兩益母草四共為末煉蜜為丸

秦桂丸 一名益斯丸 治子宮虛冷不成孕 厚朴煨汁熟附子肉桂杜仲炒水北細辛秦艽白薇半夏製

當歸川牛夕沙參白茯苓人參各二共為末煉蜜為丸服後受孕忌食牛馬肉犯之難產

朴硝盪胞湯 治婦人立身以來全不產及斷緒不產 朴硝牡丹皮當歸大黃桃仁各二厚朴桔梗人參赤芍白芍肉桂甘

草牛夕橘皮附子各一服後下濁物子宮潔淨後服八珍益母丸無不見效 本方去蟲水蛭

保胎要論

保胎之法要精詳說與醫人仔細看古方安胎和氣飲不宜早用墮胎元我今按月定主方依方取用自安康論胎猶如一

鐘擊之必用好堅梁氣虛恰似梁木朽墮胎猶如鐘墮梁四月以前少胎氣和氣無如益氣良予補先賢所未及養血養氣固



胎元五六月間胎氣逼。安胎和氣飲相當。八九十月達生散。前人酌見極精詳。胎家雜病最多般。另立良方作主張。二方載本門後

述古格言二條

震風之喜。肝有徵。妊娠之脉必確。尺數闊滑而寸盛。陽搏陰別而雀躍。精神雖倦。今挑腮更研。飲食惡阻。今天癸不落。無妨惡阻之害。所慎漏胎之濁。熱要清脾。不可弱。熱若盛。今而胎動不安。脾若虛。今而胎危。易墮。惟以安胎為本。其餘雜症。為末。此速進先哲之格言。宜後人之守約。

胎元雜症論

子懸急痛而勿疑。子癎卒倒不可愕。子滿胎肥而氣壅。子瘕脾虛而氣弱。子煩子瘳。今胎熱所為。子腫子氣。今胎水所作。子嘔子痢。今病轉劇而胎損。傷寒傷食。今疾若多而成惡。常慘常笑。今肺氣結而非崇。暴啞勿語。今心虛血而勿約。胎若肥而瘦。胎連進脉怕微而診脉休錯。

按月立方論

一月猶如露上珠。古人名曰是胎胚。血氣稍虛。胎即下。當歸散用為最宜。二月名為桃花瓣。恍如秉燭向風邊。勸君多服當歸散。孕婦自然神氣全。三月恰似鼻清涕。或男或女自茲分。相火上冲胎易動。當歸散用是真詮。吐思食精神倦急墮者

無寔然三月因黃芩以清熱是益之也。胎反墮者其故何哉。蓋由氣虛則胎易動。偏用伏毛紫蘇香附陳皮以行氣者。虛之人墮胎甚速。惟太山盤石散千金保孕丸。然此聖藥。湯干金鯉魚湯當歸散皆可選用。新增安腎丸尤妙。方俱在本門後。

四月成形與手足。在娘忌食獾兔肉。當歸散內加陳皮。少加黃芩一併服。無火者不用。五月從來毛髮生。男左女右一般看。胎氣上冲多腹悶。安胎和氣飲相當。六月生筋與口鼻。安胎和氣飲相覓。再加杜仲與阿膠。艾葉茯苓皆可吃。七月胎元骨節成。安胎和氣飲相宜。腰痛腹疼兼飽脹。杜仲艾葉再加臨。八月由來長皮膚。孔竅因之自此開。達生散用為斟酌。故並杜仲續斷亦妙哉。九月百節皆成就。達生散用好安胎。再加益母草半兩。倍加歸芍自無災。十月懷胎神氣完。瓜熟蒂落一同看。清熱和氣無產患。子兒生下自相安。此月達生散倍加黃芩枳壳以清胎熱。

保胎免臍風論

凡小兒初生患臍風。在富貴之家居多。貧乏之家甚少。其故何哉。予每究心。其中常見富貴孕婦。多服補藥。飲食厚。熱積胎元。至九十月。猶不知服清胎熱之藥。故令小兒生下。面紅目赤。牙根時生。時白。點大小便艱澀。或用三黃解毒者。有之。或用祛風清熱者。有之。此治臍風之已然。或有一二全其生者。一入庸工之手。即用針挑。致令牙床腫硬。不能吃乳。不曰馬口。臍即曰

撮口臍。束手不救。吁可嘆哉。萬不獲已。即用針挑。隨用礪砂三分。雄黃二分。淨青黛一分。生蒲黃一分。共為細末。磨京墨調搭牙根。以封針口。退熱止血。庶免腫脹。予今按月以安胎家之藥。四五月以前。養氣補血。以固胎元。九月十月以後。倍加養血。枳壳以清胎熱。生兒下地。自無臍風之患。知醫者審之。

安胎方列後 驗胎散 經水不來在疑似。以川芎為末。煎艾湯調下。覺腹中動。胎也。臍下動。血蝦也。

當歸散 安胎方 驗胎散 經水不來在疑似。以川芎為末。煎艾湯調下。覺腹中動。胎也。臍下動。血蝦也。

為引 一氣虛。加蜜炒黃芪。錢。人參。錢。火嘔。加黃芩。錢。五分。一腰痛。加杜仲。錢。水炒。續斷。錢。半。

佛手散 明眼 當歸身。錢。大川芎。錢。煨姜。引。

泰山磐石散 治慣小產屢驗。人參。黃芪。當歸。續斷。各一錢。黃芩。酒炒。川芎。白芍。熟地。各一錢。

草 砂仁。各六錢。糯米一撮。

千金保孕丸 治孕婦腰背痛。將患小產。續斷。酒洗。杜仲。酒洗。山藥。醋糊為丸。

千金鯉魚湯 安胎兼治孕婦浮腫。當歸。白朮。三錢。白芍。錢。白苓。錢。陳皮。錢。用鯉魚一付。煮湯一大碗。代水煎。續斷。煨姜。

為引

加減安腎丸 服養血安胎藥。皆不應。予制此方神效。

藥仁。山藥。錢。熟地。錢。杜仲。錢。續斷。錢。當歸。錢。石斛。錢。白朮。阿膠。各二錢。故芷。鹽水。白芍。酒炒。各一錢。此方滋陰為

主以胎繫於腎故也。

熊氏黑魚湯 安胎極妙。此方本熊大老爺傳。

用黑魚。兩。取肉。酒洗。過同母雞一隻。炒煮一齊吃下。慣小產者。服數次。可保無虞。兼進磐石散。

安胎和氣飲 古方 藥劑以和胎氣。可服。安胎和氣飲。黃芩。熟地。當歸。川芎。白芍。人參。甘草。砂仁。陳皮。蘇葉。煨姜。等分。一同煎

并治懷胎。二三月。惟有體虛不可服。

達生散 古方 懷胎八九月。可達生。紫蘇。大棗。皮。人參。白朮。甘草。陳皮。當歸。白芍。隨再加益母。砂仁。入胎。婦臨盆先服之。

束胎散 懷孕至九十月。體盛。胎肥者。服之。自易產。黃芩。酒炒。白朮。各錢。陳皮。白茯苓。錢。黃陽。腦。為引。尤妙。

瘦胎散 治妊娠體肥。胎氣不運。九十月。方可服。瘦弱者。不可服。恐傷正氣。黃芩。酒炒。白朮。兩。炒。枳殼。半。三共為末。每服

二錢。



妊娠雜症各俱於後

一感冒風寒發熱四肢痠痛以安胎為主一切犯胎雜藥禁用加減當歸散以散之

當歸 川芎 白芍 甘草

白芷 防風 桔梗 前胡 紫蘇各等 生薑引

一發熱頭痛不止加京子白菊柴胡各一錢

一發熱體寔無汗加細辛五分葱腦豆豉生薑為引

一壯熱口渴煩燥加黃芩柴胡知母麥冬各一錢 燈心為引

妊娠犯傷寒

專以清熱和胎為主各隨六經所見之症治之不可與常病同治恐致損胎宜四味紫蘇和胎飲為主

紫蘇 黃芩酒炒 白朮土炒 甘草蜜炙 姜引

一惡寒頭痛項強腰脊痠疼病在太陽經本方加羌活川芎防風各一錢熱服得汗即解

一惡寒頭痛項強腰脊痠疼病在太陽經本方加羌活川芎防風各一錢熱服得汗即解

一惡寒無熱腹痛吐瀉口渴手足冷病在太陽脾經本方加乾薑白芍各一錢

一惡寒手足厥冷遍身痛如被杖病在厥陰肝經也本方加當歸吳萸川芎細辛各六分

得傷寒五六日後不惡寒不頭痛只發熱口渴咽乾此病邪在裡用黃龍湯為主

一發熱口渴小利不利病在膀胱也本方加朱苓澤瀉赤茯苓知母木通各一錢

一發熱大渴煩燥大便不通病在陽明胃腑也本方加枳實熟大黃以利為度

一發熱乾嘔心煩不得眠病在少陽胆經也

一發熱口渴腹瀉自利病在太陰脾經也本方加白朮白芍阿膠白苓姜棗引

一發熱而渴利下膿血手足冷病在厥陰肝

經也本方加白芍白苓烏梅當歸

妊娠中風

忽然中風口眼斜手足抽掣寔堪嗟只消白朮用三錢荆芥等分一同諗烏豆一合炒浮酒三味同煎總不差若還口禁不下

咽通關散用是良方吹入鼻中竅自利拘口灌下八珍湯

161



北京中醫藥大學

通關散用半分。射五分。細辛八分。牙皂三味共研為細末。吹入鼻中寔可誇。

八珍湯 治中風不損胎。當歸 黃芪 炙黃芩 白芍 秦艽 炙草 羌活 防風 寄生 續斷 各等

妊娠惡阻 多在三月四月到五六月服藥自愈

胎氣沖心成嘔吐。飲食下咽多惡阻。輕者不藥總無妨。重者日久胎須固加減養胃湯速救再有單方亦可治

養胃湯 白朮^{二錢} 炒當歸 白芍^{各錢} 陳皮 砂仁 藿香 神曲^炒 煨甘草 煨薑^{各六}

一體瘦多火口渴。本方去砂仁黃芩竹茹。舌黑加人參黃連^酒三分。

一體肥吐痰水。本方加枳實半夏各一錢。半夏法製健脾化痰之上品。今人以半夏有動胎之性。鮮有用之。予治惡阻屢用

半夏末嘗動胎。蓋有病則病受。無病則胎受也。

又單方治惡阻 半夏^{法製} 陳皮 白茯苓 煨甘草^{各一}

保生湯 治惡阻 人參 甘草^炙 砂仁 白朮^炒 香附 烏梅肉^銹 一口渴而赤加黃連吳萸^{水製}

醫按

婦人有胎二三月常慣嘔吐。數日不食。屢屢墮胎。請予往診。詢其所服之藥。皆用養胃湯。及清火化痰之劑。俱不應。予用炒

食鹽三分。砂糖三錢。煨姜六分。竹茹三分。炒米一撮。煎水三盞。徐徐服之。以開胃口。嘔吐漸止。次日又吐。蛇虫二三條。予將

前方加花椒二分。烏梅二個。以安蛇虫即止。每日少進飲食。又用小鯉魚一隻。蘇葉三錢。同煮。熟去蘇葉。連湯食之。後用養

胃湯徐徐服之。調理一月而安。

一婦人胃寒惡阻。不煩不渴。日久不止。請予治之。予用胡椒五分。煨姜一片。公丁香六隻。陳皮一錢。白蔻仁五分。水煎一服立

止。後服當歸散一月全安。^{方見安胎門}

妊娠漏胎。不拘月數。有之宜速治。血盡必死。

有胎下血名漏胎。氣虛血熱。血乃來。或時點滴。方為漏。血多胎動。恐為殒。加減八味湯速治。氣調勻。血血自回。

八物湯 此方屢效 白朮^炒 當歸 白芍^炒 熟地 黃芩^銹 二黃 黃柏 續斷 艾葉^銹 酒炒 阿膠^{酒炒} 杜仲^銹 鹽水炒 炙

甘草^銹 京墨^{為引}

一服後血仍不止。加人參黃芪^銹 一又。不止。加髮灰^銹 矣。

一漏血氣急。加蒲黃生熟各半。蘇附各六分。陳皮六分。不用參芪。



南京中醫藥大學圖書館藏

乾姜地黃散 治漏胎下血。乾姜皮半錢熟地黃二錢水煎服 一小腹微痛。本方加蒲黃艾草各八分。

一漏下血熱鮮紅。本方加黃芩酒炒八分。歸芎湯 治胎漏下。當歸五錢川芎三錢側柏葉黑蒲黃一錢各水煎好酒童便對服。

四聖散 治漏胎下血亦能安胎。條芩酒炒半錢白朮三錢阿膠三錢蒲黃炒砂仁六分。因暴怒漏胎下血宜用加味逍遙散加阿膠。方見醫按。

脾胃虛弱飲食少思漏胎點滴歸脾湯加阿膠續斷。方見醫按。

一氣虛下陷足腫忽然漏胎宜用補中益氣湯倍升麻。方見前崩症門。

醫按

一婦人懷孕至五月忽然下血點滴不止。予用歸脾湯加減治之。五劑血止胎安。黃芪 人參 茯神棗仁 炒志肉當歸

白朮 白芍 酒炒代炙甘草 各等 外加熟地阿膠小茴故芷柴胡炒蒲黃

一婦人因怒下血動胎。予用加味逍遙散合阿膠而安。方見崩症門。

妊娠咳嗽

傷風咳嗽不須慌。參蘇飲加歸當歸白芍良。好把杏仁易半夏。加入黃芩去木香。三子養親古方宜慎用。蘇沉九寶古方不宜

嘗。二方恐墮胎

參蘇飲古方 人參 體瘦者傷風 陳皮 桔梗 前胡 半夏 以杏仁乾葛 茯苓 甘草 黃芩 去木香 當歸 錢三 白芍

錢三 紫蘇根錢

久咳不已。名子咳。一咳一動小便。來快服人參阿膠散。管教胎固咳安康。以安胎為主。人參 以沙參 茯苓 錢三 炙甘草 蘇葉

分白朮 一錢 白芍 當歸 杜仲 各一

又單方 治子咳不已。米糖兩白菓去心同蒸水吃效。

加減二陳湯 治子咳宜多服安胎止咳。

白苓 白朮 土炒各完膚皮 鹽水浸透去白炙草 錢五 糯米 炒二 共為末 每服三錢

妊娠瘧疾 安胎為主治瘧疾之



懷胎瘧疾苦難當。速用柴胡知母煎。黃芩白朮當歸芍。桂枝蘇葉甘草痊。若將截瘧諸般藥。忽然胎下是誰愆。頭痛川芎加獨活。服之二劑自然安。常山草葉檳榔皆忌藥也久瘧不退恐傷胎。柴胡酒炒白朮及烏梅。首烏石斛參茯苓。用歸芍加入自無災。久瘧首烏用三錢。當歸白朮一同煎。茯苓四味同等分。煨姜黑棗自然痊。不愈古方四聖散。當歸石解各三錢。柴胡甘草各錢半。不須半夏亦能痊。又單方。傳入瘧疾臨期用上肉桂一塊。含口中。少頃又含數次即止。

妊娠痢疾 安胎為主治痢次之

懷胎痢症有主方。生地黃芩白芍當歸烏梅甘。草陳皮和香附。痛甚略加廣木香。有熱柴胡用酒炒。墮胎發散急須防。禁服用皮地榆紅花桃仁二稜義朮青木香之類

血痢不愈用阿膠。黃芩白芍用酒炒。黃連三分。吳萸製炒黑蒲黃真個妙。艾草當歸茯苓用。故芷小茴不可饒。若遠破氣兼行血。忽然胎下貽人笑。

懷胎痢症苦難言。好把三奇湯速煎。黃芪三錢。防風八分。加土陳枳壳一錢。古若黑胎兼口渴。三分增入好川連。此方屢驗無差錯。石榴皮引更能痊。後服三奇湯即安

久痢不安兩足腫。脾氣虧兮恐胎損。歸脾湯用加故芷阿膠艾葉胎自穩。方見血崩門

妊娠泄瀉

懷胎泄瀉屬脾虧。白朮白芍與當歸。土炒欠實山藥和肉寇。煨去油蓮肉糯米並茯苓。口渴腹痛炒黃芩。傷食神曲兼用之。補脾不愈屬氣虛。補中益氣用之宜。要加故芷同肉寇。炒熟吳于亦用之。方見前血崩門

夜來泄瀉為腎瀉。六味地黃真奇絕。二神故芷與吳萸。泡二分糯米同加泄自歇。藏寒食不變色加附子肉桂

久泄單方 糯米一升。炒熟每日嚼一二盞即止真神妙。

久泄單方 用糯米半升。炒黃在公猪肚內爛熟。取米晒乾。為末每用六味地黃湯調吃。

醫按

一婦人懷胎泄瀉。每日三次。夜更甚。諸醫用補脾土泄藥。至三月不止。請予調治。予曰。五更泄瀉屬腎虛。此症必是臟寒。遂用六味地黃湯。肉豆寇吳于故芷連肉。數帖稍愈。後加肉桂白姜丁香各五分。皆曰燥熱之藥。非懷胎所宜用。予曰。有病則病受。無病則胎受。遂令服十餘劑全愈。後服八味丸一料。臨產子母皆吉。始信予醫頗有確見。故記之以備後之參攷。

妊娠子癰

子癰由來似中風時醒時發不相同。我有良方來速救。當歸白芍與川芎黃芩酸棗北柴胡。茯神獨活併防風。甘草菖蒲細辛。薄荷橘紅桔梗自然安。

牙關緊閉不能開。通關散用不傷胎。吹後依然昏不醒。徐徐候着不能回。先將竹瀝姜汁取。醒時一灌即胸開。胸開速把前方服。服後方知功妙哉。通關散載妊娠中風門

一婦人懷胎。忽然仆地。脉滑沫出。此痰盛也。予用前方。加南星法半夏廣皮僵蚕各六分。數次而安。

一婦人懷胎。忽然仆地。口噤脉散。腮紅肝火熱也。予用前方。加黃連黑枝仁各五分。二劑全愈。

一婦人懷胎。忽然仆地。手足抽掣。口眼歪斜。此肝感筋強。予用前方。加勾藤寄生而煎後用六味地黃湯。加柴胡白芍勾藤數劑全愈。

癰症要訣

懷胎之婦。忽沾癰。治先尋火與尋痰。脉滑沫出痰為病。脉散腮紅火熱。肝治法先分痰與火。識破樞機總不難。

一眼眶眼下。如炭火薰。眼黑者。火動其痰也。

一眼眶昏沈。或認黑為白。認白為黑。神不足也。

一口吐清水味淡者。脾虧也。昏醒多服歸脾湯。方見血崩門

妊娠子懸

胎氣不和。曰子懸。湊上心胸痛不安。治之只用紫蘇飲。姜蔥為引。自然安。紫蘇飲。陳皮。茯苓。川芎。白芍。當歸。

甘草。人參。用體實者不二素多憂鬱。痰氣乘鬱火升。迫心上。本方加橘紅香附胆星。一氣通。忽然仆地。如子癰之狀。急以童便灌之。後用本方。加勾藤茯神姜汁。

妊娠子煩。此心肺虛熱或痰積於胸所致也

心神悶亂。曰子煩。終朝煩悶。也不難。只消竹葉湯速進。虛用人參麥冬散。竹葉湯。茯神。去皮骨麥冬。去心黃芩。錢半防風。錢半

人參麥冬散。人參。麥冬。知母。生地。茯神。甘草。當歸。蛤等。燈心引。

小柴胡湯。治子煩脅痛寒熱。半夏以陳皮代之。黃芩。酒炒人參。以沙參代之柴胡。酒炒甘草。各等加麥冬。錢一口渴加花粉。八

妊娠子腫。服藥不消產後自消。仍不消者不治。四肢頭面皆浮腫。名為子腫。身體重。又有氣腫不同。看胎水腫。今又不同。我今分別定主方。醫者各宜斟酌用。



一四肢浮腫。皮膚光澤。此土虧不能制水。小便不利。通身腫滿。謂之水腫。宜服。茯苓湯合五皮飲。先服生黃芪。防已生

姜路三錢 茯苓 當歸 川芎 白芍 黃芩 川朴 鉅 一大腹皮 桑皮 茯苓皮 五加皮 姜皮 各一錢

一四肢麻閉。白芷 桂枝 防風 一發熱頭痛加川芎獨活 鉅一

一胎水腫。通身浮腫。胸物不分。皮下按之深窩不起。宜服千金鯉魚湯。白朮 白苓 白芍 當歸 陳皮 鉅

活鯉魚一尾 煮湯代水煎藥

一氣腫。則時消時復。心腹脹急。宜服紫蘇飲。紫蘇 陳皮 茯苓 赤茯苓 鉅 二 香附 戟當歸 白芍 鉅 一 姜皮 鉅

腫症要論

身半已上腫者。眼如卧蚕。四肢多怯寒者。兼腎風寒宜發散。用生黃芪防已桂枝防風

身半已下腫者。小便不利。宜四苓散。小便清者。脾虧元氣下陷。服歸脾湯。血虧脾門四苓散。朱苓 白朮 茯苓 澤瀉

一唇黑。缺盆平。背平臍突。足底平氣喘。皆不治。

妊娠子氣

兩足腫大。行步難。或流黃水。足指間。此症名者為子氣。不須服藥。無產惠。若還氣粗兼飽悶。天仙散用不煩煩。

天仙籐散。天仙籐青木香 陳皮 木瓜 紫蘇 香附 烏藥 甘草 鉅 等 一脾虧合用尤妙方見前血崩門

妊娠子淋

此症小便淋漓。乃腎間虛熱。移于膀胱。不能制水而成。宜用服火府丹。燈心為引。木通 生地 條芩 酒 人參 門冬

法赤芍 竹葉 甘草 稍鉅 一子淋痛甚。乃膀胱實熱也。宜用黃荊子散。黃荊子 一兩 每用三錢 為

一小便澀少。用六味地黃湯。加麥冬五味肉桂車前子。

又方。麥冬人參北味山藥澤瀉。又方。海金沙藤煎吃效。又方。土牛膝兩。濃煎加乳香少許吃效。

又黃荊散。治血淋。生地黃 川芎 金 生蒲黃 車前子 鉅 二

又方。治子淋。兩足無力。知母 黃柏 二兩 肉桂 錢 共為末。每用三錢滾湯下。

小便尿血。單方。頭髮燒灰。為細末。井水調吃效。

生地黃散。治尿血不止。生地 柏葉 黃芩 阿膠 鉅 三 共為末。水調吃。單方。蒲黃 炒黑 為末。酒調吃效。

又方。當歸 白芷 鉅 五 共為末。好酒童便調吃效。

