

卷七

肺

痿 癰 咳 上氣

卷八

奔 狂 氣

卷九

胸 痺 心 痛 短 氣

卷十

腹 滿 寒 疝 宿 食

卷十一

五 臟 風 寒 積 聚

金匱要略

陸

張仲景金匱要略論註卷七

馮李徐

彬忠可甫著

門人倪

敏任元校

肺痿肺癰欬嗽上氣病脉證治第七

論三首

脉證四條

方十五首

問曰熱在上焦者因欬爲肺痿肺痿之病從何得之
師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從
便難又被快藥下利重亡津液故得之曰寸口脉數
其人欬口中反有濁唾涎沫者何師曰爲肺痿之病

若口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛脉反滑數此爲肺癰欬唾膿血脉數虛者爲肺痿數實者爲肺癰

註曰此言肺痿肺癰一出于熱但肺痿者氣痿而不振乃無形之氣病其成以漸與肺癰之邪入血分致有形血脉壅而不通其源由風者不同也故謂胸中爲肺之府熱在上焦則肺爲熱燥而欬所謂因熱而欬因火而爲肺痿也然亦有久欬而不爲肺痿者則知痿不無因故曰或從汗出是津脫也或從嘔吐是液傷也或從消渴是心火耗其陰

也○或○腸○枯○便○秘○強○利○水○快○是○脾○津○因○下○而○亡○也○
屬○燥○熱○亡○陰○邊○事○乃○胃○中○津○液○不○輸○于○肺○肺○失○所○
養○而○肺○乃○痿○矣○唯○其○因○熱○所○以○寸○口○脉○數○寸○口○
當○以○右○寸○爲○主○然○兩○手○脉○皆○屬○肺○則○數○當○不○止○
右○寸○而○已○數○脉○爲○熱○熱○宜○口○乾○乃○欬○則○濁○唾○涎○沫○
似○乎○相○反○不○知○肺○唯○無○病○故○能○輸○精○于○皮○毛○毛○脉○
合○精○行○氣○於○膚○痿○則○痺○而○不○用○飲○食○之○水○氣○上○輸○
者○不○能○收○攝○而○運○化○則○爲○濁○沫○而○出○諸○口○矣○故○
此○爲○肺○痿○之○病○因○熱○而○失○其○清○肅○之○用○也○若○口○中○

辟辟燥是內有實邪也。欬則隱痛是專有所傷也。更脉滑是邪實不虛也。其爲肺癰無疑甚則欬唾膿血矣。唯其皆屬於熱故脉皆數。但虛實不同故曰虛爲肺痿實爲肺癰。實者卽上滑字義自見。然後章註肺癰本證又曰脉微而數非相背也。滑數者已成而邪盛微數者初起而火伏也。

問曰病欬逆脉之何以知此爲肺癰。當有膿血吐則死其脉何類。師曰寸口脉微而數微則爲風數則爲熱微則汗出數則惡寒風中于衛呼氣不入熱過

於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍于肺其人
則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之
所過血爲之凝滯畜結癰膿吐如米粥始萌可救膿
成則死

註曰此

肺癰之始終全由客邪熱肺痿之因熱

久欬者

證稍驟然其邪之從外而內從微而極

則亦有

也謂肺癰亦傷肺故必欬逆然初時未

見癰證

即欲別其爲癰爲膿血爲死不治非脉不

可其脉

豈即數實乎不知初時寸口脉本微而

肺應之風與
傷寒之風別
真處在榮
猶一在經絡

蓋風脉之形原緩而弱在火伏肺內之時外但見
風脉之影響而微故曰微則爲風然氣實挾風而
熱仍露數象故曰數則爲熱微主風風則表虛自
汗故曰微則汗出內熱則外寒故曰數則惡寒其
以漸而深則自衛而榮有通及之勢當其中於衛
也先及毛皮而趨于其合則衛受之然其邪盛不
與呼吸相隨故呼則氣出而已衛有邪不與呼俱
出而此時之正氣不復能入而與邪爭逮風鬱爲
熱過於榮分則氣因吸入者邪熱與吸俱入而不

倘有表裏之
分肺癰之邪
在裏所以淺
則可汗深則
汗亦不能愈

出於是皮毛受風傷血脈受熱傷風在上則欬
口乾肺氣實則喘而且滿然上輸之水液聚而不
散故咽爲火灼而自燥胸仍貯飲而不渴乃風由
所合漸舍肺俞而欬唾振寒則肺葉間有形之凝
滯必急從瀉肺之法而下驅之乃復因循致大敗
決裂肺葉欲盡尚可爲耶故曰始萌可救膿成則
死萌者謂稊有膿而未甚也
土氣面浮腫肩息其脉浮大不治又加利尤甚
氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈

註曰此言肺癰之證元氣憊者難治有邪者尚可
治也。謂肺癰由風則風性上行必先上氣若兼面
浮腫息氣升不降也。又脉浮大元氣不復能飲
則補劑不可汗又不可况內外皆逆氣非風比可
盡汗泄乎故云不治加利則陽從上脫陰從下脫
故曰尤甚若上氣但喘而躁則喘爲風之扇躁爲
風之煩其逆上之涎沫將挾風勢而爲風水今
先泄于肌表水無風戰自然順趨而從下出故
可汗而愈

肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此爲肺中冷必眩多涎唾甘草乾薑湯以溫之若服湯已渴者屬消渴

註曰前旣云上焦有熱因欬爲肺痿故又拈出有冷一條以見肺痿中有獨異者也謂肺痿吐涎沫因欬者多乃有不欬且不渴是肺中全無熱必遺尿而小便數以上虛故小便無所節制耳豈唯無熱兼之有冷則必陰氣上竄侮其陽氣而爲眩陰氣在中凝滯津液而吐涎故以甘草乾薑溫其肺

所以黃汗中
云上焦有寒
其口多涎

使○非○下○熱○上○寒○則○得○溫○竟○止○矣○乃○反○渴○豈○非○陰○分○
結○熱○肺○寒○雖○去○下○熱○仍○在○欲○成○飲○一○漉○二○之○消○渴○
乎○故○曰○服○湯○已○渴○者○屬○消○渴○

甘草乾薑湯方

甘草

四兩

乾薑

二兩

右○改○咀○以○水○三○升○煮○取○一○升○五○合○去○滓○分○溫○再○服○
欬○而○上○氣○喉○中○水○雞○聲○射○干○麻○黃○湯○主○之○

註○曰○凡○欬○之○上○氣○者○皆○有○邪○也○其○喉○中○水○雞○聲○乃○
痰○爲○火○所○吸○不○能○下○然○火○乃○風○所○生○水○從○風○戰○而○

作聲耳。故以麻黃細辛驅其外邪爲主。以射干開
結熱氣。行水濕毒。尤善清肺氣者爲臣。而餘皆降
逆消痰宣散藥。唯五味一品。以收其既耗之氣。令
正氣自歛。邪氣自去。恐肺氣久虛。不堪劫散也。
論曰。肺痿乃因重亡津液。肺之本氣自病。熱逼而
痿。故有欬有涎沫而無上氣喘逆之證。則凡遇上
氣喘逆。及有臭痰者。爲肺癰。無臭痰。只水雞聲者。
爲火吸其痰。以此辨治。自無悞矣。然水乃潤下之
物。何以逆上作聲。余見近來拔火罐者。以火入餅。

人患處立將內寒吸起甚力始悟火性上行火聚於上氣吸於下勢不容已上氣水聲亦此理耳此非瀉肺邪何以愈之故治此病加射干爲上或自前次之澤漆次之皆能開結下水也

射干麻黃湯方

射干

十三枚
法三兩

麻黃

四兩

生薑

四兩

細辛

三兩

紫苑

三兩

款冬花

三兩

五味

半升

大棗

七枚

半夏

半升洗

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫內

諸藥煮取三升分溫三服

欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠皂夾丸主之

註曰此比水雞聲乃欬而上氣中之逆甚者也至
不得眠非唯壅且加閉矣故以皂夾一味開之合
棗膏安胃以待既開之後另酌保肺之藥也

皂夾丸方

皂夾

八兩刮去
皮用酥炙

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三丸日

三夜一服

欬而脉浮者厚朴麻黃湯主之。欬而脉沉者澤漆湯

主之。經曰欬而脉浮則表邪居多。但此非在經之表。乃邪在肺家氣分之表也。故於小青龍去桂芍草三味而加厚朴。以下氣石膏以清熱。小麥以輯心火而安胃。若欬而脉沉則裏邪居多。但此非在腹之裏。乃邪在肺家榮分之裏也。故以澤漆之下水功。類大戟者為君。且邪在榮澤漆兼能破血也。紫苑能保肺白前能開結桂枝能行陽散邪。故以為佐。

若餘藥即小柴胡去柴胡大棗和解其膈氣而已

厚朴麻黃湯方

厚朴 五兩 麻黃 四兩 石膏 如雞子大 杏仁 五十粒

半夏 半升 乾薑 二兩 細辛 二兩 小麥 一升

五味子 半升

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內諸藥

煮取三升溫服一升日三服

澤漆湯方

半夏 半升 紫參 五兩一作紫苑 澤漆 三觔以東流水五斗煮取一斗五升

生薑 五兩
白前 五兩
甘草 三兩
黃芩 三兩

人參 三兩
桂枝 三兩

右九味咬咀內澤漆汁中煮取五升溫服五合至
夜盡

大逆上氣咽喉不利止逆下氣者麥門冬湯主之

註曰此欬逆上氣中之有火邪而無風邪者故以

咽喉不利特揭言之而藥槩調補肺胃單丈一味

半夏去逆且註其功曰止逆下氣示治火逆不治

風邪也不用生薑以能宣發火氣

此方治上氣
肺非同肺
肺火結在肺
有故但補胃
肺引