

大豆田间杂草 的问题和控制



BASF

大豆田间杂草 的问题和控制



BASF

杂草是大豆田高产的一个主要妨碍。尽管作物受到小心保护，但往往一片看来完好的大豆田中，仍会蒙受高达10%的失收。

大豆田中的杂草延迟作物的成熟期和减低作物生长的高度。倒伏增加。在杂草丛生的大豆田中，多在每株作物下部15厘米左右结荚，使将来收成时蒙受损失。

杂草可成为害虫和菌类病害的宿主植物，干扰控制害虫和菌类病害的措施。总括来说，杂草导致很多难题。

这本小册子的主要目的是提供有关种植大豆的直视资料，希望能够作出帮助。

目录

杂草
杂草带来难题
无形的损失

页数
6
54
60



用化学方法控制杂草
用量
应用时间表

页数
62
63
64



正确的喷药

Bentazon除草剂对大豆田中各类不同的杂草的功



Abutilon theophrasti:
幼株



Abutilon theophrasti:
已成长



Acanthospermum hispidum:

幼株



Acanthospermum hispidum:
已成长



Amaranthus sp.



Ambrosia artemisiifolia



Ambrosia trifida:
幼株



Ambrosia trifida:
已成长



Anoda cristata



Bidens pilosa



Brassica sp.

