

疝

置按內經大奇論曰腎脉大急沉肝脉大急沉皆為
疝證心脉搏滑急為心疝肺脉沉搏為肺疝蓋疝者
寒氣結聚之所為故令臍腹絞痛者是也又巢元方
曰諸疝者陰氣積于內復為寒氣所傷榮衛不調二
氣虛弱風冷入腹而成故脉經云急者緊也緊則為
寒為實為痛血為寒泣音澁則為痼氣為寒聚則為疝
本臟氣虛外感於寒濕內傷於生冷遂使臍腹
絞刺波搏而痛無有定處倉卒之際不堪忍者謂之

疝也並宜先用五苓散沸湯調服和解輕則但以白芍藥湯烏梅散釣藤膏爲治重者金茱九散氣丸未有不愈也

仁齋癰疝者陰核氣結腫大而釣痛也多因小兒啼怒不止動陰氣故陰氣下繫結聚不散而得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣閉亦變此證惟是陰氣不得流行加以風冷入焉白水聚焉故水氣上乘於肺先喘急而後疝痛其狀有如李者亦有稀軟者亦有并腎腫大者亦有大硬者臍下痛楚皆不能忍用藥行心氣逐腎邪利其大小二便更

補法

薛小兒陰腫疝氣者多屬肝腎氣虛及坐

道不行或稟父肝經虛熱或妊娠肝氣鬱結或乳母
怒動肝火而致者若兒肝經熱用梔子清肝散兒啼
躁怒用勻氣散乳母恚怒用柴胡清肝散肝火氣逆
用加味道遙散小腹作痛小便澀滯用龍膽瀉肝湯
久坐冷地小便不利用四苓散加柴胡山梔車前子
不時寒熱者加味小柴胡湯經云肝氣熱則莖痿宗
筋弛縱腎莖腫脹或出白液痒痛或裏急筋縮挺縱
不收或精隨便下者此名筋疝俱屬肝火不係於腎
宜詳治之

茱萸內消丸 治小兒陰癰偏大上攻臍腹疔痛膚

囊腫脹或生瘡瘍時出黃水

川楝子

炒壹兩半

大腹皮

五味子

海藻

洗

玄胡索

各壹兩貳錢半

桔梗

青皮

山茱萸

去核各壹兩

木香

米錢半

懷香

炒

桂心

川烏頭

炮去皮臍

吳茱萸

桃仁

麝炒另升

食茱萸

各伍錢

右爲細末酒糊爲丸如麻子大每服叁拾丸空心

溫酒送下

當歸散

治小兒癰疽

牽牛微炒取仁

辣桂各半兩

當歸

大黃各貳錢半

全蝎壹錢半

桃仁湯泡去皮尖貳錢半

右剉碎每服三錢水一鍾入蜜半匙煎至五分食

前服以利為度

川楝丸 治小兒癩疳小腹痛引腰脊攣曲身不能

直

木香

檳榔

三稜

蓬莪茂炮

青皮去白

陳皮去白

川楝肉

芫花米醋浸炒各半兩

辣桂

牽牛生取仁各叁錢

巴豆不去油壹錢

右爲細末飛麴糊爲丸如麻子大每服參丸空心

用生薑湯送下

五苓散 方見驚搐

曾白芍藥湯 治冷疝腹痛及誤汗誤下卽壞證傷

寒是也並宜先服次投對證之劑

白芍藥 壹兩半

澤瀉 去粗皮 柒錢半

甘艸 貳錢 炙

薄桂 去粗皮 壹錢半

右件咬咀每服貳錢水壹盞煎柒分空心溫服誤

汗誤下加人參南木香各貳錢臍下痛入生薑及

鹽煎或加釣藤亦好

烏梅散 治腹疼及初生嬰孩臍下冷痛疝氣等症

烏梅 去核

玄胡索

粉草 半生半炙 各伍錢

乳香

沒藥

釣藤 各貳錢半

右件咬咀每服貳錢水壹盞煎米分空心溫服

金鈴散 治疝氣腹痛投諸藥後瘡而復作宜服

金鈴子肉 陸錢

三稜 炮剉

莪茂 醋煮剉

青皮 去白

陳皮 去白各 貳錢半

赤茯苓 去皮

懷香 各半兩

南木香 貳錢

甘草 炙肆錢

檳榔

枳殼 去瓢麩 炒黃

釣藤 和鈎 各叁錢

右除檳榔木香不過火餘剉焙仍同檳榔木香為

末每服半錢至壹錢仍用炒懷香煎無灰酒空心調服不飲酒者煎炒懷香湯調下

釣藤膏

方見夜啼

金茱丸 治冷疝氣痛及膚囊浮腫

金鈴子肉

壹兩

家園茱萸

半兩

右研末酒煮麵糊丸麻仁大每服三十丸至五十丸空心溫鹽湯下溫酒亦可見小者丸粟粒大丸數下法同前

散氣丸

理諸疝氣小便利或不通臍下作痛不可

忍者

海藻

湯浸洗去鹹乾

澤瀉

去金龜皮

懷香

車前子

焙

蘿蔔子

瓦上慢火乾焙

川棟肉

用蟹螯玖枚去

翅足同炒少時去蟹螯

大腹皮

淨洗洗焙乾各去豆兩

右剉焙為末酒煮麵糊丸葉豆大每服叁拾丸至五拾丸南木香煎酒空心下或防風牡丹皮煎酒下不能飲者於木香湯防風丹皮湯中各少入酒並空心投亦可再用鹽炒懷香煎湯尤妙

湯治小腸疝氣家傳妙方

芫花

醋浸炒

木香

檳榔

三稜

各半兩

茯苓

青皮

全蝎

桂枝

附子

硃砂

各貳錢半

右爲末將硃砂浸澄去土頓在湯瓶上候成膏子和糖醋打麵糊爲丸如豆大每服叁拾丸空心溫酒下未効再服

勻氣散

主調補通利後及冷疝腹痛氣滯不和

桔梗

貳兩剉炒

陳皮

去白壹兩

縮砂仁

懷香

各半兩

白薑

貳錢半

粉草

肆錢

右剉焙爲末每服半錢或壹錢空心沸湯調服冷
心復痛燒鹽湯調下

木香飲 治小兒小腸氣痛

川棟肉

拾齒用巴豆柴粒同炒令黃
色去巴豆不用入懷香半兩

玄胡索

半兩

南木香

貳錢

史君子

去殼枚

右為極細末用米飲食前調服

梔子清肝散

柴胡清肝散

二方並見發熱

龍膽瀉肝湯

治肝經濕熱不利下部生瘡兩拘腫

痛或腹中作痛小便澁滯等證

龍膽草

酒拌炒黃

澤瀉

車前子

炒

木通

生地黃

酒拌

當歸

酒拌

山梔

黃芩

炒

甘艸

各參分

右水煎食前服

四苓散卽五苓去桂

小柴胡湯

方見發熱

陰腫

全嬰方云小兒陰腫核腫者由兒啼怒氣逆不順乘虛而行陰核偏大又因甘肥不節生冷過度致生疳氣氣結不行流入陰中或傷暑毒或觸風邪使血氣與邪氣相搏停結不散則成陰腫也 仁齋云若腎經氣虛或坐石不起冷氣凝之或近地經久風邪濕氣傷之不爲陰腫幾希矣間有啼叫怒氣閉繫於下結聚不散加以水竇不行亦能發爲此疾治用桃仁丸主之丹溪謂脫囊腫大墜下不收用紫蘇莖葉爲

末水調荷葉包之一人傳此方用野白紫蘇爲末濕
則摻之乾則香油調傳雖皮潰子墜皆有神効此用
紫蘇蓋亦同功也

曾巢元方論曰諸筋會于陰器

邪客於厥陰少陰之經與冷氣相搏則陰囊腫痛而
引縮經中雖分四證曰腸癰氣癰水癰卵癰然小兒
患此若治之不早則成痼疾如腰曲腹痛冷汗自出
而陰囊二子弔縮入腹痛止方出名爲內弔用烏梅
散勻氣散金茱丸金鈴散爲治

有陰莖全縮不見

有陰囊光腫不痛此因肝腎氣虛宜以橘子仁煎湯
調下金鈴散勻氣散皆可投之內經曰癰腫疔瘡脹

者陰亦盛而脉脹不通故曰癰癰由是觀之乃陰
氣盛而致有此弔縮者筋急也筋遇寒則引縮遇熱
則弛張故三因所用方法以寬小腸氣踈風爲治然
小兒此證多因坐陰潤之地感風濕而得用當歸散
加檳榔蒼朮水薑煎服并青木香湯釣藤膏外以立
消散傳之 有外腎無故而膚囊腫大不燥不痛光
亮如吹此名氣虛所致以勻氣散調治三因方家非
子丸主之 一證外腎膚囊赤腫通明及女兒陰戶
腫脹乃心熱之所傳皆以木通散導赤散爲治或用
薏苡仁煎湯調五苓散及以外消散傳之併投天花

散用無灰酒煎下不能飲者水煎少入酒同服亦好
張渙曰小兒足少陰之經虛而受風邪者衝於下經
則成陰腫病桃仁丹主之

桃仁丹

桃仁

柴錢半湯浸去皮尖
雙仁者麝炒微黃

牡丹皮

白蒺藜

微炒
去刺

桂心

各半
兩

郁李仁

貳錢半
湯浸去

皮微
炒

右件藥搗羅爲細末煉蜜和黍米大每服拾粒
溫酒下乳食前量兒大小加減亦可水煎服

胡連散

治陰腫生瘡

胡黃連 去鬚

胡粉 各半

白礬 錢半

右搗羅為細末每用少許以生油調塗患處

湯小兒陰腫由啼叫怒氣閉縱於下成此疾宜

海蛤散

海蛤 叁錢

懷香 炒米

薏苡仁

白朮

檳榔 各半

右為末食錢溫酒調下大小加減

桃仁丸

桃仁 去皮尖麝

桂枝 去皮

牽牛 炒頭末

蒺藜

牡丹皮 各貳錢