

異功散 治痘瘡已出之間不光澤不起發根裏
不紅謂之表虛

木香

當歸

各叁錢

桂枝

白朮

茯苓

各貳錢

陳皮

去白

厚朴

薑製

人參

去蘆

肉苳蔻

各貳錢半

丁香

半夏

薑製

附子

炮去皮各壹錢半

右咬咀每服二錢水一盞薑五片棗三枚煎服

右治虛寒

虛而不寒者宜用前方血氣俱虛之劑不宜用此必脉虛細四肢身體冷者方

可用之

十補散

滋養氣血調

脾胃能使瘡毒速出有寒

證者用之加紫草木香糯米名參耆內托散

黃耆

人參

當歸

各貳錢

厚朴

桔梗

川芎

防風

白芷

甘草

各壹錢

桂心

叁分

每服四錢水煎服或為末溫水調下一錢五分

虛熱例藍根散

治瘡疹出不快及倒靨一名二聖

散救小兒垂死

板藍根

壹兩

甘草

炙柒錢半

右末每服半錢取雄雞冠血三兩點同溫酒少許

食後調下無時甚則三五服立効

丹溪云藍能分散敗血

絲瓜散發瘡疹最妙絲瓜連皮燒灰存性百沸湯調下或以紫草甘草煎湯調服尤佳米湯亦可

蘿蔔湯

見前

煩不得眠例痘疹煩不得眠者甘桔加梔子湯

桔梗

甘草

梔子

右各等分煎服

治痘出不快煩躁不得眠者水解散麻黃黃芩湯

升麻黃芩湯主之

海藏云莫若定其氣血用石膏梔子之類尤佳麻黃黃芩湯升麻黃

芩湯亦當求責的是太陽陽明方可用之

水解散 治天行頭疼壯熱一二日兼治痲瘡未出

煩躁或出尚身體發熱者

麻黃

去節 肆兩

大黃

黃芩

桂心

甘草

炙

芍藥

各貳兩

右爲麤末患者以生熟湯浴訖以煖水調下二錢
相次二服得汗利便瘥強人服二方寸匕風實之
人三伏中亦宜用之若去大黃春夏通用

升麻黃芩湯治痘瘡出不快煩躁不得眠 麻黃黃

芩湯治痘瘡出不快益煩躁昏瞶或出尚身疼熱者

一方見小

胡荽酒

胡荽一味細切肆兩以好酒二盞煎一二

沸入胡荽再煎少時用物合定放溫每吸一大口
微噴從頂至足勻遍勿_口貝頭面病人左右常令有

胡荽氣卽能辟去污氣疹疹出快

指南有禁瘡之說云痘毒奔瀆由氣血虛弱不能拘
領其毒以致毒盛而聚於腠虛之處故痘之初出也
或一點二點見於隱僻腠節之處及方廣四肢之間
此痘一出則諸痘不得宣發成漿矣故曰禁瘡其禁
有五一日胃禁二曰火禁三曰水禁四曰風禁五曰
寒禁胃禁者毒火炙胃不能發散於肌表脾胃潰

爛其外證之痘出於唇口之間者或二三四五點相連諸痘未漿此痘已先黃熟知由熱毒內攻胃已腐爛故諸痘不得成漿也如唇口一見此痘當察其面色煩紅氣麤熱甚口臭異常者是其驗也 火禁者小兒初發之際或因身發寒熱而誤以火薰炙其衣被或睡卧於火箱之中使皮膚乾燥故痘毒發泄不出又兼氣虛而不能拘其毒則毒停皮膚之內隱隱不能發出肌表也細看皮內覺有紅點無頭無脚或於四肢頭面方廣之處見一二點痘子則諸痘皆從此痘上發洩爲孽而皮內隱隱不出之痘終不能快

出名爲火禁以水楊加荆芥煎湯浴之則諸痘自發
矣輕則升麻和解散主之水禁者初發熱之際陰
陽未分毒氣方熾或悞食生冷則毒停於皮肉之間
隱隱有紅點或於方廣兩脇手足頭面之際發有水
泡者是也蓋冷氣在內則腹疼肚脹在外則發熱惡
寒此其驗也以丁桂茯苓升麻大腹之類逐之冷食
遺積脾胃須防下泄再加山查風禁者發熱之初
失於不避風則風入肌表痘不能發或肌膚麻木不
知痛癢或不麻木而乾燥或毛直而乾焦或皮癢欲
搔或重則狂煩譫語此風與火搏故也治法以升麻

湯加羌活荆芥以逐之甚則蒺藜蟬退以攻也寒
禁者發熱之初悞經冷水沐浴或睡卧於鐵漆寒冷
之處或衣被單薄感冒寒氣則痘必不能宣露有手
足麻木不知痛癢有四肢冷痛不能舉動者有麻木
冷痛之處不出痘子惟於委曲避風之處或頭面髮
際之上痘出如癰疹者是其驗也內以丁桂川芎升
麻逐之外用綿衣以溫之曾見小兒年十一二歲發
熱之初卧新漆床上初因熱極父母不防出痘任小
兒手貼漆床而卧致令寒氣侵入手臂其餘四肢面
腹方廣之處俱出有痘惟一臂麻木不仁無一點痘

見諸醫視之並不知其故請予至詳察其由乃以前
方治之後見一臂痘發出比他處尤爲稠密臂痘一
出諸痘俱起九日而平復如故

痘疹部分

經曰諸痛癢瘡皆屬心火心之華在面痘

瘡之火其出先在於面但觀其出之部位可以知其
侯之凶吉如先在唇四畔出者或兩頤出者吉蓋太
陽之邪下傳陽明陽明者胃與大腸積陳受朽氣血
俱多又口爲水星頤屬腎水火爲水制不能作虐
也如在額角眉心先出者凶蓋太陽足壬膀胱水手
丙小腸火丙火獨旺不受壬水之制其毒併於膀胱

之經而先自病膀胱多氣少血又正額屬心火火不
務德妄行無忌心爲君主之官主危則十二官皆危
矣凡起發成漿結痂亦如此論 經曰頭者精明之
府又曰春氣者病在頭可見頭乃人真元會聚之所
爲發生之本又面列五官分五行而五藏之華皆見
於面是頭面者人君之象至貴至尊不可凌犯者也
咽者胃脘水穀之道路也主內而不出喉者肺脘呼
吸之往來也主出而不內在人之身譬猶關津要路
也瘡痘之出最要頭面稀少頸項無方是吉兆若頭
面多者謂之蒙頭諸陽獨亢五官俱廢神明失守精

華自萎經云神去則機息氣止則化絕者此也頸項
多者謂之鎖項內者難出外者難入上者不升下者
不降經云一息不運則機絨窮一毫不續則霄壤判
者此也故皆不治 陳氏文中曰痘瘡輕者作三四
次出頭面稀少胸前無蓋頭面者諸陽之會胸者諸
陽之所受氣此數處痘子宜少不宜多以清陽之分
不可濁亂也手足雖諸陽之本乃身所役使卒伍卑
賤之職非若頭面爲元首也又居四末非若胸膈心
肺之居神明之舍也故雖稠密不必憂也若頭面胸
項手足稠密瑣細一樣者却愁氣血衰微脾胃虛弱

不能周流灌注起發不透收靨太遲而生他變矣

凡痘子初出便自手足先出者他處未起而手足先

起他處未收而手足先收者此陽火大旺宜用解毒

抑陽扶陰之劑四物湯失血合黃連解毒湯煩躁主

之如他處俱起而手足起遲他處俱收而手足不收

者此脾胃虛弱不能行其氣血達於手足宜補脾胃

十全大補湯汗桂枝芍藥湯腹痛主之一出紅點

數粒發於山根之上爲毒盛氣虛而毒乘虛犯上或

發三五粒一塊者皆不吉之兆也宜急用涼血解毒

以防危急若腮頤地閣之間疎疎發見淡血潤色三

次出者乃吉證也

凡痘瘡

之出不論疎密而論磊落若磊磊

落落如珠如豆顆粒分明尖圓緊實雖密無妨此謂
出盡無留毒也如黏聚成叢模糊作塊不分顆粒恰
如紅瘤雖只一二處未可言疎此謂之伏出未能盡
若待後者再出則先者或陷而復隱或癢而俱潰成
壞瘡矣此猶淹延引日久而後斃若如蠶之殼如蛇
之皮此氣至而血不榮也謂之乾枯如蚤之咬如蚊
之嘍此血至而氣不充也謂之陷伏不能引日奄忽
而死矣 痘瘡初出與未病時皮色一般者善若瘡

太赤根下皮色通紅此血熱氣不管束也後必起發

太驟皮嫩易破癢塌而不可救宜急解血分之熱四

物湯失血加升麻地骨皮紅花紫草或消毒飲活血

散起發合而飲之待色少淡急補氣分之不足四君

子湯不能食加黃耆防風木香或調元湯大法參苓白

朮散痘渴合而飲之仍用血氣二方相間而服若成

漿不破損者吉服藥不効反增瘙癢者命也 痘瘡

初出有四善紅活明潤緊實堅厚尖圓布散磊落稀

疎蓋頭子賴血以潤之血活則其色如丹砂如雞冠

若毒凝血聚則遂成黑色今頭焦黑者乃榮血不能

流行內外毒氣壅遏此證甚危其人必大小便秘喘

急煩躁宜用七物升麻丸

初熱

當歸丸

便秘

通關散

便秘

三乙承氣湯

便秘

看輕重緊慢用之以解裏之

急得利後以紫草飲加味四聖散調無價散以解表

之毒仍用臙脂塗法瘡變紅活以漸起發者吉若更

乾黑者凶莊氏云斑瘡倒靨而黑色者謂之鬼瘡

痘子賴氣以束之脾胃強氣實則肌肉厚皮膚堅今

痘皮嫩薄溶溶如淫濕之狀乃脾胃氣虛其人必少

食或自利宜用十全大補湯

自汗

去生地黃加防風

白芷外用天水散

即六一散見初熱

蜜水調拂瘡上以解表

之濕熱瘡若起發成漿者吉漸變癢塌者凶聞人氏
云瘡痘作癢深爲可慮能調和愛護勿令有此乃爲
上策 痘出如灰色白者氣虛也候齊後以保元加
木通川芎肉桂最穩用木通者取通心氣也 出不
紅活淡色者血虛也保元湯中加酒製當歸酒炒赤
芍藥及川芎血熱者仍加生地黃薑汁拌曬倍黃耆 痘
出皮膚乾燥枯澀者必難起脹用溪中白石洗淨燒
紅以井花水漬之使濕氣蒸於痘上頃間光澤甚易
起又能辟穢 一出與地皮相似無骨起之意乃是
紅斑急宜涼血解毒宜羌活散加酒炒芍藥紫草紅

花蟬退木通糯米連進數服或以六一散保嬰丹紫
草膏隨意用之亦可癰退以保元加木香豆蔻煎服
以解紫草之寒防其泄瀉若夾疹同此如治稍遲則
變成黑癰實難救矣大抵下紫草必下糯米五十粒
則不損胃氣無泄瀉之患惟大熱大便秘者不下糯
米以糯米黏膩故也

餘詳夾癰
火疹條

一出真紅焮赤摸

過皮軟不礙手者此係賊痘過三日變成水泡甚至
紫泡黑泡此危證也急少加保元大加紫草蟬退紅
花解之或煎燈草木通湯調六一散利去心熱而紅
紫自退如已成水泡則保元中大下四苓利之此于