



一方用大黃酒浸九蒸九晒爲末水丸如菜豆大每
一服百丸食後臨臥清茶送下神效

一方用半夏白茯苓川芎甘草羌活白芷枳實
防風細辛酒黃芩氣虛加參朮血虛加芎歸熱加
黃連各等分薑三片水煎服以此作丸每日下三
一三錢極效

心痛症一

歌心痛當分久與新暴嬰寒氣必須溫若還稍久多
成鬱鬱積因而作熱蒸大實痛時難以按按之痛
定作虛論蚘蟲痛止偏能食脉澀須知死血因真
痛在心無藥療厥疼胃脘正當心

論夫心痛者有真有厥真者邪中心君手足青至節
卽死非藥可療厥者邪客于心胞絡胃皖之間當
心之分非真心受症故可治也又有寒厥熱厥之
分大寔大虛之別古人又有九種之名曰飲曰食
曰風曰冷曰熱曰悸曰蟲曰疰曰去來痛若此者
皆可究其因而施治也其如陳無擇云有五臟及
諸經諸府心痛雖言之詳而無治例反使後學有
惑于心故不具載蓋亦不過寒熱表裏虛寔之候
也丹溪云心脾痛須分新久若明知身受寒氣口
食寒物於初病之時當以溫散溫利之劑若得稍
久而成鬱鬱則蒸熱熱久必生火若欲行溫劑寧

無助火添病乎故古方多以山梔爲熱藥嚮導則
邪易伏病易退又審平昔喜食熱物以致死血留
于胃脘或因痰氣食積鬱滯于胃作痛者如此等
例皆前人之所未發後學當遵而行之斯活法也
○謹按世人患真心痛者極少真心痛者平素原有
痰卒然大痛如割入于無聲汗出不休舌強無言
手足厥冷此疾一作死在旦夕鍼灸之所不施藥
力之所未及患之者十無一生蓋寒邪直中心經
君火不能抗敵故也今之患心痛者乃胃脘與心
胞絡痛耳若痛極如咬時吐清水面清白少光彩
者爲蟲頭上攻痛時如有物嚙碍壘壘不得下爲

胃脘停食痛時嘈難不寧如飢如飽快快欲吐吐
卽稍寬爲痰飲停積痛時隱隱悶結胸臆相引得
噯覺寬爲憂鬱所致痛時欲近煖處飲熱酒卽解
爲寒客心胞絡痛時自上而下自聞唧唧有聲搔
消爲火所載不可認以爲蟲而投以蟲劑也
脉心痛微急痛甚伏入陽微陰弦或短又數緊寔便
難滑寔痰積心痛引背脉微而大寸沉而遲關緊
抓無措眠坐不穩心下如刮上連胸臆乃積血不
數銳

虛痛

虛弱人心痛錢氏云心虛痛者炒鹽補之以物按

之其痛止者挾虛也二陳湯加炮薑末和之

方見
疾症

若久病元氣虛弱肢體怯薄脉虛手欲按者六君

子湯加砂仁香附

方見
脾胃

寔痛

因氣怒而飲食卒痛便門心胸高起手不可按者

大寔痛也煮黃丸後服藁本湯去其餘邪胃脘溼

熱痛小胃丹

方見
痰症

煮黃丸

治大寔
心痛

雄黃

一兩
研

巴豆

五錢去
皮細研 入白麪二兩

研勻水丸梧子大每用水下數丸如得利不可再

服宜服藁本湯以去餘邪

藁本湯

治心
痛後脹

藁木

半兩

蒼朮

一兩米
泔浸炒

作一貼煎服

熱厥心痛

熱厥心痛者其人必縱酒蓄熱在胃隅遇寒鬱而發故身熱足冷痛甚則煩躁而吐額上有汗脉洪大富炙大谿崑崙表裏俱瀉之內服金鈴子散痛止服枳朮丸以去餘邪方見脾胃初痛以鹽湯探吐得吐就發散心脾痛日久則非寒也縱有寒亦鬱而爲熱二陳湯加山梔炒黑川芎香附痛甚者加炮薑反佐之方見痰症或以山梔一味入姜汁煎服大便不通大承氣大陷胸之類下之方俱見傷食

金鈴子散

金鈴子

雨一

玄胡索

雨一

末二錢溫酒下

寒厥心痛

寒厥心痛者手足厥逆徧身冷汗甚則手足中青
黑下便清白不渴氣微力薄脉沉細微尤附湯大
寒厥暴痛非久痛者若久則非寒也丹溪云明知
身受寒氣口食寒物初病當以溫散溫利之藥
木附湯治寒厥心痛白木二炒甘草一炒黑附子炮


豆寇丸大便閼結不通者元戎厚朴丸
右三味剉作一貼薑三片棗二枚水二鍾煎溫服

草豆蔻丸寒厥心痛草豆蔻一不五分益智仁八分

陳皮八分人參去苦黃芪蜜炙吳茱萸洗去苦

殭蚕八分當歸酒洗青皮六分神麋炒

薑黃四分柴胡四分半夏姜製澤瀉去毛



桃仁

七個泡去皮尖

麥芽

炒一錢

甘草

生三分炙三分

右為細末湯浸蒸餅丸如梧桐子大每三十丸

元戎厚朴丸

厚朴

三兩姜炒

黃連

二兩半炒

吳茱萸

湯泡七次

乾薑

二兩

巴豆

一兩另研

人參

一兩去芦

川烏

炮一兩

末之入豆霜勻蜜和丸桐子大每三丸以利為度

痰積食積心痛

痰飲積滯干胃脘當心而痛墻上陳螺螄殼煨存

性炒蒼朮海石山梔香附南星各二兩枳殼青皮

木香半夏砂仁各半兩糊丸薑湯送下食積保

和丸

方見傷食

血痛

平昔喜食熱物致

留于胃口作痛者脉沉而

芤澀

在上者四物湯加桃仁紅花丹皮枳殼玄胡

索

方見血症

輕者韭汁桔梗開之重者桃仁承氣湯下

之

方見血症

蟲痛疰痛

虬蟲攻入心膈作痛者痛定便能食面上有白斑唇紅治以苦練錫灰或烏梅丸或集效丸虬蟲攻噉心痛惡心而吐川椒湯下烏梅丸疰心痛者十疰病皆心痛化蟲丸辣蓼草煎湯飲之

烏梅丸

治虬蟲上攻痛

烏梅

七十

細辛

一兩

附子

炮一兩

錢一兩

人參

一兩

黃柏

一兩

桂枝

一兩

乾薑

一兩

錢一兩

錢一兩

錢一兩

黃連

四兩

川椒

五錢

當歸

五錢

末之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸爛搗成膏少加

蜜和丸如梧桐子大每十丸加至二十丸食前服

集効丸

治蛇厥心痛

木香

二錢五分

鶴虱

炒二錢

乾薑

炮二錢

五分

訶子

二錢五分

燕蕒

炒二錢

附子

炮二錢

玄檳

二錢

五分

大黃

一兩半

烏梅肉

二兩

搗爛

湯送下

末之蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心時陳皮

湯送下

化蟲丸

服之蟲化房水

胡粉

炒五錢

鶴虱

三錢

白礬

五錢

檳榔

玉不

苦練根

五錢

右爲細末糊丸梧子大每服五十丸溫漿水入之



蒜油一二點打勻下之米飲亦可不拘時候其
小者化爲水大者自下

腹痛症五

歌寒痛綿綿無減增時疼時止熟爲根血瘀痛處無
移動食積便通便見輕寔者不能將手近痛時能
按作虛論溼痰痛者洩便祕體認其形見病情

論夫寒痛者當痛而無增減也成無已云陰寒爲邪
則腹痛而吐利熱痛者時作時止原病式云熱鬱
于內而腹滿堅結痛勿以爲寒死血痛者每痛不
移其處成無已云邪氣聚于下焦津液不得通氣
血不得行或溺或血惡滯于下是生服鞭小便不

利也食積痛者利後卽痛減溼痰痛者凡痛大小
便俱不利丹溪云清痰多作腹痛脉滑痰因氣滯
而聚凝其道路不得通故也腸癰痛者身甲錯小
便如淋腹皮急按之濡如腫狀脉芤數也積聚腹
痛者腹中原有積左右上下當積而痛也寒痛人
腹痛者少腹痛引臑九陰毒痛者四肢厥逆痛甚
咽喉不利或心下脹滿結燥虛汗狂言面色俱青
陰積于下陽消于上寔痛者腹堅不可虛痛者
雖痛不脹滿手可按若此霄壤不侔可一藥而盡
之乎

○謹按腹痛爲脾家受病蓋脾或受有形而痛者或

受無形而痛者若暴傷飲食則胃脘先痛而後入
腹暴觸怒氣則兩脇先痛而後入腹血積上焦
火薰蒸則痛從腹而上于胸臆血積下部屬
行則痛從頭而入于少腹傷于寒者寒必痛得熱
則緩傷于飢者飢即痛得食即止吞酸腹痛爲疾
鬱中焦復傷飲食面黃腹痛爲宿食不消虵蟲攻
咬氣虛腹痛必虛豁呼吸短淺血虛腹痛者痛
如芒刺牽引不寧醫者當審其因以處治大要以
甘溫爲上惟傷酒作痛者方可涼劑而必佐之以
甘溫也

脉沉弦細動皆是痛症心痛在寸腹痛在關下部在

尺脉象顯然

熱痛

胸中有熱胃中有邪腹痛欲嘔黃連湯腹痛脉洪
熱也黃芩芍藥湯寒邪變熱傳裏腹痛便秘而厥
四逆散腹滿時痛桂枝加大黃湯腹痛便秘脉塞
大者大承氣湯方見傷食

黃連湯

治熱邪腹滿

黃連

三錢

甘草

三錢

乾薑

三錢

桂枝

人參

半夏

薑製

每七錢棗煎服

黃芩芍藥湯

黃芩

二錢

芍藥

二錢

甘草

一錢

煎服

四逆散

陽邪傳裏腹滿

甘草

二錢

枳殼

炒一兩

芍藥

炒一兩

柴胡

一兩

末之每服二錢

白湯調下

桂枝加大黃湯

治太陰腹滿時痛

桂枝

一錢

芍藥

炒一錢

甘草

一錢

大黃

二錢

薑棗煎入湯

一合

微烱

寒痛

傷寒下同腹痛四逆湯

方見中寒

腹痛厥冷欲死者

急

憲散

治中寒腹痛

下利四肢沉重

真武湯

或理中湯

方見中寒

辟憲散

治中寒腹痛

附子

一枚

入真臘茶

一大盞

同研勻

更分二劑

水二鍾

煎入分入熟白蜜

一匙

涼服

真武湯

治少陰腹痛

茯苓

一錢五分

芍藥

炒一錢半

生薑

七片

附子

炮一錢

水二大盞

煎至一盞

冷服

痰痛食積痛

清痰多作腹痛台芎蒼朮木香白芷香附末之薑

中國醫藥大學圖書館版權所有

湯調服肥人腹痛乃氣虛溼痰也二朮半夏陳皮
芍藥之類飲食過傷腹痛保和丸木香枳榔丸
俱見傷飢虛人飲食傷腹時痛六君子湯加麴蘖方見

虛痛

素弱人全不思食腹冷痛養胃湯加肉桂茱萸木
香或小建中湯方俱見或理中湯方見腹痛欲以

手按按之痛止者屬虛參朮薑桂之類血虛腹痛
須用白芍藥之酸補以和之或四物湯加焦炒乾

薑炒芍藥倍用

方見血症

寔痛

凡痛脹滿不可按大寔也大承氣湯方見初得