

治溫提要續刻



關中曹華峯手著
吳興臧吟蕉增訂

溫病學

板存京都呂祖閣

琉璃廠
英華齋



北京中醫藥大學圖書館版權所有

自內經傷寒標題溫病名目不詳其治而千百年來
治溫遂無定法金河間劉氏主火立論已窺大旨防
風通聖散則溫燥並用未免駁雜不純至有明

國朝方喻柯陳諸子各有發明終未能豁然一貫也
葉氏吳氏先後論定溫病治法始如禪月印證澈底
空明顧葉氏之法散見各案殊難會通吳氏條辨一
書始刻於江南再刻於渝城吾陝傳本絕少鮮得讀
者故邇歲以傷寒法治溫病之弊未除也余薄遊成

都讀張子培溫病三字經心善之而病其未備乃取
葉吳兩家法與方擴而充之衍爲四言以便與吾鄉
之治溫者商之聊以救世耳敢著述云乎哉

光緒四年歲在戊寅九月下浣渭南曹文遠撰

病以溫稱。顧名思義。

雖分春溫、風溫、疫毒，而統名曰溫，則與寒傷太陽之證不同，安得以傷寒法治之哉？

熱邪傷陰，與寒迴異。

溫者熱也，熱邪傷陰，曰燥，曰甚，故治溫以救陰為主，而救陰以存津液為先。

初起口渴，不寒而熱。

太陽病發熱而渴，不惡寒者，名曰溫病。仲師言也。故此證以口渴為的，以發熱為準，再驗舌察脈，無所惑矣。

右寸脈大，識病要訣。

傷寒初起，多左手脈大。溫病多右手脈大，且多兩寸脈大，而右寸尤甚。蓋溫邪從口鼻入，在手太陰肺故也。

麻杏甘石湯
內麻黃尚須
審慎蓋春令
發泄非冬令
收藏可比宜
以薄荷易之
至於病尙惡
寒石膏亦嫌
太驟

春溫風溫微兼表證。

初起惡寒。主以麻杏。

稍事遲延。熱甚寒止。

風化已盡。表藥禁矣。

春去寒水未遠。風兼寒氣而來。故三
證初起。多兼惡寒。然總以口渴為別。
麻杏甘石湯清內解外。一劑而表裡
全清。故為神方。若桂枝湯參蘇飲等
方。辛溫之藥。表解而溫愈盛。遂至大
渴太熱。貽害無窮。

二三日間。風盡化熱。無太陽惡寒證。
而純是口渴發熱。則麻黃當禁。羌獨
防芷尤禁矣。蓋表不惡寒。熱全在裡。
妄用辛溫發表。徒傷津液。是為熱邪。
樹幟也。世之易用表藥者。當知所慎。
而治裡之法。可以隅反。

加麻黃不如
加薄荷

桑菊銀翹輕重酌宜。

輕劑桑菊飲重劑銀翹散溫病初起
口渴發熱不惡寒者酌量用之

辛涼之法內外兼施。

二方為辛涼之劑清內解外表裡兼
行溫病正方也

大渴引飲津液急存。

至三四日熱傷津液大渴大熱思飲
冷水內熱盛真陰耗矣

承氣撤熱白虎救焚。

承氣湯下其熱以存未亡之陰急法
也白虎湯滋其燥以回未亡之陰緩
法也擇而用之

三四日後白
虎最宜承氣
尚應慎用

溫熱經緯云
有溫症反喜
熱飲者乃胃
有水飲也不
可不知

經緯云牛黃
丸最寒紫雪
次之至寶丹
又次之大率

舌黑枯裂。熱湯反喜。

舌枯黑而裂且喜飲滾湯甚至口盛
破而不知乃陽極似陰危症也勿作
寒證看

急下存陰。稍遲則死。

急用大承氣加石膏下之以救一線
未亡之陰延至陰盡不可治矣

邪入包絡。譫語昏狂。

譫語神昏發狂乃邪在包絡不在腸
胃下之無益

紫雪清宮。至寶牛黃。

惟有芳香解穢甘寒清熱兩法四方
擇宜用之而重症非至寶丹不可藥
不易得須備於平時

熱未極而體

素虛者宜至

寶丹

兩方合用師

其意焉可矣

不可拘執宜

增減

正虛邪實下之不應。

津液枯竭雖下不通大用攻伐。正氣反傷病勢至此頗為棘手。

增液承氣水活舟動。

增液承氣兩方合用一滋陰一瀉邪其法至妥。

病久純虛滋潤甘寒。

純屬正虛專以復津液為治。蓋傷寒病陽以甘溫復之。溫病傷陰以甘寒復之。乃兩證之鑒別也。

復脈諸法總使陰還。

復脈去薑桂湯竹葉石膏去粳米湯等方皆復津液之藥其大要以復陰為主。



芩葛湯內有
升麻久病而
虛者宜之若
初起壯實禍
不旋踵
硝黃用至廿
餘日地黃石
膏用至半年
此中用藥必
未合法合法
斷不至此
濕溫暑溫亦

先利後利大分虛實。

葛芩升泄龍牡鎮瀉。

病變紛紜法不出此。

欲窮其方近求吳氏。

初病協熱下利口渴身熱舌黃醫痞
脈數邪盛也病久下利氣弱脈數而
軟正虛也。

葛芩桔梗豆黃卷升泄熱邪法龍牡
鎮瀉法宜分別明了方不致誤。

溫病傳變極多有硝黃用至廿餘日
而病猶在者有地黃石膏用至半年
而熱未清者然總以清熱救陰爲主
至三焦雜證分類立法古人各有發
明不如吳鞠通之詳也雖其書分濕
溫暑溫名目駁雜在人善讀耳。

在溫熱之列

非駿雜也正

宜細心剖別

耳

轉筋吐瀉有

寒有熱不可

概以治溫之

法治之

達原飲消導

苦寒並用必

有積食者宜

至於溫疫時氣天行。

山川瘴疹水旱刀兵。

大頭疔瘡轉筋吐瀉。

升降達原效如奔馬。

疫兼毒氣中人最速其證大寒大熱或大熱無寒大渴飲冷舌胎白厚遲轉黃轉黑面如油垢脈洪數有力穢濁之氣久蘊成疫排門挨戶若役使然乃兵荒後常有之災與風濕春溫大不相同

名目病狀雖多總不出一毒字然別有長夏熱極吐瀉頃刻而死者傳染亦眾但不口渴發熱乃陰陽離訣證以此大反升降散急症用之達原飲緩症用之二方專為疫毒立法在用當其宜耳前賢駁之殊非通論

之

溫病以辨舌
胎為要務

葉天士論舌

最詳

麥之溫病忌用溫藥

桂枝一法前賢且駁

舌胎細辨熱渴肇端

救陰為主始終用寒

尤氏云溫病伏寒變熱少陰之精已被劫奪雖有新舊合邪不得更用桂枝湯以絕化源葉氏云風溫病外雖似戰慄其溫邪內鬱必從熱化諸賢所爭皆慮助熱傷陰耳觀此而尤附辛麻之為害更可知矣

絳胎白胎黃胎黑胎鏡面胎總以枯燥為別而口渴身熱則溫病之大關目也識病之始以此為斷庶不混淆脈始半表半裡不在太陽中沉細而數熱傷陰後喜弦惡澀陰盡乃死雖辛寒苦寒甘寒不同而總以寒為主

麻杏甘石湯

麻黃不宜於

春夏應用薄

荷溫病條辨

有翹荷散銀

翹散即此意

也

銀翹散溫病

初起邪在肺

經為衛分為

氣分此方最

宜

麻黃

四錢去節

杏仁

三錢去尖

石膏

八錢生用

甘草

二錢生用

分兩

照病

增減

生

煮麻黃吹去上沫再下他藥溫服取汗

銀翹散

連翹

一兩帶心

銀花

一兩

桔梗

六錢

薄荷

六錢

竹葉

四錢

芥穗

四錢

甘草

五錢生用

豆豉

五錢炒香

牛蒡子

六錢

湯劑

酌用

二成

研粗末

每

用

六錢鮮葦根湯煮香氣大出即取服勿過煮葢肺藥取

輕清煮久恐味厚八中焦病重者約二時一服日三夜一



輕者三時一服。曰二夜一病不解。次日再作服肺位最高。藥重則過病所。故用時時輕揚法。今人亦有藥合而用法偶差者。一不見效。改弦更張。延緩數日。成中下焦證矣。

胸悶加藿香鬱金。渴甚加花粉。項腫咽痛。加馬勃元參。衄吐血。去芥穗豆豉。加白茅根側柏葉。生梔子。欬加苦杏仁。二三日病猶在肺。熱漸入裡。加生地黃麥冬。再不解。或小便短赤。加梔子。知母黃芩。

此治咳嗽微
渴之至方或
引動少陽相
火乾嘔脈弦
者亦宜之

白虎湯治脈

桑菊飲

苦杏仁

二錢 去尖

連翹

錢半

薄荷

六分

桑葉

二錢

白菊花

錢半

甘草

一錢

苦桔梗

二錢

鮮葦根

二錢

水二杯煮取一杯日二服二三日不解氣粗似喘燥在氣

分加石膏知母舌絳暮熱邪初入營加元參犀角在血分

者去薄荷葦根加麥冬生地黃玉竹丹皮肺熱甚加黃芩

渴甚加花粉

白虎湯

加人參竹葉麥冬名人參竹葉石膏湯



洪黃大渴
大汗之至方
大汗鼻孔扇
者加人參

三承氣湯宜
慎重斟酌勿
輕用惟調胃
承氣為穩

石膏

八錢生用

知母

三錢

生甘草

錢半

白米

四錢

分兩照病增減

先煮米至爛去米入藥煎成溫服熱盛減米甚則不用

大承氣湯 溫病邪戀經絡未全入胃者忌用

大黃

四錢生用酒洗

厚樸

三錢生用

枳實

三錢生用

芒硝

三錢

分兩減原方先

煮前三味成去渣入芒硝上火兩沸硝化溫服

小承氣湯

大黃

四錢生用酒洗

厚樸

二錢生用

枳實

二錢

水煎溫服

調胃承氣湯

大黃

四錢生用酒洗

生草

二錢

芒硝

二錢

先煮前二味煎成去渣

入

硝上火兩沸。少少溫服之。原方用炙草嫌其溫故改用生

者

清宮湯

清宮湯治神

昏譫語邪入

心包者

元參心

三錢

蓮子心

五分

竹葉捲心

三錢鮮苦竹更佳

連翹心

二錢

真犀角尖

二錢磨汁沖服

麥冬

三錢不去心

熱痰盛加竹瀝梨汁咯痰不清加括蕁皮熱毒盛加金汁