

新刻太醫院發刻醫家必究本死生春卷之八

太醫院史 紹庄 徐文元 發刻

醫正 活絡 芮 經 彙集

太醫院醫官雲林 龔廷賢 校正

秣陵後學 文麓 紀夢德 訂正

金陵書坊 蔣氏 石渠閣 梓

○疔腫

夫疔瘡者。以其瘡形如疔蓋之狀。是也。其種有麻子疔。狀如黍米稍黑。四邊微紅極痒。有石疔。皮肉相連。色如黑豈甚硬刺之。不入肉微痛。有雄疔。其狀炮頭黑靨。四畔仰彪。漿起有水。色黃大如錢孔。形高。有雌疔。其色稍黃。向裏靨。四面炮漿起。心凹色

赤形如錢孔。有火疔。其瘡頭黑。靨如湯火燒灼。四邊有煙漿。又如赤粟。有爛疔。其狀稍黑。有白癰。潰有膿水。大如匙面。有三十
六疔。其狀頭黑。浮起。形如黑荳。四邊起赤色。今日生一。明日生
二。及至十數。若滿三十六。藥所不能治。未滿其數可治也。有蛇
眼疔。頭黑皮浮。形如小荳。狀似蛇眼。大體硬實。有鹽膚疔。大如
匙面。四邊皆赤。有黑粟粒起。有水洗疔。大如錢形。瘡頭裏黑。靨
有汁出。有刀鑱疔。其狀濶如薤葉。長一寸。左則肉黑。如燒烙有
浮漚疔。其瘡體曲圓少許。不合長而狹。如薤菜。內黃外黑。黑處
刺之不痛。黃處刺之痛。有牛拘疔。其狀肉色頗起。搗不破。然雖
有十三種名狀。皆不離於氣客經云。或食甘肥過度。不惜酒色。
邪熱蓄積而生。其初生也。頭凹腫痛。青黃赤黑。無復定色。其瘡
先痒後痛。或先寒後熱。或熱定則寒。四肢沉重。心驚眼花。或煩

躁悶亂。或增寒頭痛。或嘔吐心逆。以鍼刺瘡不痛。無血是其候。
經曰。膏粱之變。足生大疔。此之謂也。如針不痛。其人眼黑。或見
火光者。不可治也。凡療之法。皆刺瘡心。至痛處。又刺四邊十餘
下。令血出去。血敷藥。藥力得入。鍼孔中則佳。若不達裏。藥力不
到。又有口中頰邊舌上有赤黑如珠子。瘡上按之。殄痛應心者。
乃是秋冬寒毒。久結皮膚中。變作此瘡。不急療之。日夜根長。流
入諸脉。數道如箭入身。顫掉不已。更不慎。口味房室。瓦石湯火。
麻鐵。噴怒愁恨之類。然不旋踵。經五六日不瘥。心神昏昧。口乾
心煩。嘔吐不定。但在手足頭面。胸背骨節間最急。餘處稍緩。治
之宜早。倘遲。毒氣入腹。則煩悶恍惚似醉。如此者。三二日死矣。
有發於手足。生黃泡。其中或紫黑色。有一條如紅線直上。急用
鍼於紅線止處。刺出惡血。後以蟾酥乳香膏。瘡上貼之。鍼而病

者。知痛出血爲好。否則入腹攻心。必致危困。不可治也。但秋深多有此症。治之勿緩可也。

○脉症捷言

經云。脉浮而熱。身體無熱。形之嘿嘿。胸中微燥。定發惡毒。

又云。脉微而遲。反發熱。弱而數。反振寒。當發症腫。

脉之沉實。其症發於內之外者。

脉之浮數。其症發於外之內者。

凡毒初生。便覺壯熱惡寒。拘急頭痛。精神不寧。煩燥欲飲冷者。毒必深也。如起居平和。飲食如常者。毒必淺也。

凡惡瘡初生。如頭似粟。微有痛癢。俟觸破之。卽煖展。

凡疔瘡。用鍼刀刺破頭。用蟾酥敷之。再以菴荳野菜莎酒。搗攪汁飲之。醉睡覺。卽痛定熱除。不必去。疔自愈。或用紫梗菊

花連根葉搗酒攪汁飲之亦効。

山茨菰磨酒服之取微汗更妙。

凡諸毒瘡痛不可忍者宜以黃連黃芩爲君詳上下根稍以引經之藥爲佐。

病疔瘡初起以千金托裏散主之。

方見七卷內

病惡瘡發熱煩燥外無焮赤痛深在內乃邪氣沉於裏也故先疎通以絕其源必以黃連等之類。

方黃連湯

黃連

當歸

芍藥

木香

檳榔

黃芩

薄荷

桔梗

甘草

連翹

大黃

各等分

右咬咀水煎熟論患之上下食之先後服之。

治一切惡疔初覺增寒疼痛以赤芍藥湯主之。

方見五卷內

病惡瘡。焮腫在外。邪既外顯。熱則內行。或汗或托裏。以防入內。爲患也。

方荆防敗毒散

荆芥 防風 人參 羌活 獨活 前胡

柴胡 桔梗 枳殼 茯苓 甘草 川芎

右咬咀。水煎熟溫服。

病若形質實。脉洪滑有力。疔腫焮開。便閉。以五和大黃湯。

方五和大黃湯

大黃 升麻 黃芩 朴硝

右咬咀。用水煎熟溫服。

病瘡毒作渴。不問腫潰。但脉數發熱者。宜竹葉等之類。

方竹葉黃耆湯

澹竹葉

地黃

麥門冬

黃芪

當歸

川芎

芍藥

人參

甘草

半夏

石膏

黃芩

右咬咀水煎熟不拘時服

〔治〕疔毒始發必先當頭灸之以開其戶次詳所發分野屬何經

脉則內用所屬經藥引經以發其表外刺所屬之經俞穴以泄其邪

〔病〕太陽經一切諸瘡夫瘡由濕熱而生法當清理濕熱爲是經

云風能勝濕寒能勝熱故用防風防已等以疎濕諸苦寒以勝熱佐人參等理氣理血以瀉火也

〔方〕黃連消毒飲

防風

二錢

羌活

一錢

防已

七分

獨活

一錢

黃芩 一錢

桔梗 七分

黃柏 一錢

連翹 一錢

知母 一錢

人參 一錢

橘紅 八分

黃芪 一錢

川歸 二錢

生地 一錢

蘇木 七分

甘草 六分

右咬咀。用水二升。煎一升半。或用酒煎亦可。

治疔瘡始覺。能令速消。以黃連消毒湯主之。

方見七卷內。

病疔腫魚精瘡。煩渴拘急。肢體疼痛。四肢沉重。恍惚悶亂。坐臥

不寧。大小便閉澀。以漏蘆湯治之。

方漏蘆湯

漏蘆

白欬

黃芩

麻黃

枳實

升麻

白芍藥

甘草節

朴硝

各一錢

大黃

二錢氣虛減半

右咬咀。用水煎熟。空心服。

治疔瘡煩躁作渴。以竹葉黃芪湯主之。

方見本卷前。

治疔瘡毒攻心腹嘔吐惡心以護心散主之

方見七卷內

病疔瘡諸癰一切無名腫毒初起增寒壯熱甚者頭痛拘急狀似傷寒一日至四五日者二三劑以衰其毒輕者則內自消散若至六七日不消宜服真人活命飲後服托裏消毒散調理

方連翹散毒散

柴胡

桔梗

羌活

川芎

茯苓

枳殼

前胡

獨活

連翹

金銀花

防風

荊芥

薄荷

甘草

各等分

右咬咀生薑煎瘡在上食後服在下食前如熱甚并痛甚加

黃連黃芩○如大便秘不通加大黃芒硝下之

病一切疔腫不問陰陽虛實善惡腫潰大痛或不痛然當服於

未潰之先與初潰之時如毒已大潰更不宜服初用此劑大勢已退然後隨症調治其功甚捷誠仙方也

方真人活命飲

穿山甲

三大片切碎以蛤粉炒過

天花粉

甘草節

乳香

白芷

赤芍藥

貝母

各一錢

防風

七分

沒藥

當歸尾

酒洗一錢

陳皮

錢半

金銀花

三錢

皂角刺

五分

右咬咀一劑用好酒一鍾半以紙密封灌口勿令泄氣煎至一鍾隨瘡上下以分飢飽溫服能飲酒者服後再飲三五盃忌酸薄酒鐵器服後少臥覺痛定回生神功浩大不可億度再看症加減○在背俞倍皂角刺○在腹募倍白芷○在胸次加瓜蒌仁二錢○在四肢倍金銀花

病

一切疔疽六七日未消者服此藥瘡未成即消已成即潰能壯氣血固脾胃使毒氣不得內攻膿毒易潰肌肉易生切不可早用生肌之藥恐毒氣未盡反增潰爛如有瘡口便貼膏藥以禦風入至瘡口閉闔如不用貼此守成之妙方也

方托裏消毒散

黃芪

鹽水炒

天花粉

各二錢

防風

當歸

酒洗

川芎

白芷

桔梗

炒

厚朴

薑製

穿山甲

炙

皂角刺

炒各一錢

金銀花

陳皮

各三錢

右用水酒各一鐘煎至七分在上食後在下空心二服後只

用水煎服

病

一切疔腫瘡毒不問已成未成但焮痛者以槐花酒散之

○槐花酒 槐花四五兩微炒黃。乘熱入酒二鍾煎十餘沸。去渣熱服。

未成者一二服即消。已成者三二服即愈。

〔治〕一切疔瘡等毒及喉閉乳鵝不問已潰未潰者

〔方〕金銀花酒

金銀花連莖葉搗爛取汁半鍾和熱酒半鍾溫服。甚者不過三五服可保無虞。如秋冬無鮮者以收下乾者用水煎

熟和酒服

〔治〕疔瘡癰背癰瘰癧痔瘡

〔方〕鐵桶膏

蕎麥稈灰淋二碗熬至一碗下 血竭 乳香

沒藥 各三分 爲末入汁內再熬去半碗取下待冷入

黃丹 八分 雄黃 八分 硃砂 好石灰 八錢

右爲極細末。其一處放藥汁內攪勻成膏。磁器收貯。用三稜針刺破。將藥入內。直送深入到底。不三四次全愈。

○癰瘰

夫癰瘰皆由恚怒氣逆。憂思過甚。風熱邪氣內搏於肝。蓋怒傷肝。肝主筋。故令筋畜結而腫。其症多生於頸腋之間。結聚成核。初如荳粒。後若梅核。或在耳後。連及頤頰。至缺盆在鎖字骨陷中。皆爲癰瘰。手少陽三焦經主之。或在胸及胸之側。皆爲馬刀瘰。足少陽膽經主之。二經多氣少血。癰瘰者。指其累累相連。歷歷三五枚。久久不消。漸漸長大。按之則動。而微痛。不增寒壯熱。惟午後微有熱。或夜間口乾。飲食少思。四肢倦怠。是以堅而不能潰。上而不能合。有風毒者得之於風。熱毒者得之於熱。氣毒者得之於氣。乃風熱邪氣蘊結乃成。皆由氣血不足。徃徃變爲

勞者經云。此不繫膏梁丹石之變。因虛勞氣鬱所致。宜補形氣。調經脉。則未成者自消。已成者自潰。若不詳經絡。血脉多少。脉症受病之異。卒用牽牛。斑猫。及流氣飲。十宣散。則血氣已損。而實虛虛之禍。如拍諸掌。脉陳癰疔兩症欸內。

治療瘰癧和血通經。服之自消。以玉燭散。

方玉燭散

當歸

菊葉

川芎

芒硝

熟地黃

黃芩

各一錢

甘草

五分

大黃

看人虛實加減

右咬咀。用生薑二片。水煎熟。空心溫服。

病懷抱挹鬱。瘰癧流注。或四肢患腫。肉色不變。或日晡熱。或潰

而不斂。以益氣養榮之劑。

方益氣養榮湯

黃芪

蜜炙

人參

白朮

炒各一錢五分

當歸

酒洗

川芎

白芍

酒炒

生地黃

陳皮

香附

貝母

各一錢

柴胡

地骨皮

桔梗

炒

甘草

炙各五分

右咬咀一劑水煎食遠服。

如有痰加橘紅。○刺痛加青皮或木香。○午後有熱或頭微眩加酒炒黃柏。○膿水清倍參芪當歸。○女人有鬱氣胸膈不利倍香附貝母。○月經不調加牡丹皮當歸。

病

癰瘰為七情所發以五香連翹湯主之。

方見七卷內。

病

有瘡結硬如石或在耳下或至缺盆中動之無根名曰馬刀。

或肩上或於脇下皆手足少陽經中及癰瘰在頰或至頰車堅而不潰或足陽明經中所出或二症瘡破膿流並以散腫潰堅湯治之。

方散腫潰堅湯

黃芩酒炒一兩八錢 草龍胆酒洗炒四次 桔梗

瓜蒌根酒洗 黃蘗酒炒 知母 昆布各五錢 柴胡一錢

甘草炙 三稜酒洗 桔梗 連翹各三錢 乾葛

白芍藥 當歸鬚 黃連酒炒各二錢 海藻炒

升麻各五錢

右件咬咀每貼一兩煎去渣食後熱服於臥處神足在高頭
低垂每含一口作十次嚥服服畢依常安臥取藥在膈上
停故也另攢半料作細末煉蜜為丸如棗豆大每服百餘
丸用此藥汁留一口送下

治癰癰宜先用益氣養榮湯數十服後服此

方內消散

硃砂一錢 血竭二錢 斑蝥去翅足三分生用

右爲細末。每服一分。空心燒酒調服。未破者。三五日立消。已破者。內服此藥。外用金頭蜈蚣一條。研極細末。用麻油一小鍾。浸二旦夕。搽患處。其瘡卽腫潰。過二三日。腫消。可貼膏藥。瘡勢大者。二十日痊。小者十餘日平復。

〔治〕瘰癧成痿。外用塌腫湯。及洗毒湯。塌洗瘡腫。

〔方〕塌腫湯

芍藥 丹參 黃芩 白欽 各等分

右咬咀。每用五錢。水一升。煎十沸。帛蘸頻塌之。

〔方〕洗毒湯

苦參 防風 甘草 露蜂房 各等分

右咬咀。每用五錢。水煮濃汁。洗瘡腫處。