

景元刻本濟生拔粹

陰征暑例

六。



北京中医药大学图书馆版权所有

醫壘元戎藥目錄 濟生拔粹卷第十

金匱黃耆建中湯

大建中湯

易簡杏子湯

嗽

大補十全散

勞

易簡胃風湯

瀉血

千里漿

荔茭湯

蜜酒

易老門冬飲子

治勞復麥門冬湯

海藏五飲湯

海藏大已寒丸

生地黄黃連湯

血風

增損理中丸

結育

易簡參蘇飲

發熱

萬病紫苑丸

理中湯加減例

平胃散加減例

八物定志丸

補

潔古天麻丸

中風

大効牡丹皮散

血虛

海藏大五補丸

清心丸

治熱

火府丹

瀉丁

調胃白朮澤瀉散

水鼓

四物六合諸方

海藏當歸丸

三陰痛

苦練丸

疝

喉閉不救方

拯濟換骨丹

三焦熱 三焦寒

發班諸藥附

蒸病五蒸湯

活人敗毒散

溫疫

三陽頭痛

發黃茵陳蒿加減例

掌中金

乾血氣

龍腦雞蘇丸

上焦熱

黃耆膏子

同上

地骨皮枳殼散

骨蒸

易簡芎歸湯

血多

三奇六神麴法

千金種子法

搐鼻香

子宮冷帶下

醫聖元戎藥目錄

畢

海藏編類醫壘元戎

傷寒不可汗不可下不可吐諸證

大法春宜吐夏宜汗秋宜下凡用發汗及吐下湯劑皆中病即止

若少陽病脉微不可發汗亡陽故也宜附子湯

若陽已虛尺中弱濇者復不可下之宜小柴胡湯

若動氣在左在右在上在下並不可發汗宜柴胡桂枝湯

若少陰病脉細沉數病在裏不可發汗宜當歸四逆湯

若少陽病不可發汗宜小柴胡湯

若咽中閉塞咽喉乾燥亡血衄家淋家瘡家不可發汗已上

六證並宜小柴胡湯

若下利清穀不可發汗宜理中湯四逆湯之類

若四逆厥及虛家皆不可吐厥者宜當歸四逆湯

虛宜附子湯

有熱人可黃耆人參建中湯

若少陰膈上寒乾嘔不可吐宜小半夏加橘皮湯溫中丸

若咽中有動氣不可下咽中閉塞不可下宜烏扇湯

若外實者不可下諸四逆厥者不可下虛家亦然厥宜當歸

四逆湯

虛者宜附子湯

有熱人黃耆人參建中湯

本虛攻其熱必噦宜小柴胡湯

若脉浮而緊法當身疼痛宜以汗解假令尺中濇者不可發

汗榮氣不足血少故也宜小柴胡湯

若脉濡而緊濡則衛氣弱緊則榮中寒陽微衛中風發熱而

惡寒榮緊衛氣冷微嘔心內煩此不可汗宜小柴胡湯

若濡而弱不可發汗宜小柴胡湯



若浮而大浮爲氣實大爲血虛小便當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗出法應衛家微可與小建中湯

若反更實津液四射榮竭血亡乾煩而不得眠此不可下宜與小柴胡湯

若脉浮大應發汗宜柴胡桂枝湯

若脉浮而緊者不可下而反下之爲大逆宜桂枝麻黃各半湯若脉數不可下宜柴胡桂枝湯

若下之必煩利不止宜葛根黃芩黃連湯

若脉濡弱浮數不可下宜小柴胡湯

若濡弱微瀋微則陽氣不足中風汗出而反躁煩瀋則無血厥而且寒不可下宜桂枝甘草牡蠣龍骨湯

若結胸脉浮大不可下下之即死宜小陷胸湯

若陽病多者熱下之則硬宜小柴胡湯

若太陽發汗不徹轉屬陽明微汗出不惡寒若太陽證不能不可下之下之爲逆宜桂枝麻黃湯

若太陽病有外證未解不可下下之爲逆宜桂枝麻黃湯

若病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞 結胸則有陷胸湯九三 痞則有瀉心湯五

若太陽與陽明合病喘而實滿不可下宜麻黃杏仁甘草石膏湯

若太陽與少陽合病心下硬頸項強而弦者不可下宜小柴胡湯

若病欲吐者不可下宜小半夏加橘皮湯

太陰腹痛吐食自利腹痛下之必實下結硬

厥陰病渴氣上衝心中熱飢不欲食食則吐虺下之則利不止

若少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐腹不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胃中寒實不可下也宜溫中湯生姜汁半夏湯

若無陽陰強大便硬者下之必清穀腹滿宜用蜜煎導法

若傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者不可下此亡血也宜當歸四逆湯下之則死宜四逆加人參湯

若藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也謂下也宜用小柴胡湯

若傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之宜小柴胡湯

若陽明病身面色赤攻之必發熱宜調胃承氣湯

若色黃者小便不利也宜五苓散

若陽明病心下硬滿者不可攻之宜生薑瀉心湯

半夏瀉心湯

攻之利不止者死宜四逆湯

不可汗下吐三法利害非輕前人多列經後大抵醫之失只在先藥藥之錯則變生若汗下不差則永無亡陽生黃畜血結膏痞氣及下痢洞泄脇熱痢瘕急虛勞等證生矣其如此故錄大禁忌於前使醫者當疾之初不犯也

大陽證

桂枝一十四方麻黃五方在後保命集內

傷寒六經所感形證合用汗下吐和解等湯九仲景活人雲岐子保命集載之詳者此不復重錄數書中所無者并諸方對證加減今載于后

金匱黃耆建中湯治虛勞裏急諸不足宜此方主之



黃耆

桂枝

生薑

切各參兩

芍藥

六兩

炙甘草

式兩

膠飴

乙升

大棗

十式个擘

右七味咬咀以水七升先煮六味取三升去滓內膠飴令消
溫服一升日三若嘔者加生薑 若腹滿者去棗加茯苓兩
若肺虛損不足痞氣加半夏五兩

易簡建中加減法

若婦人血疼男子心腹疔痛并四肢拘急疼痛甚者加遠志
半兩

若或吐或瀉狀如霍亂及胃涉濕寒賊風入腹拘急切痛加
附子七錢半

若疝氣發作當於附子建中湯煎時加蜜一匙頭許
若男子婦人諸虛不足小腹急痛脇肋脹臍下虛滿脊中



煩悸面色痿黃唇口乾燥少力身重短氣腰背強痛骨肉
酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復
加黃耆一兩半

若婦人一切血氣虛損及產後勞傷虛羸不足腹中疝痛吸
吸少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出不思飲食加當歸
一兩名當歸建中湯產後半月每日三服令人丁壯

大建中湯治內虛裏急少氣手足厥逆少腹牽急或腹滿弦急
不能食起即微汗出陰縮或腹中寒痛不堪勞苦唇口舌乾
精自出或手足作寒作熱而煩苦酸痛不能久立此補中益
氣右咬咀水五盞煎至二盞去滓分三服

桂心

參分

芍藥

黃耆

各分

甘草

乙分

生薑

伍分

當歸

人參

各分

附子

半分

半夏

式分

棗

依上煎



易簡杏子湯治欬嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積悉皆治療

人參

半夏

茯苓

細辛

減半

乾姜

減半

甘草

炙

官桂

減半

芍藥

五味子

右咬咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚姜五片煎至六分去滓服

若感冒得之加麻黃等分

若脾胃素實者用米殼去筋膜碎剉以醋淹炒等分加之每服加烏梅一枚煎服其効尤驗嘔逆惡心者不可用此

若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃添芍藥如麻黃之數乾姜五味子各增一半名小青龍湯

大補十全散

參耆木茯苓

芍地桂歸川

三五錢秤用

生薑棗水煎

婦人虛弱用

名美號十全

治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨瘡拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘欬中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之

桂

芍藥

甘草

黃耆

當歸

川芎

人參

白朮

茯苓

熟地黃

各等分

右爲鹿末每服二大錢水一盞生薑二片棗二枚煎至七分不拘時候溫服桂芍藥甘草小建中湯也黃耆與此三物即黃耆建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子湯也川芎芍藥當歸四物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱天得地之成數故名曰十全散

易簡胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉

注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度

人參

茯苓

川芎

官桂

當歸

芍藥

白朮

各等分

右咬咀每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去滓稍熱服空心小兒量力減之

若加熟地黃黃耆甘草等分足爲十味名十補湯

若虛勞嗽加五味子

若有痰加半夏

若發熱加柴胡

若有汗加牡蠣

若虛寒加附子

若寒甚加乾姜皆依本方等分

若骨蒸發熱飲食自若者用十補湯加柴胡二兩服之

若氣短加人參

若小便不利加茯苓

若脉弦濇加川芎

若惡寒加官桂

若脉濇加當歸

若腹痛加白芍藥

若胃熱濕盛加白朮

潔古云防風爲上使 黃連爲中使 地榆爲下使

若血瘀色紫者陳血也加熟地黃

若血鮮色紅者新血也加生地黃

若寒熱者加柴胡 若肌熱者加地骨皮

若脉洪實痛甚者加酒浸大黃

千里瀝 一名水葫蘆

木貳 紫蘇葉 桂各半兩 烏梅肉 赤茯苓各壹兩

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大噉化一九嚥津

又方 百藥煎 烏梅肉 紫蘇葉 人參 甘草

麥門冬

又各等分爲細末煉蜜丸嚙化

荔枝湯

烏梅肉

甘草

各三兩

煎

乙兩

白芷

半兩

白檀

參三分

右細末湯點

蜜酒好蜜

三斤

水一椀

細麴

乙升

好乾酵

參兩

右先熬蜜水去花沫令絕冷下麴酵每日三攪三日熟

陽明證

葛根湯二方升麻湯大小青龍等湯在後保命集內承氣湯三方亦在

易老門冬飲子

治老弱虛人大渴

人參

枸杞

白茯苓

甘草

各參分

五味子

半兩

麥門冬

去心伍分

右爲麋末生姜水煎

治勞復起死人麥門冬湯氣欲絕者用之有效



麥門冬乙甘草式粳米半合

右門冬去心爲細末水二盞煎粳米令熟去米約湯一小盞
半入藥五錢已棗一枚去核新竹葉十五片同煎至一大盞
去滓大溫服不能服者綿滴口中 後人治小兒不能灌注
者宜用此綿滴法

此方不用石膏以其二焦無大熱也兼自欲死之人陽氣將
絕者故不用石膏若加人參大妙

海藏五飲湯 一留飲心下二滯飲脇下三痰飲胃中四溢飲膈

上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

旋覆花 人參 陳皮 枳實 白朮

茯苓 厚朴 半夏 澤瀉 猪苓

前胡 桂心 芍藥 甘草

