

聖濟總錄

吳錫璠署

大德重校聖濟總錄卷第一百二十九

癰疽門

腸癰

論曰腸癰由恚怒不節憂思過甚腸胃虛弱寒溫不調邪熱交攻故榮衛相干血為敗濁流滲入腸不能傳導蓄結成癰津液腐化變為膿汁其候少腹鞭滿按之內痛小便淋數汗出惡寒身皮甲錯腹滿如腫動搖轉側聲如裏水或遠臍生瘡膿從瘡出或膿出臍中或大便下膿血宜急治之不爾則邪毒內攻腐爛腸胃不可救矣診其脉洪數者膿已成設脉遲緊雖膿未就已有瘀血也治腸癰少腹堅腫大如掌而熱按之則痛其上色或赤或白小便稠數汗出憎寒其脉遲緊者未成膿如脉數則膿已成大黃湯方

大黃

剉

牡丹皮

消石

研

桃人

湯浸去雙
人皮尖炒

芥子

各半
兩

右五味麤擣篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓空心溫服以利下膿血為度未利再服

治腸癰木占斯散方

木占斯

厚朴

去麤皮生薑汁炙

甘草

炙

細辛

去苗葉

桔樓

去皮

防風

去叉

乾薑

炮

人參

桔梗

炒對

敗醬

各壹兩

右十味搗羅為散每服二錢匕空心日晚溫酒調下

治腸癰牡丹湯方

牡丹皮

壹兩

芍藥

丹參

生乾地黄

切焙各貳兩

薏苡人

桔梗

炒對

麥門冬

去心焙各壹兩半

甘草

炙對

赤茯苓

去黑皮

敗醬

各壹兩

右十味麤搗篩每服五錢匕水二盞入生薑五片煎至一盞去滓空心日晚

溫服

治腸癰犀角丸方

犀角屑

壹兩半

巴豆

拾粒去心皮炒研去油

大黃

參分蒸度對

蜀椒

去目并開口者炒出汗

黃芩

去黑心

防風

去叉

人參

當歸

切焙

黃耆

細對

藜蘆

去蘆頭

山梔子

去皮

黃連

須去

甘草

炙對

升麻

各半兩

右二十四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三九空心米飲下加至四五

九利下黃水為度

治腸癰裏急隱痛大便秘澀梅人湯方

梅核人

肆拾玖箇
去皮尖

大黃

叁兩

牡丹皮

壹兩
叁分

冬瓜人

肆兩

犀角

壹兩
兩半

芒消

貳兩
半

右六味㕮咀如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服以下膿血

三兩行為度

治腸癰附子湯方

附子

炮裂去
皮臍

敗醬

各叁分

薏苡人

壹兩
半

右三味㕮咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至六分去滓空心日晚溫服下

膿血即差

治腸癰雞毛散方

雄雞頂上毛

燒灰

雄雞屎

燒灰各
壹兩

右二味細研為散空心溫酒二合調下一錢匕日晚再服

又方

右截檐頭尖少許燒作灰水調服即穴出膿

治腸癰壯熱惡寒微汗氣急少腹痛小便澀或大便如刀錐刺痛或有膿腹中已成膿瓜子人汁方

瓜子人

參合與水陸合同研絞取汁

當歸

切焙壹兩搗末蛇蛻壹條燒灰研

右三味將二味末和勻分作二服用瓜子汁調下空心日午服下膿血即差

治腸癰大黃牡丹湯方

大黃

剉炒

牡丹皮

各貳兩

桃人

湯浸去皮尖雙人炒半兩

芒消

研壹兩

冬瓜人

參合

右五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空心溫服以利下膿

血為度

治腸癰薏苡人湯方

薏苡人

壹兩

牡丹皮

桃人

湯浸去皮尖雙人炒各壹兩半

瓜子人

半兩

右四味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓空心日晚溫服

胃脘癰

論曰內經謂人病胃脘癰者當候胃脉其脉沉細者氣逆氣逆者人迎甚盛甚盛則熱人迎者胃脉也逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃脘為癰也夫陰陽

升降則榮衛流通氣逆而隔則留結為癰胃脘癰者由寒氣隔陽熱聚胃口寒熱不調故血肉腐壞以氣逆於胃故胃脉沉細以陽氣不得下通故頸人迎甚盛令人寒熱如瘧身皮甲錯或欬或嘔或唾膿血觀伏梁之病亦有俠胃脘內癰者以其裏大膿血居腸胃之外故也

治熱聚胃脘留結為癰連翹升麻湯方

連翹

升麻

射干去毛

獨活去蘆頭

桑寄生

木通

剉各貳兩半

大黃

剉微炒貳兩上搗為麤末

木香

沉香

鎔

薰陸香

丁香

麝香

各等分搗研為細末

右十二味每抄前藥五錢匕水二盞煎至一盞半去滓入後五香末二錢匕再煎至一盞溫服日三服以快利為度

治胃腑實熱留結為癰陽氣不得下胃脉沉細者犀角湯方

犀角

鎔

梔子人

赤芍藥

赤茯苓

去黑皮

黃芩

去黑心

射干

去毛

大黃

剉炒各壹兩

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓入蜜一匙攪勻再煎一兩沸食後溫服

治榮衛不流熱聚胃口血肉腐壞胃脘成癰射干湯方

射干

去毛

梔子人

赤茯苓

去黑皮

升麻

各壹兩

赤芍藥

白朮

各壹兩半

右六味㕮咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入生地黃汁一合蜜半合再煎三沸溫服不拘時候日二服

治熱氣留聚胃脘內結成癰麥門冬湯方

麥門冬

去心焙

犀角

鎊

萎蕤

薺芫

赤芍藥

石膏

各壹兩半

甘草

炙

紅雪

各壹兩

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入竹瀝一合再煎三兩沸溫服

治胃脘蓄熱結聚成癰芍藥湯方

赤芍藥

犀角

鎊

木通

剉

石膏

碎

升麻

各貳兩

甘草

生剉

朴消

玄參

麥門冬

去心焙各壹兩

右九味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候

緩疽

論曰緩疽者以寒氣客於經絡榮衛凝澀其寒氣盛則腫痛深伏其狀無頭尾大如拳小如桃李與皮肉相附著其腫與肉色相似亦不甚赤積日不潰久乃變紫黯色皮肉俱爛如牛領瘡以其初勢緩慢故名緩疽以其腫色與肉色相似故亦名肉色疽

治緩疽木占斯散方

木占斯

乾薑

炮裂

桂

去麤皮

細辛

去苗葉

敗醬

防風

去叉

桔梗

炒

桔樓

去皮各半兩

甘草

炙壹分

人參

兩壹

厚朴

去麤皮薑汁炙到叁分

右十一味搗羅為散每服二錢匕空心溫酒調下日晚再服

治緩疽芍藥湯方

芍藥

當歸

各壹兩

黃耆

剉

生乾地黄

焙

赤茯苓

去黑皮各壹兩半

人參

甘草

炙各參分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎棗二枚擘破同煎

至八分去滓空心溫服晚再服

治緩疽及諸癰腫膿血結聚皮肉堅厚日久不潰疼痛黃耆湯方

黃耆

沉香

薰陸香

連翹

各參分

羚羊角屑

壹兩

雞舌香

漏蘆

去蘆頭

黃芩

去黑心

梔子人

甘草

生剉

防風

去叉

桔樓根

各半兩

右十二味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓不計時候溫服

治緩疽日久穿潰出膿水不盡排膿散方

貝齒

壹兩

黃耆

剉

當歸

剉微炒

赤芍藥

生乾地黄

焙

黃連

去須

升麻

桂

去麤皮

白欬

犀角屑

各參分

甘草

半兩生剉

麝香

壹分細研

右十二味擣研為散拌勻再羅每服溫酒調下二錢匕不計時候

治緩疽初結微腫疼痛塗貼莽草散方

莽草

鹿角屑

白欬

白及

半夏

天南星

附子

生去皮臍各壹兩

蛇蛻皮

壹條炙

皂莢

兩挺去黑皮及子

右九味擣羅為散用醋麪薄糊調為膏塗貼腫處乾即再上以腫散為度

治緩疽蛇牀散方

蛇牀子

末

杏仁

湯浸去皮尖雙入研細入

黃連

去須搗末

乳香

細研各

鹽壹分

蔓菁根參兩切

右六味以蔓菁根和藥末細研令勻塗傳腫上乾即易之

治緩疽惡瘡蝕惡肉飛黃散方

丹砂

雌黃

磁石

曾青

白石英

礬石

石膏

石鍾乳

雄黃各貳兩

雲母粉參兩

右十味各細研為散用瓦盆一口丹砂安南雌黃安中磁石向北曾青在東白石英在西礬石當上石膏次更下鍾乳雄黃雲母覆蓋更用一盆覆蓋定以泥封厚一寸於竈底以陳葦燒一日取出看取飛上者研細傳瘡上日二度即差

治緩疽以飛黃散蝕惡肉盡用雄黃散熏方

雄黃

乾雞屎白

藜蘆去蘆頭

丹砂細研

乾鰻鱺魚炙焦各壹兩

右五味搗羅為散以青布裹之安小土竈內燒熏患處如是熏三日即止後用黃耆散常法傳之

治緩疽黃耆散方

黃耆貳兩

右一味細剉擣羅為散傅瘡上日一度

又方

漆頭蘭茹

貳兩

右一味擣羅為散傅瘡上日二度

石疽

論曰石疽與石癰之證同比石癰為深以寒客經絡氣血結聚而不得散隱於皮膚之內重按如石故謂之石疽癰疽皆熱氣所作今寒氣為梗故凝結不化其毒內著結鞅如石治宜溫其經絡使熱氣得通其毒外泄故能腐熟而發散化膿血而出也

治石疽堅鞅皮色深赤惡寒壯熱一二日未膿者下之升麻湯方

升麻

連翹

玄參

大青

大黃

劉微炒各壹兩

敗醬

絡石

白欬

各半兩

生地黄

貳兩

右九味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分入芒消一錢去滓空心溫服微利三兩行未利再服

治石疽結堅若壞若未壞或已成疽者占斯散方

木占斯

厚朴

去蠹皮

生乾地黄

焙

栝樓

乾者

敗醬

防風

去

桔梗

炒

人參

細辛

去苗葉

桂

去蠹皮

右十味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下食前

治石疽腫毒結靱口乾煩熱四肢拘急不得卧沉香湯方

沉香

防風

去

木香

各參

地骨皮

麥門冬

去心

當歸

切

升麻

玄參

枳殼

去瓢

羚羊角屑

獨活

去蘆

甘草

生

赤芍藥

各壹

大黃

剉炒

右十四味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎取七分去滓不計時候溫服

治石疽堅靱不消地黄煎方

生地黃

淨洗

右一味剉碎細研以布絞取汁入銅器內盛重湯上煮柳篋攪勻如糖以瓷

合盛每日空心取一九如彈子大溫酒調下日午晚間再服即差

治疽發堅如石核復大色不變鹿角散方

鹿角

燒過

白欬

壹

麤理黃石

伍兩

燒令赤色

投醋

再燒入醋

染徧

右三味搗羅為散以醎醋調如糊塗傅腫上乾即再傅以差為度

治石疽堅如石不作膿商陸根貼方

生商陸根

半斤

右一味爛搗如泥於故帛上塗貼乾即易之

治石疽狀如瘰癧而皮厚者楮實塗方

楮實

不以多少

右一味搗羅為末以醋調如糊塗患上乾即易之

治石疽堅靱皮色紫赤惡寒壯熱一二日未成膿者下之後宜用木香散貼方

木香

大黃

生

升麻

白欬

芒消

赤小豆

各半兩

右六味搗羅為散以榆白皮汁入水少許調和如糊以故帛上塗貼日二上

即差

又方

鹿角

右一味於石上水磨如泥塗患上日三五度即差

又方

半夏壹兩

右一味搗羅為末以水調如糊塗患上日三五度即差

治石疽塗傳方

蜀漆乾者半兩

桑根白皮貳兩

右二味搗羅為末鎔牛膠更以酒調和塗傳腫上日三五度即差

又方

葭蓉子貳兩

右一味搗羅為散以醋調和如糊塗傳腫上乾即再塗取差

又方

梁上塵

蔡塗灰各壹兩

右二味搗羅為散以醋調如糊塗傳腫上日三兩度即差

又方

蛇蛻皮

右一味燒灰細研以醋調如糊塗腫上乾即易之

附骨疽

論曰骨疽者由風入骨解與熱相搏復為冷濕所折風熱伏結不得發散蘊積成毒故附骨而為疽喜發於大節解間按之應骨皮肉微急洪洪如肌而不外見是也治之宜急稍緩則膿不得潰而肢體變青黯者不可治

治附骨疽漏蘆湯方

漏蘆

去蘆頭

升麻

連翹

麻黃

去根節各壹兩

大黃

剉炒壹兩半

防已

木香

白欬

沉香

各參分

右九味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入竹葉一七片煎至八分再入芒消一錢攪勻去滓空心溫服取利三兩行未利再服

治附骨疽連翹湯方

連翹

射干

升麻

防已

黃芩

去黑心

大黃

剉炒

甘草

炙

芍藥

杏仁

湯浸去皮尖雙入各壹兩

芎藭

去苗貳兩

右十味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分入芒消一錢匕去滓空心

溫服

治附骨疽敗醬湯方

敗醬

貳兩

大黃

劉炒壹兩

桃人

貳兩

右三味麤擣篩每服五錢匕先取皂莢刺一两剉碎以水二盞煎至一盞半
漉出下藥及朴消一錢同煎至八分去滓空心溫服

治附骨疽亂髮湯洗方

亂髮灰

兩半

杏仁

推碎貳拾壹粒

甘草

劉伍寸

鹽花

兩半

右四味以漿水五升煎至三升濾去滓通手洗疽上若有膿血洗取淨後以
絹帛縛定每日三兩徧洗

治附骨疽瘡及陰瘡久不差天靈蓋散塗傳方

天靈蓋

酥炙壹兩

狗骨

燒灰壹兩半

白礬

燒灰壹兩半

麝香

研壹錢

右四味擣研為散乾傅瘡口日三五上以差為度

治附骨疽天南星散塗傳方

天南星

炮

附子

炮裂去皮臍

黃蘗

去麤皮各半兩

鉛丹

研壹分

麝香

研半

右五味除麝香鉛丹外擣羅為散入二味和勻乾傅瘡上日三五度

治附骨疽久不差麝香散塗傳方

麝香

研壹分

麒麟竭

蜜陀僧

煨各壹兩

右三味細研為散先用鹽湯洗瘡拭乾取活鱧魚一條剉細研搗瘡上一宿明旦揭看有蟲即去再拭乾塗傳散子日三五度即差

治附骨疽內消小豆散方

赤小豆

壹合

糯米

伍合 炒黑

右二味搗羅為散水調如糊攤故帛上塗貼乾即易之

治附骨疽騏驎竭散塗傳方

騏驎竭

檳榔

剉

黃連

須去

馬腸根

各壹兩

右四味搗羅為散先以油炒葱豉入膩粉半錢和搗捻作餅子一片用鹽漿水洗瘡後用餅搗瘡上以生帛縛定三日後再用鹽湯洗即塗傳散子日三五次

治附骨疽久不差骨從瘡口出烏雞散塗傳方

烏雞雞骨

燒灰

牛膝木

剉燒灰 參家者

炊單

燒灰 參家者 各壹兩

右三味合和研細塗傳瘡上日三五度碎骨出即差

治附骨疽久不差或差年歲再發秦艽散塗傳方

秦艽

去苗土