

七〇〇—

治癌中藥及其處方

葉銘洪編著

萬葉出版社出版

葉銘洪編著

七〇〇—治癌中藥及其處方

萬葉出版社出版

1986年11月10日

• 內容提要 •

本書較全面地介紹有關治癌中藥及其方劑。全書共分四部份：第一、二部份概述西醫治癌方法、中醫有關癌症理論及治癌中藥；第三部份介紹治癌中藥共一百三十餘種；第四部份爲補遺及其他。書中共收集七百多個治癌中藥方劑，故名爲「七〇〇——治癌中藥及其處方」。

七〇〇——治癌中藥及其處方

葉銘洪編著

萬葉出版社出版
香港莊士頓道190號三樓
利通圖書公司發行
九龍紅磡民裕街41號八樓C座
新雅印務有限公司承印
香港乍非道301號

版權所有·翻印必究

前言

在這本書裏，收集了七百多個治癌的中藥方劑，因此定名爲：「七〇〇——治癌中藥及其處方」。

本來打算在每一個方劑之後，詳列該方劑的臨床使用經過及病者的病情，但這樣一來，就會使篇幅增加了很多倍，付印不易，也不利於普及。因此，只好把這些資料刪去。

對於治癌中藥的研究，已日益受到重視，但在研究時難免會發生一些偏向。較常見的是在處方時，往往把多種治癌中藥同時使用，這種漁翁撒網式的處方，雖然也可能收效，但也有可能各藥物的作用互相排斥或抵銷而變得無效，甚至會互相矛盾而發生副作用；而且即使漁翁撒網式能夠收效，也不易確知究竟是哪一些藥物起作用。因此，除非確有必要，否則在處方時還是精簡地使用較少種類的藥物會得到較佳的效果。

另一種常見的偏向是只注意發掘少用少見的新藥物，而忽略了常見的藥物方劑中也有不少是可以治癌的，例如黃耆、薏苡仁、金銀花、桑白皮、貝母等都是具有抗癌作用的常見藥物；而逍遙散、歸脾湯等更是中醫極爲熟悉的方劑。推而廣之，只要按照中醫的整體治療理論，辨症施治，很多古代成方和常用中藥都可用以治癌。

中醫有獨特精闢的醫學理論，有積累數千年的寶貴經驗和豐富的藥物寶藏，如果能夠用現代的科學方法去深入研究，實行中西醫結合，對於治療癌症，肯定會有較大的貢獻。

中國醫師

葉銘洪

綜合運用中醫藥各種療法

精醫 神經衰弱、頸癭腫核，及各種頑惡難治之症

診所：香港灣仔莊士頓道 188—192 號三樓 B、C 座
電話：H 755281

（請先用電話預約）

積善鼻敏丸

——世界第一特效藥劑——

這些都是鼻敏感的症狀，天氣變化時發作更甚，它們不但使病者長期感到不便和痛苦，並且會令人神經衰弱，陰重影響身體健康，決不能等閒視之！

鼻敏感與鼻竇炎，根本不同，若誤服鼻竇炎藥當然難以收效，至於一般抗敏感藥品，服之只能暫止一時，停藥後便又症狀發作，甚或比前更甚，而且那些治標的抗敏感藥對身體也往往有不良副作用，更不宜多服了。

要根本治療鼻敏感病，只能服食鼻敏感的特效中藥製劑——「積善鼻敏丸」。

積善鼻敏丸藥性和平，無不良副作用。而其最突出的優點，是確能拔除病根，不只在服食時症狀消失，而且停藥後也不會復發，其療效之徹底，堪稱世界第一而無愧。

至於鼻涕濃涕，或有膿血，則是鼻炎（鼻淵）的症狀，那就應該服食該廠的另一種出品——「積善鼻淵丸」。

上述兩種藥俱已在港面世，批發電話：H七三三八。特約經銷處：香港永樂街瑞昌。分銷：大埔道中正、鼓油街大公、波斯富街光明、春秧街宜安、卑路乍街潮泰、大道中15張公安及13正和、洛克道英國、筲箕灣道38汕頭、九龍佐敦道26金城、彌敦道鼓油街安康寧、荔枝角道14李有記、上海街51道安、上海街33和平、北河街3聚國英、馬頭圍道48啓昌、鮮祿街榮泰、荃灣沙咀道教成、葵安街信明、百安、澳門振興、全昌等。

目次

前言

一、概談西醫的治癌方法與治癌中藥……………(一)

二、與癌症有關的中醫理論……………(四)

三、治癌藥物及處方……………(一一)

動物類藥物……………(一一)

1 動物結石(牛黃、狗寶、箭豬棗)……………(一)

2 麝香……………(四)

3 臍帶……………(一六)

4 人尿……………(一七)

5 馬尿……………(一八)

6 胎鼠……………(一九)

7 羚羊角……………(二〇)

8 鼯鼠……………(二一)

9 穿山甲……………(二二)

10 蜈蚣……………(二三)

29 蟹	28 海星	27 蚌	26 蝸牛	25 田螺	24 鼈肉、鼈甲	23 龜肉、龜板	22 蛇肉、蛇退	21 蜥蜴	20 壁虎	19 蟾蜍	18 土鼈虫	17 水蛭	16 露蜂房	15 蜈蚣	14 斑蝥	13 殭蠶	12 蚯蚓	11 蝎子
五五	五四	五三	五二	五〇	四八	四七	四四	四三	四一	三八	三七	三五	三三	三二	二九	二八	二六	二五

30 泥鰍·····	五六
31 鰕·····	五七
32 啄木鳥·····	五八
33 貓頭鷹·····	五九
礦物類藥物·····	(六〇)
1 礞砂·····	六〇
2 雄黃·····	六二
植物類藥物·····	(六四)
1 七葉一枝花·····	六四
2 楸木·····	六六
3 喜樹·····	六六
4 石上柏·····	六八
5 威靈仙·····	六九
6 黃藥子·····	七一
7 籐梨根·····	七四
8 六棱菊·····	七五
6 玉蜀黍·····	七六
10 馬錢子·····	七七
11 玉簪花·····	八〇

12 薜荔果	八一
13 金銀花	八三
14 八角金盤	八五
15 野百合	八七
16 神仙草	八九
17 夏枯草	九〇
18 腫節風	九二
19 山豆根	九三
20 槐牛兒苗、望江南	九五
21 澤漆	九七
22 番木瓜	九九
23 水龍骨	一〇〇
24 抱樹蓮	一〇一
25 瞿麥	一〇三
26 核桃樹枝	一〇四
27 菱	一〇六
28 半枝蓮	一〇八
29 楸	一一〇
30 紫草	一一二

49 四葉葎		一五〇
48 蓬莪朮		一四九
47 蠶豆		一四七
46 豬殃殃		一四六
45 白英		一四四
44 桑白皮		一四二
43 馬兜鈴		一三九
42 龍葵		一三七
41 蛇莓		一三五
40 敗醬草		一三三
39 薏苡仁		一三一
38 半夏		一二九
37 天南星		一二六
36 瓜蒌		一二三
35 田七		一二一
34 菝葜		一一九
33 蛇葡萄		一一八
32 韭		一一六
31 大蒜		一一四

68 番杏	一八九
67 荳草	一八六
66 狗牙花	一八五
65 紫籐	一八四
64 靈芝、扁芝、槐耳	一八〇
63 土大黃	一七九
62 木棉樹	一七七
61 鐵樹葉	一七五
60 八月扎	一七三
59 貝母	一六九
58 鳳仙花	一六七
57 無花果	一六六
56 薤白	一六四
55 老鼠簕	一六二
54 山慈菇	一六〇
53 枸橘	一五八
52 黃毛耳草	一五六
51 紫參	一五四
50 梅	一五二

69 木薯	一九〇
70 蒟蒻	一九一
71 橘皮（青皮、陳皮）	一九四
72 白花蛇舌草	一九六
73 馬利筋	一九八
74 白屈菜	二〇〇
75 假烟葉	二〇一
76 仙人掌	二〇三
77 王不留行	二〇四
78 冬蟲夏草	二〇六
79 狗舌草	二〇八
80 黃耆	二〇八
81 長春花	二一一
82 三白草、大薊根	二一二
83 葫蘆茶	二一五
84 葵樹子	二一六
85 山芝麻	二一七
86 青黛	二一九
87 烏骨藤	二二一

88 山澤蘭	二二二
89 葶薺	二二三
90 涼粉草	二二四
91 馬齒莧	二二四
92 筋莧菜	二二六
93 鳳尾草、水楊梅	二二七
94 木鼈子	二二九
95 石豆蘭	二三〇
96 魚腥草	二三一
97 山海螺	二三二
98 勝紅薊	二三三
99 苦爹菜	二三五
100 垂盆草	二三六
101 向日葵	二三七
四、補遺及其他	(二三九)

一、概談西醫的治癌方法與治癌中藥

西醫治癌，有三種療法：其一是把癌腫割除；其二是使用鐳、鈷等放射綫來殺死癌細胞；其三是使用化學藥物。割治方法只在早期發現癌腫時有效，若癌細胞蔓延到身體其他部份，就難於逐一徹底割除；放射綫雖能殺死癌細胞，但癌腫附近的細胞及組織亦難免同時受到放射綫的損害。因此，第一、二兩種療法都是有嚴重缺點的，雖然近年來對於割治手術和使用放射綫方法已有很大改進，但仍未能完全克服這些缺點。

使用化學藥物去治療癌症，直到目前為止，這個療法也是有下列缺點的：

1. 治癌藥物毒性很大，有些人會引起極嚴重的反應。
2. 治癌藥物多數由泌尿系統排泄或在肝內解毒，如病人的肝、腎功能有損害，就會發生藥物積滯而引起嚴重的毒性反應。

3. 治癌藥物對造血系統的影響極大，常引起嚴重的造血再生障礙現象，尤以原來有造血機能損害的病人為甚。

4. 對於體力衰弱，全身情況惡劣的病人，使用治癌藥物是有危險的，尤其是在大劑量沖擊或幾種治癌藥物合併應用時，更為危險。

雖然如此，但由於治癌藥物的作用可達身體各處，不論癌細胞轉移到何處，仍有可能受到藥

力的影響，並且近年來新發現的治癌藥物日益增多，因此，癌症的化學藥物療法愈來愈受重視。現在，各國的科學家正在加緊研究，多方面地探求治癌的藥物，每年有上萬種新藥進行動物篩選，應用於臨床的品種也有多種，應用範圍也愈來愈廣泛。

很多學者相信，如果能夠進一步闡明腫瘤生化代謝的特點，合成具有高度選擇性作用的治癌新藥，減輕藥物的毒性並提高臨床使用水平，化學藥物治療不僅逐漸與手術治療、放射治療等並列，並且將在癌腫的治療中佔有更重要的地位。

其實，西醫使用化學藥物治癌也不是近代才開始的，遠在二千年前，已有人使用秋水仙治療腫瘤，一八六五年 Lissauer 就已應用砷劑治療慢性白血病，到了近代，化學藥物治癌發展轉趨迅速。一九四一年 Huggins 首先使用女性激素治療前列腺癌收效，激素治癌開始受到重視；一九四六年 Cilman 和 Philips 發表了氮芥類藥物對造血系統腫瘤的療效，烷化劑開始應用於臨床；一九四八年 Farber 使用抗葉酸製劑治療急性白血病，抗代謝藥也受到廣泛注意。

至於植物治癌藥，近年來也有了很大的發展。美國學者 (R. E. Perdue) 檢查過五萬多種植物，發現其中有二千二百多種有破壞癌細胞的能力。中醫所使用的藥物多為植物，其中極可能有治癌藥物；因此，不少外國學者都對中藥的抗癌作用進行研究，而且不斷有所發現。

不過，外國學者研究中藥和中醫的觀點是不同的。

外國學者着重於單味藥物的化學成份分析，希望找到有效的治癌成份，進行動物移植腫瘤的實驗。在確定其效能後，再把這些成份提取出來，製成新藥。

中醫對於藥物治療，除了使用單味藥物之外，更着重於幾種藥物合成的方劑。對於藥物的分析，中醫另有一套理論，從藥物的氣味（辛、甘、苦、酸、鹹等）、性能（溫、熱、寒、涼、

平、收斂、淡滲、升提、發散、補、瀉與及入某經某臟等）去研究。中藥複合方劑的構成，也另有君、臣、佐、使等規定。在使用這些方劑時，中醫着重於具體的臨床經驗，講究對症下藥，因人而施。對於前人經驗的整理和發展，也是和臨床實踐密切結合的。

我們認為這兩種方法各有所長，可以綜合採用，如果研究中藥的治癌性能而不從中醫的基本理論去加以闡明，就不易對這些藥物有全面的理解。