

癖



此疾乃五六十歲年老之人生此疾症不成膿結
毒莫用涼劑付貼若使涼藥付貼卽毒入肺癰卽
死用鹿角散相和黃礬丸頻頻服之以好爲度
開鬱順氣解毒湯方在前

千金托裏散



乳岩

已嫁未嫁皆生



此毒陰極陽衰柰虛陽積而與血無陽安能散故
此血滲于心經卽生此疾若未破可療已破卽難
治捻之內如山岩故名之早治得生若不治內潰

浩然樓



肉爛見五臟而死

未破用蠲毒流氣飲加

紅花

蘇木

生地

熟地

撫芎

烏藥

甘草

小柴胡

瓜婁仁

又方

撫芎

柴胡

青皮

香附

甘草

玄胡索

陳皮

桔梗

黃芩

梔仁

枳殼

天花粉

烏藥

白芷

貝母

各一兩

砂仁

五錢

蔓荊子

炒一兩

右為末水丸每服二錢日進三四服作煎劑服之

亦可



風毒遍身串



此毒生於皮膚之間因中暑毒或食災牛災馬瘟
猪等物以生此疔雖見勢兇亦易治忌食生冷
入臟腑難治先服流氣飲次服人參敗毒散
猪苓 澤瀉 當歸 防風

外用圍藥

次服蠟礬丸

用前醫流注取汗流氣飲治之甚宜



火腰帶毒



火腰帶毒受在心肝二經熱毒傷心流滯於膀胱
不行壅在皮膚此是風毒也當用清肝流氣飲敗

毒和氣散治之不可便敷藥清肝流氣飲亦宜

桔梗

甘草

防風

前胡

羌活

獨活

赤芍

連翹

薄荷

羌活

石膏

枳殼

黃連

白茯苓

歸身

青皮

黃芩

煎服之

敗毒流氣飲

紫蘇

桔梗

枳殼

防風

柴胡

甘草

川芎

白芷

芍藥

當歸

羌活

茯苓

烏藥

陳皮

姜三棗一煎服

患上用紫金錠水磨汁頻用鷲毛蘸汁潤之



內丹



內外者從脇下至腰下腫發赤色名曰內丹如
覺可治至腰便不可治其病多大小便不通
不過三日而飛遍身青黑色而死用救急丹
付內丹處更服連翹敗毒散

當歸

連翹

黃芩

甘草

麥冬

木通

柴胡

前胡

黃連

生地

姜二片棗一枚水二鍾煎服



肩疽并下疽




病肩疽者因負重傷動肩井穴故生此疽用內托
散加 烏藥 青木香 外貼金絲膏

丫疽因空心于宿水內洗手恐水中有蟲遊過染
其穢毒以生此疾急用鐵箍散暗醋調和厚付患
處却服敗毒內托散神思昏迷色紫氣臭者難治



上下肋癰

上下肋癰受在肝經寒熱不調風濕伏於腸胃結
成癰毒發出皮膚生此惡症當用敗毒流氣散後



服內托流氣飲

照毒流氣散

紫蘇

桔梗

枳殼

甘草

烏藥

厚朴

青皮

茯苓

陳皮

柴胡

玄胡索

姜三棗一不拘時服

後用內托流氣飲

人參

木香

黃芪

厚朴

甘草

紫蘇

桔梗

枳殼

官桂

烏藥

當歸

白芍

防風

白芷

川芎

茯苓


陳皮

天花粉

姜三棗一煎服



訓疽
一名爛疽



訓疽者肺經受熱發于兩手五指頭上一八日不
瀉必死四日可刺如發黑癰不甚過節猶可治也
黑甚過節者死雖過節猶可治者藥入及之也其
狀因小黯肉中生點子點小者如粟豆大惟大者
如梅李或赤或黑乍青乍白有實核卽根也不浮
腫慘痛應心至骨或身體發熱若不急治毒遂冲
上面悉腫泡點紫黑爛壞入藏殺人南人得此名
曰榻着毒卽截去其指恐毒攻上罕有一生十指
端忽然策策痛入于心不可忍之向明望者晃晃
黃赤或黯青黑是標疽齒間出臭水血者七日亡

矣但厚肉處卽割去用炮鐵烙炮上令焦如炭亦
如疽上灸百壯爲佳須頓飲葵根汁青錠花竹瀝
犀角汁枳殼湯消毒飲若吐膿血不治宜以灰掩
膿血上不爾毒氣着人亦相染矣燥疽害人不論
踵惡風入肌脉初未知覺毒鬱旣發若火之烈其
上隱小而深實點黑而不明其病應心稍緩則入
臟矣

枳殼湯

枳殼

射干

升麻

生地

黃芩

前胡

金銀花

連翹

大黃

甘草節