

凡跌打損傷或從高墜下惡血流於內不分何經之傷皆肝之所主蓋肝主血也故凡敗血凝滯從其所屬而必歸於肝多脇肋小腹者皆肝經之道也若其壅腫痛甚或發熱自汗皆當酌其虛實而以調血行經之藥治之

一脈法如內經曰肝脈搏堅而長色不青當病墮若搏因血在脇下令人嘔逆○金匱云寸口脈浮微而澁然當亡血若汗出設不汗出者當身有瘡被刀斧所傷亡血故也○脈經云金瘡出血太多其脈虛細沉小者生浮數實大者死○砍刺出血不止其脈來大者七日死滑絀者生○從高顛仆內有

瘀血腹脹脉堅強者生小弱者死○破傷有瘀血在內者脉
堅強實則生虛小弱則死○若血亡過多者脉細小則生浮
大數實則死皆爲脉病不相應故也

一治法凡胸滿脇脹者宜行血○老弱者宜行血活血○腹痛
者宜下血○瘀肉不潰或潰而不斂宜大補氣血○若打撲
墜墮稍輕別無瘀血等證而疼痛不止者惟和氣血調經脉
痛自止更以養氣血健脾胃則無有不效○亦有痛傷胃
氣作嘔或不飲食者以四君子湯加當歸砂仁之類調之○

若有瘀血不先消散而加補劑則成實實之禍設無瘀血而

妄行攻利則致虛虛之禍故凡治此證須察所患輕重有無
瘀血及元氣虛實不可槩行攻下致成敗證蓋打撲墜墮皮
肉不破肚腹作痛者必有瘀血在內宜以復元活血湯攻之
老弱者四物湯加紅花桃仁川山甲補而行之若血去多而
煩躁此血虛也名曰亡血宜補其血如不應當以獨參湯補
之○一凡損傷不問老弱及有無瘀血停積俱宜服熱童便
以酒佐之推陳致新其功甚大若脇脹或作痛或發熱煩躁
口乾喜冷惟飲熱童便一甌勝服他藥他藥雖亦可取效但
有無瘀血恐不能盡識反致誤人惟童便不動臟腑不傷氣

血萬無一失嘗詢之諸營操軍常有墜馬傷者何以愈之俱
對曰惟服熱童便卽愈此其屢試之驗亦明矣然惟胃虛作
嘔及中寒泄瀉者不可服○大凡腫痛或傷損者以葱搗爛
炒熱罨之或用生薑葱白同搗爛和麩炒熱罨之尤妙或用
生薑陳酒糟同搗爛炒熱罨之亦可○外治損傷諸方如秘
傳正骨丹沒藥降聖丹當歸導滯散黑丸子本事接骨方十
沒藥丸洗損傷等十餘方俱有妙用所當詳察

立齋曰予於壬申年被重車碾傷悶瞽良久復蘇胸滿如築氣
息不通隨飲熱童便一碗胸寬氣利惟小腹作痛吾鄉銀臺

徐東濠先生與復元活血湯一劑便血數升腫痛悉退更服
養血氣藥而痊○戊辰年公事居庸見覆車被傷者七八人
地呻吟一人未蘇予俱令以熱童便灌之皆得無事

杖瘡 七十五

杖瘡一證凡其甚者必以瘀血爲患血瘀在外者淺則砭之深
則刺之內潰者開之腐肉者取之血瘀在內者宜以活血流
氣之藥和之甚者利之行之此治血凝之法也然其受刑之
時號叫則傷氣忍痛則傷血悲憤則傷志血氣情志俱傷虛
所必至若不培補則羸困日甚矣况脾主肌肉脾氣受傷則

飲食必減血脈損壞則肌肉俱病故凡既傷之後但察其虛多滯少者則宜以參芪歸朮熟地甘草之屬專理脾氣以托氣血脾健則元氣日復肌肉自生可保無虞矣其有傷筋骨而作痛者宜沒藥降聖丹治之若牙關緊急或腰背反張者以玉真散治之並效總之此證宜先察其有瘀無瘀及形氣虛實酌而治之凡諸變證治法有未盡者宜與前跌打損傷互參通用○外杖瘡四方見外科方中

文刑部用晦伏

關諫南巡受杖瘀血已散壞肉不潰用托裏

之藥稍潰而膿清此氣血虛也非大劑參芪不能補文君亦

善醫以爲恐腹滿予強之而飲食稍思遂加大補劑飲食日
進肉潰膿稠而愈○又治江翰林諸公與文同事者九人皆
散其瘀血漸用排膿托裏之藥俱愈○夏鳳北京人因杖
瘡臀膝通潰膿瘀未出時發昏憤此膿毒內作而然也急與
開之昏憤愈甚此虛也以八珍湯一服少可數服死肉自腐
頓取之令用猪蹄湯洗淨以神效當歸膏塗貼再以十全大
補湯兩月而愈若更投破血之劑則危矣

薛按

破傷風

七十六

病機云破傷風者有因卒暴傷損風寒襲之傳播經絡致使寒

熱更作身體反張口噤不開甚者邪氣入熾○有因諸瘡不
瘥營衛俱虛肌肉不生瘡眼不合邪亦能外入於瘡爲破傷
風之候○有諸瘡不瘥舉世皆言著灸爲上是爲熱瘡而不
知火熱客毒逐經爲變不可勝數微則發熱甚則生風而搐
或角弓反張口噤目斜○亦有破傷不灸而病此者因瘡着
白痂瘡口閉塞氣難通泄故陽熱易爲鬱結熱甚則生風也
徐用誠曰此論所因有四二者因瘡口入風似屬外因一者因
灸生熱似屬不內外因一者因瘡口閉塞內熱生風似屬內
因也○又云破傷風證古方藥論甚少豈非以此疾與中風

同論故不另立條目也惟河間論與傷寒表裏中三法同治
其言病因有因外傷於風者有因灸者有因內熱所作者然
與中風相似也但中風之人尚可淹延歲月而破傷風者犯
之多至不救蓋中風有在經在府在臟之異獨入臟者最難
治破傷風或始而出血過多或瘡早閉合瘀血停滯俱是陰
虛受病乃五臟之所主故此風所傷始雖在表卽隨必傳入
臟故多死也此病或因瘡口坦露或因瘡口閉密皆能爲之
若病已十分安全而忽有此大抵皆由內氣虛而有鬱熱者
乃得之若內氣壯實而無鬱熱者雖害而無所害也

立齋曰大法破傷中風風熱燥甚怫鬱在表而裏氣尚平者必
善伸數欠筋脉拘急時或惡寒或筋惕而播脉浮數而弦皆
表證也宜以辛熱治風之藥開散結滯是與傷寒表熱怫鬱
而以升麻湯辛熱發散者同也然凡用辛熱開其風熱結滯
者宜以寒藥佐之則免其藥雖中病而風熱轉甚也如治傷
寒發熱用麻黃桂枝而加黃芩知母石膏之類是也若近世
以甘草滑石葱豉寒藥發散甚妙○若表病不已漸傷入裏
裏又未太甚而脉在肌肉者宜以退風熱開結滯之寒藥調
之或微加治風辛熱亦得猶傷寒在半表半裏而以小柴胡

和解之意也○若裏熱已甚而舌強口噤項背反張驚搐惕
搦涎唾稠粘胸腹滿塞或便溺閉結或時汗出脉洪數而弦
然出汗者由風熱甚於裏而表邪已罷腠理疎泄心火內盛
故汗出也法宜除風散結以寒藥下之後用退風熱開鬱滯
之寒藥調之熱退結散則風自愈矣○凡治此者亦宜用按
摩導引之法及以藥斡開牙關勿令口噤使粥藥得下也

一婦人臂癰將愈患破傷風發熱搐搦脉浮數予以當歸地黃
湯治之彼不信乃服發散敗毒藥果甚始信而服之數劑而
痊○一男子背瘡未痊斂以膏藥剪孔貼之患破傷風證而

歿此先失於內補外邪襲其虛耳余見此證貼膏藥剪孔欲其通氣而反患破傷風搽歛藥生肌欲其收口而反助餘毒以致歿者多矣可不慎哉

薛按

一破傷風通用方

稀蒼酒

外二五六

防風湯

外二五六

蜈蚣散

外二六四

大芎黃湯

外二六一

羌活湯

外二五九

白朮防風湯

外二五八

玉真散

外二六二

敷藥

外二五五

養血當歸地黃湯

外二六三

類破傷風 七十七

立齋曰大凡癰疽潰後筋糜肉爛膿血大泄陽隨陰散或筋脉拘急惡寒惕搦甚者舌強口噤項背反張痰涎壅盛便閉汗出不時發熱此氣血俱虛而變見若此雖與破傷風相類而主治之法但當大補血氣若果有風證亦須以大補氣血爲主而兼以治風之藥設若不審是非而妄藥之則誤矣

司徒邊華泉肩患癰而發熱目直或睜殊類中風日晡熱甚脉益數此足三陰氣血虧損虛火妄動也用參芪歸朮炙甘草加酒炒黑黃栢五味麥冬肉桂四劑而愈又數劑而斂○一

儒者患腿癰深蓄於內肉色不變久不穿潰針出膿瘀五碗
許惡證駢臻全類中風此脾胃虛而變證也用六君子湯加
當歸炮薑及聖愈湯各四劑而安又勞心不寐用歸脾湯而
愈

薛按

斑疹丹毒

七十八

斑疹一證雖已有正門詳載然彼以小兒麻疹爲言其有非麻
瘡而無論大人小兒忽患斑疹小瘡者此雖與彼相類而實
有小異也是亦不可不辨而治之蓋多由風熱外感之證耳

治此之法脉浮而身熱有表證者惟散風邪爲主脉浮而數

者祛風兼清熱脉沉滑而無表證者清火爲主脉浮沉俱滑
數而表裏兼見者宜表裏雙解之然惟小兒多有此證須察
其表裏虛實酌而治之可也總之小兒脆弱宜安裏之藥多
攻發之藥少秘則微泄之結則微導之但令邪氣不壅而散
之易則證輕而兒自安矣大抵身溫煖者順身涼者逆

王海藏曰前人云首尾俱不可下者何也曰首不可下者爲斑
未見於表下則邪氣不得伸越此脉證有表而無裏故禁首
不可下也尾不可下者爲斑毒已顯於外內無根蒂大便不
秘本無一切裏證下之則斑氣陷逆故禁尾不可下也

潔古曰斑疹之病其爲證各異發焮腫於外者屬少陽三焦相火也謂之斑小紅靨行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹凡見斑證若自吐瀉者多吉慎勿亂治謂邪氣上下俱出也若斑疹並出者其邪必甚小兒難勝是以多生別證也然首尾皆不可下

立齋曰凡小兒丹毒遍身俱赤不從砭治以致毒氣入腹則不救蓋此證乃惡毒熱血蘊蓄於命門遇相火而合起也如霞片者須砭去惡血爲善如腫起赤色遊走不定者宜先以生麻泔塗患處砭之以洩其毒凡從四肢起入腹者不治雖云

丹有數種治有數法無加砭之爲善常見患稍重者不用砭法俱不救

一婦人患斑作痒脉浮以消風散四劑而愈○一婦人患斑作痒脉浮數以人參敗毒散二劑少愈更以消風散四劑而安○一男子患斑色赤紫焮痛發熱喜冷脉沉實以防風通聖散一劑頓退又以荆防敗毒散加芩連四劑而愈○一老人患疹色微赤作痒發熱以人參敗毒散二劑少愈以補中益氣湯加黃芩山梔而愈○一小兒患疹發熱作痛煩渴欲以清涼飲下之診其脉不實舉指不數此邪在經絡也不可下