

广西壮族自治区
药品标准

一九八〇年版



广西壮族自治区卫生局编

广西壮族自治区

药品标准

一九八〇年

广西壮族自治区卫生局编

前 言

为了加强药品管理，促进药品生产发展，提高药品质量，确保人民用药安全与有效，根据卫生部关于制订地方药品标准的通知精神，我局委托自治区药品检验所组织有关部门，重新整理修订我区1979年以前审批的中西药品标准，汇编成《广西壮族自治区药品标准》1980年，作为药品生产、供应、使用、检验、管理等部门监督药品质量的依据。

凡原审批的药品质量与本标准有不一致之处，均按本标准的规定执行。

在执行中，希有关部门注意总结经验，积累资料，对错误漏和不完善之处，请随时提出意见，以便修订。

广西壮族自治区卫生局

一九八〇年九月

凡 例

(一)本标准收载中西药品共303种,此外,有的药品过去虽经批准,但目前已不生产、质量标准资料不全或产品质量尚不稳定的,本标准未予收载。凡属中国药典1977年版、卫生部药品标准(1963年)及卫生部抗菌素标准1972年收载的品种,均不在收载之列。

(二)本标准按药品中文名称的笔划顺序排列,原料药及部分制剂列有拉丁文名称,少数药品附有别名。

(三)本标准内容分“正文”、“附录与附表”及“索引”三个部分,正文记载中西药品及制剂;附录记载制剂通则、检查法及附表;索引列有中文索引及拉丁文索引。

(四)本标准所用术语、度量衡、符号、温度、试药、试液、缓冲液、指示液、当量液与克分子液、检验方法等,除另有规定外,均以中国药典1977年版凡例和附录为依据。

(五)本标准制剂所用的原料及辅料除另有规定外,均应符合中国药典1977年版、卫生部药品标准(1963年)及卫生部抗菌素标准1972年及本标准的规定。

(六)各种药品的检验,如采用其他方法,则应与规定的方法进行对比试验,根据试验结果掌握使用,但在需要仲裁时,应以规定的方法为准。

(七)本标准检验方法中所述的对照品系指纯度较高的原料药品。

(八)本标准的解释和修改权属于广西壮族自治区卫生局。

目次

十一烯酸癣药水.....	1	止血定痛片.....	24
十香丸.....	1	止咳枇杷糖浆.....	24
十香止痛丸.....	2	止咳片.....	25
十滴水.....	2	止咳糖浆.....	26
丁维钙粉.....	3	止痛丹.....	27
丁维葡萄糖.....	4	内补养荣丸.....	27
人工矿泉盐.....	4	毛鸡酒.....	28
人造补血药.....	5	牛黄至宝丸.....	28
九龙冲剂.....	6	风湿药酒.....	29
九龙糖浆.....	6	心得宁.....	29
力勃隆片.....	7	心得宁片.....	30
三七片.....	8	心舒平片.....	31
三合维生素片.....	8	六君子丸.....	31
三金片.....	10	六神丸.....	32
三磺软膏.....	10	双炔失碳酯.....	32
三磷酸腺苷二钠注射液.....	11	53号避孕片.....	33
土霉素糖粉.....	12	玉慈霖片.....	34
大黄碳酸氢钠片.....	12	甘和茶.....	35
上清丸（广西方）.....	13	扑炎痛.....	35
口服蜂乳.....	14	扑炎痛片.....	37
山楂丸.....	14	甲氧苄氨嘧啶注射液.....	37
广西国公酒.....	15	田七花冲剂.....	38
卫生丸.....	15	田七粉.....	38
卫生培元丸.....	16	四环素糖粉.....	39
小儿止咳糖浆.....	16	四维葡萄糖.....	39
小儿安.....	17	生化丸.....	40
小儿安片.....	79	半夏片.....	41
小儿退热片.....	19	半夏糖浆.....	41
小儿咳嗽糖浆.....	20	宁坤丸.....	42
小儿消食片.....	22	宁神定志丸.....	42
小儿健脾散.....	22	宁嗽糖浆.....	43
五加皮药酒.....	23	加味风湿酒.....	43
五味子糖浆.....	23	加味宁神丸.....	43

芒果止咳片	44
耳散	45
西瓜霜	45
灰黄霉素软膏	46
当归丸	46
当归注射液	47
当归养血丸	48
当归精	48
吐根酊	49
吗导敏片	50
回春丹	50
全鹿丸	51
合霉素	52
合霉素片	53
合霉素注射液	53
合霉素胶囊	54
杀烈癣药膏	54
多种钙糖片	55
壮腰健身丸	56
壮腰健肾丸	56
安胎益母丸	57
安热静注射液	57
安痛定注射液	58
安替比林片	60
妇科调经片	60
红霉素软膏	61
远志糖浆	61
克泻痢宁片	62
苏菲咳	63
抗炎松软膏	64
抗热牛黄散	64
抗感冒片(4号)	65
延胡索乙素	65
延胡索乙素片	66
含碘喉症片	67
妥路糖浆	68
肝B ₁₂ 片	68
肝乐宁注射液	69

肝炎冲剂	70
肝胆炎片	70
肝铁补片	71
肝浸膏片	71
龟鹿滋肾丸	72
补血催生丸	73
补血糖浆	73
补肾强身片	74
灵芝冲剂	74
陈香路百路片	75
附桂理中丸	76
鸡血藤糖浆	76
鸡骨草丸	76
驱风油	77
驱风药水	77
驱蛔糖	78
板蓝根冲剂	79
板蓝根注射液	79
板蓝根糖浆	80
苦胆草片	80
苯甲醇注射液	81
虎杖浸膏片	81
明目滋肾片	82
岩泽兰片	82
罗汉果止咳糖浆	83
果导片	84
乳白鱼肝油	84
乳酶生片	86
金鸡片	86
金霉素糖粉	87
肿节风冲剂	88
肿节风注射液	88
肿痛宁	89
炎见宁片	89
炎肿化毒片	90
注射用盐酸四环素(肌注)	91
泻宁片	91
泻痢散	92

治咳枇杷糖浆·····	92	复方催压降片·····	118
庚酸·····	93	复方维生素B ₂ 片·····	119
庚酸锌·····	93	复方维生素B肝片·····	120
降压灵·····	94	复方穿心莲片·····	121
降压灵片·····	94	复方碳酸亚铁丸·····	121
参茸片·····	95	复合维生素B溶液·····	123
参茸补肾丸·····	95	保和丸·····	123
参茸酒·····	96	保济丸·····	124
参茸蛤蚧保肾丸·····	96	保胎丸·····	124
药用空心胶囊·····	97	保健丸·····	125
咳丸·····	98	保健钙片·····	125
胃可必舒·····	99	保婴散·····	126
胃乐片·····	100	信宁咳·····	127
胃灵·····	101	追风苏合丸·····	128
204胃药·····	101	食母生片·····	128
胃肠宁冲剂·····	102	胆汁注射液·····	129
胃痛片·····	102	胆黄素片·····	130
胃膜素·····	103	胆黄素胶囊·····	131
胃膜素胶囊·····	103	胆酸止咳片·····	132
骨宁注射液·····	104	脉安冲剂·····	132
钙素母片·····	105	脉舒静片·····	133
钙糖片·····	105	胎盘组织液·····	133
种子三达丸·····	106	胱氨酸·····	134
香砂养胃丸·····	107	胱氨酸片·····	135
复方土槿皮酊·····	107	氢化可的松软膏·····	136
复方止咳片·····	108	度米芬喉片·····	137
复方丹参片·····	109	浓维磷补汁·····	138
复方白须公片·····	109	首乌片·····	139
复方石淋通片·····	110	首乌酒·····	140
复方对乙酰氨基酚片·····	110	养血安神片·····	140
复方西瓜霜·····	111	冠心舒·····	141
复方红根草片·····	112	冠心舒片·····	142
复方庚酸锌软膏·····	112	结石通片·····	142
复方罗汉果冲剂·····	113	盐酸可乐定注射液·····	143
复方胃友片·····	113	盐酸四咪唑·····	144
复方胃痛片·····	115	盐酸四咪唑片·····	145
复方氨咖片·····	116	盐酸吗啡双胍·····	145
复方黄连素片·····	117	盐酸吗啡双胍片·····	146

盐酸金霉素眼膏	147
盐酸频通定片	147
盐酸麻黄碱糖浆	148
柴胡注射液	149
哮喘丸	149
烟酸肌醇酯片	150
豹骨木瓜酒	150
氨制八角茴香酊	151
脑组织液	151
疳积片	152
烟酸肌醇酯	153
消炎退热冲剂	154
消肿止痛精	155
调经种子丸	155
理中丸	156
黄连素软膏	156
黄精丸	157
眼生素注射液	157
眼宁注射液	159
蛇胆半夏散	160
惊风七厘散	160
婴儿安	161
婴儿安片	162
银翘解毒丸	162
鱼腥草注射液	163
康力龙	164
康力龙片	165
鹿茸片	165
鹿茸精	166
清心牛黄丸	166
清热镇咳糖浆	167
羚翘解毒丸	167
维丁钙片	168
维丙胺	169
维丙胺注射液	170
维他钙片	170
维生素 B ₁₂ 片	171
维生素C 葡萄糖注射液	172

维生素U	173
维生素U片	174
葡萄糖鱼肝油	174
喜树碱	175
喜树碱混悬液(静注)	176
硫酸卡那霉素软膏	177
硫酸软骨素	177
硫酸软骨素片	179
蔗糖铝	179
硫黄铝片	181
搜风顺气丸	181
搜风理肺丸	182
蛤蚧大补丸	182
蛤蚧定喘丸	183
蛤蚧补肾丸	183
蛤蚧养肺丸	184
蛤蚧党参膏	185
跌打万花油	185
跌打风湿酒	186
跌打扭伤灵	187
跌打药酒	187
氯化钙葡萄糖注射液	188
氯霉素注射液	189
舒筋活血片	189
滋补片	190
滋阴补肾丸	190
碘酊5%	191
碘化钾片	191
感冒冲剂	192
感冒咳嗽冲剂	193
蜂王精片	193
蜂乳胶囊	194
解热止痛散	194
溴化钠注射液	195
增效四环素片	195
鼻通	197
精制狗皮膏	198
醋酸泼尼松软膏	198

毒癣灵软膏.....	199
镇惊丸.....	200
镇惊散.....	200
撒痛风注射液.....	201
潘生丁片.....	202
磺胺嘧啶软膏.....	203
磺胺噻唑软膏.....	204
糖钙片.....	204
癣药水.....	205

附录与附表

块状冲剂.....	207
糖浆剂.....	207
部分中草药索引表.....	208

索 引

中文索引.....	212
拉丁文索引.....	221

十一烯酸癣药水

Shiyixisuan Xuanyaoshui

本品含十一烯酸($C_{11}H_{20}O_2$)不得少于标示量的92.0%。

【处方】 十一烯酸 100g
醇(70%) 适量
全量 1000ml

【性状】 本品为淡黄色透明的醇溶液，有特异的臭味，易挥发。

【鉴别】 取本品约1ml，加高锰酸钾试液数滴，颜色即消失。

【含量测定】 精密量取本品5ml(约相当于十一烯酸0.5g)，置锥形烧瓶中，加酚酞指示液数滴，用N/10氢氧化钠液滴定，即得(每1ml的N/10氢氧化钠液相当于18.43mg的 $C_{11}H_{20}O_2$)

【作用与用途】 本品适用于头部白癣、干癣、秃癣、黄癣、指甲白癣、脚癣、水泡性斑状白癣、汗泡状白癣、趾指湿疹(香港脚)等症。

【用法与用量】 外用 用棉花或纱布蘸药水少许 涂擦于患处 每日2~3次

【注意】 本品用于破裂皮肤略有短时刺激性，忌入口服。

【贮藏】 在凉处保存，用后应密塞。

十 香 丸

Shixiang Wan

【处方】	沉香 50g	木香 50g	丁香 50g
	小茴香 50g	香附 50g	陈皮 50g
	乌药 50g	泽泻 50g	荔枝核 50g
	猪牙皂 50g		

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g粉末加炼蜜80~100g制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色大蜜丸；气芳香，味微甜。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(中国药典1977年版一部附录I页)。

【功能与主治】 理气散结。用于气滞腹痛，诸疝胀痛。

【用法与用量】 口服 一次1丸 一日1~2次

【注意】 孕妇慎用。

【规格】 每丸重9g。

【贮藏】 密闭，防潮。

十 香 止 痛 丸

Shixiang Zhitong Wan

【处方】	丁香	60g	小茴香	60g	檀香	80g
	乳香(制)	60g	冰片	16g	降香	80g
	木香	80g	沉香	80g	广藿香	80g
	没药(炒)	60g	香附(制)	160g	麝香	4g

【制法】 以上十二味，除麝香、冰片、乳香、没药外，其余丁香等八味粉碎成细粉；将麝香、冰片、乳香、没药研细，与上述粉末配研，过筛，混匀，每100g粉末加炼蜜105~115g制成大蜜丸或小蜜丸，即得。

【性状】 本品为黑褐色大蜜丸或小蜜丸；气芳香。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（中国药典1977年版一部附录1页）。

【功能与主治】 行气解郁，散寒止痛。用于气滞胃寒，胸胃刺痛，腹胀疼痛。

【用法与用量】 口服 一次大蜜丸1丸 或小蜜丸3g 一日3次

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 大蜜丸每丸重3g。

【贮藏】 密闭，防潮。

十 滴 水

Shidishui

【处方】	樟脑	25g
	姜	25g
	大黄	20g
	小茴香	10g
	桂皮	10g
	辣椒	5g
	桉叶油	12.5ml
	乙醇(70%)	适量
	全量	1000ml

【制法】 以上八味，取姜、大黄、小茴香、桂皮和辣椒等粉末，混匀，用乙醇（70%）作溶媒，按照中国药典1977年版一部附录10页酊剂项下的渗漉法，依法渗漉，收集滤液约700ml，加入樟脑及桉叶油，搅拌，使完全溶解，再继续收集滤液，使成1000ml即得。

【性状】 本品为棕色澄明液体；臭芳香，味辛辣。

【检查】 乙醇量 应为60~70%。(中国药典1977年版一部附录48页)

乙醇浸出物 取本品10ml, 置称定重量的蒸发皿中, 置水浴上加热至干, 在105°干燥2小时, 遗留残渣不得少于1.4%。

【功能与主治】 用于因中暑而引起的头晕、恶心、腹痛、胃肠不适等。

【用法与用量】 口服 一次2~5ml

【贮藏】 置阴凉处, 密闭保存。

丁 维 钙 粉

Dingweigai Fen

本品含葡萄糖酸钙($C_{12}H_{22}O_{14}Ca \cdot H_2O$)应为标示量的92.0~108.0%。

【处方】	葡萄糖酸钙	150g
	口服葡萄糖	150g
	维生素D ₂	7万单位
	香蕉香精	0.8g
	蔗糖粉	700g
	制成	1000g

【制法】 取维生素D₂溶于乙醇中, 与香蕉香精及适量的葡萄糖酸钙混合, 再与葡萄糖、蔗糖粉混合均匀, 即得。

【性状】 本品为白色或类白色的粉末; 味甜。

【鉴别】 (1) 取本品约1g, 加稀盐酸10ml振摇, 滤过, 滤液显钙盐的鉴别反应(中国药典1977年版二部附录33页)。

(2) 取本品约1g, 加水10ml, 加热溶解后, 缓缓滴入温热的碱性酒石酸铜试液中, 即发生氧化亚铜的红色沉淀。

(3) 取本品1g, 加水10ml, 加热溶解后, 加三氯化铁试液1滴, 显黄色。

【含量测定】 精密称取本品1.5g, 置锥形瓶中, 加水10ml, 微热溶解, 放冷至室温; 另取水10ml, 加氨—氯化铵缓冲液(pH10.0)10ml, 稀硫酸镁试液1滴与铬黑T指示剂少许, 滴加M/20乙二胺四醋酸二钠液至溶液显纯蓝色, 将溶液并入锥形瓶中, 用M/20乙二胺四醋酸二钠液滴定至溶液自紫红色转变为纯蓝色(每1ml的M/20乙二胺四醋酸二钠液相当于22.42mg的 $C_{12}H_{22}O_{14}Ca \cdot H_2O$)。

【作用与用途】 用于妊娠期和哺乳期妇女、婴儿、发育期儿童的钙质缺乏和不足的疾病、肺结核患者的辅助治疗剂。

【用法与用量】 口服 一次2~3g 一日3次

【贮藏】 密闭保存。

丁 维 葡 萄 糖

Dingwei Putaotang

VITAMINUM D₂ ET GLUCOSUM

【处方】	口服葡萄糖	1000g
	维生素D ₂	0.0025g (100000单位)
	香料	1g
	乙醇	适量

【制法】 取维生素D₂与香料溶于乙醇中，逐滴加入葡萄糖内，并充分搅拌使混合均匀，即得。

【性状】 本品为白色结晶性粉末或颗粒性粉末；味甜。

【鉴别】 取本品约0.2g，加水5ml溶解，缓缓滴入温热的碱性酒石酸铜试液中，即发生氧化亚铜的红色沉淀。

【检查】 干燥失重 取本品，在105°干燥至恒重，减失重量不得过10.0%（中国药典1977年版二部附录40页）。

【作用与用途】 营养药。用于妇女授乳期，儿童发育期等。

【用法与用量】 口服 一次10~20g 一日3次

【贮藏】 密闭，遮光保存。

人 工 矿 泉 盐

Rengong Kuangquan Yan

SAL CAROLINUM FACTITUM

本品含氯化钠(NaCl)应为17.0~19.0%，碳酸氢钠(NaHCO₃)应为34.0~38.0%，硫酸钠(Na₂SO₄)及硫酸钾(K₂SO₄)总量以干燥硫酸钠计算，应为38.3~47.6%。

【处方】	干燥硫酸钠	440g
	碳酸氢钠	360g
	氯化钠	180g
	硫酸钾	20g
	共制	1000g

【制法】 将干燥硫酸钠、碳酸氢钠、氯化钠及硫酸钾的细粉混合均匀，即得。

【性状】 本品为白色结晶性粉末，味咸略带涩味。

【鉴别】 本品的水溶液应显硫酸盐、钾盐、氯化物、钠盐及碳酸氢钠的鉴别反应（中国

药典1977年版二部附录33~36页)。

【检查】 重金属 取本品1g,加水10ml溶解后,加醋酸至遇石蕊试纸呈中性反应,再加稀醋酸2ml与适量的水使全量成25ml,依法检查(中国药典1977年版二部附录43页),含重金属不得过百万分之十二。

砷盐 取本品0.5g,依法检查(中国药典1977年版二部附录45页),含砷量不得过百万分之十。

【含量测定】 取本品约2g,精密称定,置100ml量瓶中,加水使溶解,并稀释至刻度,摇匀。

碳酸氢钠 精密量取上述稀释液20ml,加甲橙指示液1滴,用N/10盐酸液滴定,即得。(每1ml的N/10盐酸液相当于8.401mg的 NaHCO_3)。

氯化钠 精密量取上述稀释液10ml,加水20ml及硝酸5ml,精密加入N/10硝酸银液25ml,再加硝基苯3ml,强力振摇,加硫酸铁铵指示液2ml,用N/10硫氰酸铵液滴定,即得(每1ml的N/10硝酸银液相当于5.845mg的 NaCl)。

硫酸钠及硫酸钾总量 精密量取上述稀释液10ml,通过阳离子交换树脂,并用水通过阳离子交换树脂洗涤至流出的洗液对甲橙指示液显中性,合并滤液与洗液,加甲橙指示液2滴,用N/10氢氧化钠液滴定,消耗N/10氢氧化钠的ml数减去上项氯化钠消耗N/10硝酸银的ml数,即得(每1ml的N/10氢氧化钠液相当于7.1mg的 Na_2SO_4)。

【作用与用途】 盐类泻药。有缓泻作用,用于便秘及消化不良。

【用法与用量】 消化不良 一次2~6g 缓泻 一次5~20g

【贮藏】 密闭,置干燥处保存。

人造补血药

Renzao Buxue Yao

本品含铁(Fe)量应为0.39~0.46%(g/ml)

【处方】	枸橼酸铁铵	20g
	维生素 B_{12}	0.05g
	亚砷酸钾溶液	0.5ml
	尼泊金	0.5g
	单糖浆	适量
	水	适量
	全量	1000ml

【性状】 本品为棕红色粘稠液体,味甜带铁味。

【鉴别】 取本品0.5ml,加水10ml与稀醋酸1ml后,加亚铁氰化钾试液数滴,溶液显蓝色。

【检查】 浑浊度 取本品10ml,加水至50ml,振摇混匀后,应无明显浑浊。

pH值 应为4.6~6.5(中国药典1977年版二部附录37页)。

比重 本品的比重不得小于1.24(中国药典1977年版二部附录13页)。

砷盐 精密量取本品10ml,置50ml量瓶中,加水至刻度,摇匀。精密量取稀释液2ml,依法检查(中国药典1977年版二部附录45页),含砷量应为百万分之四至百万分之六。

【含量测定】 精密量取本品20ml,置碘瓶中,加稀硫酸20ml,摇匀后,放冷至15°,滴加N/10高锰酸钾液至显淡红色并持续5秒钟,加盐酸15ml及碘化钾试液15ml,密塞,静至15分钟后,加水50ml,用N/10硫代硫酸钠液滴定,至近终点时,加入淀粉指示液2ml,继续滴定,至蓝色消失,并将滴定的结果用空白试验校正,即得(每1ml的N/10硫代硫酸钠液相当于5.585mg的Fe)。

【作用与用途】 补血药。用于缺铁性贫血。

【用法与用量】 口服 一次10ml 一日3次 饭后服

【注意】 服药后2小时内忌饮茶。

【贮藏】 密闭,在干燥阴凉处保存。

九 龙 冲 剂

Jiulong Chongji

【处方】 肿节风 694g 牛大力 694g 葫芦茶 347g
木腰子(仁) 206g 胡颓子叶 347g

【制法】 以上五味,取木腰子(仁),牛大力根加水煎煮1小时,再加入其余肿节风三味,煎煮二次,每次2小时,合并煎液,滤过,滤液浓缩成稠膏状,加乙醇,使含乙醇量达70~75%,静置,滤过,滤液浓缩成稠膏状,加入糖粉833g。可溶性淀粉适量,制成颗粒,干燥,即得。

【性状】 本品为棕黄色颗粒;味甘微苦。

【检查】 应符合冲剂项下有关的各项规定(中国药典1977年版一部附录5页)。

【功能与主治】 镇咳祛痰,用于治疗慢性支气管炎。

【用法与用量】 开水冲服 一次1包 一日2次

【规格】 每包重10g(相当于总生药22.8g)。

【贮藏】 密闭、防潮。

九 龙 糖 浆

Jiulong Tangjiang

【处方】 肿节风 625g 牛大力 625g 葫芦茶 312g
木腰子(仁) 185g 胡颓子叶 312g

【制法】 以上五味，先将牛大力，木腰子（仁）加水煎煮1小时后，加入其余肿节风等三味煎煮二次，第一次2小时，第二次1.5小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至适量，另加蔗糖300g与适量防腐剂煮沸使溶解，滤过，滤液加水至1000ml，搅匀，即得。

【性状】 本品为棕褐色粘稠液体，味甜带苦。

【检查】 比重 应为1.12~1.16（中国药典1977年版一部附录26页）。

其他 应符合糖浆剂项下有关的各项规定（附录207页）。

【功能与主治】 镇咳祛痰，用于慢性支气管炎。

【用法与用量】 口服 一次20ml 一日2次

【贮藏】 密封。

力 勃 隆 片

Libolong Pian

TABELLAE EXTRACTI HEPATIS COMPOSITAE

本品每片含枸橼酸铁铵以铁（Fe）计算，应为25.1~32.3mg。

【处方】	肝浸膏粉	83.3g
	枸橼酸铁铵	133.0g
	维生素B ₁	0.2g
	维生素B ₂	0.07g
	干 酵 母	9.23g
	制成	1000片

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后为棕褐色。

【鉴别】 取本品粉末0.5g，加水20ml，搅拌滤过，滤液蒸干，取残渣加强热，即炭化，残渣中加稀盐酸溶解后，显铁盐的鉴别反应（中国药典1977年版二部附录34页）。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（中国药典1977年版二部附录1页）。

【含量测定】 取本品10片，除去糖衣，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于枸橼酸铁铵0.4g），置烧杯中，加水20ml，搅拌，滤过，滤渣用水20ml分二次洗涤，合并滤液与洗液，置碘瓶内，加盐酸10ml与碘化钾2g，密塞，在暗处放置15分钟，加水50ml稀释后，加淀粉指示液，用N/10硫代硫酸钠液滴定，并将滴定结果用空白试验校正，即得（每1ml的N/10硫代硫酸钠液相当于5.585mg的Fe）。

【作用与用途】 营养药。用于贫血和营养不良等。

【用法与用量】 口服 一次3~5片 一日3次

【贮藏】 密封保存。

三七片

Sanqi Pian

【处方】 三七 300g

【制法】 以上三七，粉碎成细粉，过筛，混匀，加适量辅料，制成颗粒，压片包糖衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后，显浅棕褐色；味甘微苦。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（中国药典1977年版一部附录6页）。

【功能与主治】 止血化瘀，消肿止痛。有增加冠状动脉血流量，降低血压，减少心脏耗氧量的作用。用于跌打损伤、咯血、崩漏、冠心病、心绞痛。

【用法与用量】 口服 一次4片 一日3次

【规格】 每片相当于总生药0.3g。

【贮藏】 密封。

注：三七（筋条50%、剪口30%、须20%）。

三合维生素片

Sanhe Weishengsu Pian

TABELLAE VITAMINI TRIPLICIS

本品每片含维生素B₁ (C₁₂H₁₇ON₄SCl·HCl)、维生素C (C₆H₈O₆) 应为标示量90.0~110.0%；维生素B₂ (C₁₂H₁₆O₆N₄) 应为标示量85.0~115.0%。

【处方】	维生素C	75g
	维生素B ₁	2g
	维生素B ₂	2g
	制成	1000片

【性状】 本品为黄色片，具有微弱的特殊香气。

【鉴别】 (1) 取本品细粉适量（约相当于维生素B₁ 5mg），加水搅拌，滤过，滤液蒸干后，加氢氧化钠试液2.5ml溶解后，加铁氰化钾试液0.5ml与正丁醇5ml，强力振摇2分钟，放置，使分层，上面的醇层即显强烈的蓝色荧光，加酸使成酸性，荧光即消失，再加碱使成碱性，荧光又显出。

(2) 取本品细粉适量（约相当于维生素B₂ 2mg），加水100ml振摇，浸渍数分钟，滤过，滤液在透射光下显淡黄绿色，并有黄绿色荧光，加矿酸或碱，荧光即消失。