

增廣
靈驗方新編

上海錦章圖書局
印行

小兒科

雜治

痘症

驚風

麻症

(四)

小兒科雜治

初生去毒開口法

保嬰各法

岐真人兒科秘法

夏禹鑄審小兒顏色苗

兒科外治法

指紋切要

稀痘並免驚風

初生面紅啼哭不止

晝啼不止

夜啼不止

曲腰啼哭

遍身奇癢叫啼不止

初生遍身發黃

初生遍身紅腫

初生無皮

週身脫皮

兩腿生瘡脫皮

身如蛇皮鱗甲

初生身如魚泡如水晶

瘡似楊梅破爛有孔

紅絲瘤

顛門腫大

頭縫不合

初生眼目紅赤腫爛

小兒門眼

小兒變蒸

兩腮腫硬

口角生瘡

口流涎水

口腫並生馬牙

口生白點

初生小兒或兩腮腫硬或口內生瘡或生馬牙或重舌木舌蛇舌吐舌及口不開不食乳等症

重舌

木舌

舌忽脹大腫硬即時

蛇舌

吐舌

頸軟

痰喘有聲

喉嘶聲啞

小兒病後口不能言

兒不食乳

吐乳

缺乳

斷乳

龜胸

龜背並治龜胸

腹痛

肚腹脹大亮如水晶

肚皮忽然青黑

腹中鳴如蛙聲

肚臍腫出

臍內膿血不乾

預防臍風

臍風

小兒中惡以及痰閉火閉氣閉乍然卒死

小兒初發瘧疾

氣喘

吐瀉

暑月水瀉

小兒痢疾

初生陰囊過大

忽然陰腫

陰囊赤腫

陰囊腫墜光亮啼哭

陰縮入腹

陽物腫痛

初生小便不通

小便數日不通遍身腫滿

大小便不通

初生大小便出血

夜睡遺尿在牀

初生糞門閉塞

足趾向復

瘡疾

胎毒

小兒科驚風

驚風論

慢驚

慢驚治驗

急驚

小兒科痘症

痘症治法

痘有四宜

痘有四忌

發熱

形色

起脹

養漿

收結

痘毒

痘症諸方

治驗

辨痘法

看耳法

避穢氣法

暑月出痘

冬月出痘

出痘兒睡不可驚動

二十四項方

推拿法

痘方

舌上痘疔

赤斑核

痘出一半忽然不語昏迷不省人事手足冰冷目閉面青唇白氣息俱涼

熱痘方形虛痘又現元氣本來虛弱而毒氣猛烈以致痘出不快

上身痘已起脹下身痘尚未出或出而陷下不起痘不起脹

痘症黑陷不起

兩頭痘

蛇皮痘

空倉痘

菜羹痘

血泡痘

白漿痘

漏痘

蛙痘

琉璃痘

草尾珠痘

黑痘

頭面頸項諸痘

眼中生痘

免痘入眼

出痘眼目紅腫

出痘痘眼有膿血

出痘眼痛

古與鼻孔有痘

出痘縮舌

舌上有痘

古上爛痘

出痘口噤不語

出痘腎腫

腎嚙有痘

陰戶有痘

痘症夾斑夾疹

痘出不透腹痛黑陷

出痘中風

雜症一齊湧出

驗痘出齊法

痘症作癢

痘中生蛆癢不可忍

痘症發熱胡言亂言

痘齊熱退愛睡

地上日夜不安

狂熱痘毒麻木致死

皮肉紅腫而痘不腫

痘症潰爛膿水淋漓

痘症泄瀉

痘症小便不通

痘症大便不通

痘症耳目口鼻出膿

痘風餘毒入目致生翳膜

或成珠目蟹眼

痘後風眼或起翳赤紅

痘風眼邊紅爛作癢

痘後兩目難開

痘後耳內腫痛時流血

痘後鼻常流涕作臭

痘後唇不蓋齒

痘後唇口生瘡

痘後齒齦或出血

痘後牙齦口舌破爛出血

或成走馬牙疳

痘後口角流涎

痘後咽喉腫痛

痘後昏迷亂語

痘後聲啞

痘後心痛不可忍

痘後肚腹腫脹

痘後浮腫

痘後蟲蝕疔瘡

痘後癰毒初起紅腫

痘毒色白

痘後遍身無皮膿水不絕

見點

痘風瘡逢春即發

孕婦痘症

發熱

引牛痘說

灌漿

墮胎

產後出痘

浴兒免痘

堅信洋痘說

經驗小兒月內出痘神方歌訣

不出天花經驗方

小兒科麻症

麻症論

麻症與傷寒辨

論麻痘輕重

麻症四忌

麻症治法

麻發不起

麻症作癢

新麻伏變症

增廣驗方新編卷十

小兒科雜治

初生去毒開口法 小兒初離母體口有液毒形如血塊啼聲一出隨即嚥下而毒伏於命門他日發為驚熱瘡疾惡痘等症須於未啼時急用絲棉裹指挖去口內濁穢以清臟腑。○又方 新產小兒飲食未開胃氣未動是混一清虛之府以甘草細切少許將潔淨細絹包裹用滾開水泡浸蓋內不宜太甜乃用軟帛裹指蘸汁偏拭口中去其穢濁隨用胡桃肉核挑去皮研極爛以希絹或薄紗包如小棗納兒口中任其吮汁吮盡方可食乳非獨和中且能養臟最佳法也。○又方 熟軍 枳壳 歸尾 生甘草各五 紅花三 桃仁三 此藥須早預備兒初生時即以水一茶鍾煎至半鍾以新棉花一塊放藥水內泡透取出裹指上納兒口中吮之再泡再吮不吮則已過片時小兒解下黑糞再與吮之以糞色不黑為止此藥必於下地六個時辰內服之服後方可食乳此方最能去毒免疾有益無損。○又方 凡小兒落地時境極攪核一枚存性研末硃砂五和勻嚼生芝麻一口津吐和藥絹包如棗核大安兒口中待吐一時頃方可與乳此約最下腸胃穢毒令兒少疾出痘亦稀少也。○又方 淡豆豉 甘草各三濃煎汁屢屢與食以酒杯為度其毒自下又能助養脾氣且免驚風。○又方 若母體氣素寒小兒清弱者及產時收生遲慢致受風寒者兒必面色皎白唇色淡紅只以淡薑湯服之最能去胃寒通神明並可免吐瀉之患此法最妙人所未知服後仍照各前方治之

保嬰各法

凡天寒孩兒生下不哭或已哭不響宜急用衣物包裹再用香油紙燃將臍帶艾火炙斷使暖氣

入腹漸漸作聲而活倘或剪斷臍帶氣絕死矣。○有悶臍生者兒臍門有一膜閉住其氣故不能出聲當以手微拍之則膜破而能哭如拍之不破須用女人之輕巧者以銀簪輕輕挑破或不能挑者急用煖衣緊抱勿令散放用藥水浸其胞衣天寒則加火熱之久則熱氣內鼓其膜自破出聲而甦。○兒生三月有於髮際中間灸者乃灸其風路也然此法因西北地土多寒故宜若東南地土多溫斷不宜灸。○兒生次日即看口中上脛有白泡點子即以銀針輕輕刮破將泡內白米取出勿令落入喉中仍以陳黑擦之如次日不取則

泡堅難破誤事又有馬牙在牙齦上白點如碎米亦須急急挑出以墨擦之聞日再看再生再挑○兒生三日相傳洗三若受風寒臍風由此而起雖夏日亦宜避風冬日尤慎之尤慎之尤慎況初生亦宜戒浴欲其勿受外邪也○兒生下時欲斷臍帶必以蘄艾一小丸用香油浸濕薰燒至焦方斷其束臍須用軟棉帕裹束勿令兒尿濕臍此預防臍風第一要法○小兒臍帶落下即用淨板刷洗將臍帶取置新瓦上用炭火四圍燒至烟將盡取出安置新瓦上用碗蓋之存性研為細末將透明硃砂研末水飛過加臍帶灰四分用硃砂二分和勻蜜糖拌塗乳婦乳頭上令兒吮食使穢氣胎毒即從大便遺下箇箇保全此延生妙法臍帶內有蟲當去之○小兒初生兩乳必有核子以散為度否則腫硬成毒啼哭不已如初生洗浴時即將兩乳揉去乳汁其核自消小兒初生每日用茶加鹽少許蘸拭其口二三次此法至穩至妙世多忽之不知兒之胎毒從粘涎中抹去可免疳腮馬牙驚口重舌木舌等症至簡至易之良方也倘兒面唇色淡以淡薑湯代茶鹽湯可也○月內小兒不可聞啼即抱一啼即乳須常令啼哭則胎中所受熱毒從此而散胎中驚氣從此而解期月之間無重舌不舌口噤胎風胎熱之病○小兒同母睡時切忌口鼻風氣吹兒顙門恐成風疾○初生小兒形骸雖具筋骨甚柔氣質未實猶之木之柔條軟梗可使或曲或直或俯或仰也故百日之內不可堅抱堅抱則易於悲驚且必頭傾項軟有天柱倒側之虞半歲前不可獨坐獨坐則風邪入背脊骨受傷有龜背偃偻之疾慎之○兒生兩月后若遇晴和天氣令乳母抱兒時見風日則血氣剛強肌肉緻密可耐風露若厚衣煖被藏於重幃密室則筋骨軟脆不任風寒多易致病所以貧兒堅勁無疾富兒柔脆多災譬諸草木初生以物蓋緊密不令見風日雨露則萎黃柔弱矣○小兒衣裳須七八十歲老人舊衣改作令小兒多毒雖富貴之家切不可新製綾羅縫裳凡受客宴賀尤戒殺生○小兒四五個月內只與吃乳六個月後方可哺稀粥週歲以前切不可吃葷腥油膩生冷兩三歲后才與葷腥切忌食肉太早食后不可與乳乳后不可與食凡哭笑之后莫即與乳○洗浴當護兒背風寒皆自背心入防成癩風故兒忌多洗浴洗浴則須掩好肚臍勿令潮濕恐生撮口臍風倘臍中有濕將大紅呢燒灰摻上紮好○小兒無病切忌服藥免致錯誤事○小兒衣服自初生至十歲不可夜露易惹邪祟又有烏名天地女一名隱飛鳥最喜陰雨夜過落羽人家庭

簪置兒衣中令兒成痼病如衣經夜露可即用醋薰之○刺頭須就暖處刺后用薄荷仁三粒去火搗爛入生麻油三四滴和勻於頭上擦之可避風邪○刺頭宜丑寅日吉丁未日凶○小兒四五歲只會叫人能言語以真赤小豆備蠶物研末酒調塗於舌下二三次即能說話

岐真人兒科秘法

山根之上有青筋直現者乃肝熱也柴胡半夏各三白芍 茯苓各一當歸 白朮各五

山查肉三甘草分水煎服

山根之上有青筋橫現者亦肝熱也但直者風上行橫者風下行亦用前方多

加柴胡分加麥芽分乾薑分

有紅筋直現者乃心熱也亦用前方加黃連分麥冬分桑白皮分天花粉分

去半夏不用 有紅筋斜現者亦心熱也亦用前方加黃連分去半夏不用蓋熱極於胞中也或加桑白皮

花粉 有黃筋現於山根或皮色黃者不論橫直總皆脾胃之症或水瀉或上吐或下瀉或腹痛或不思

飲食令定一方皆可服之無不神效

白朮 茯苓各五陳皮 黨參 麥芽各二神曲 甘草各一水一

鍾煎半酒鍾分二次服有痰加半夏分或白芥子分或花粉分有熱若口渴者加麥冬分黃芩分有寒加乾薑分

如吐者加白豈粒瀉者加豬苓分腹痛如小兒自家捧腹是須用手按之大叫呼痛者乃食積也加大黃

三枳實分如按之不痛不呼號者乃寒也再加乾姜分如身發熱者此方不可用

夏禹鑄審小兒顏色苗竅法

內有五臟心脾肝腎也五臟不可望惟望五臟之苗與竅 舌乃心之苗紅

紫心熱也腫黑心火極也淡白虛也

鼻準與牙床乃脾之竅鼻紅燥脾熱也慘黃脾敗也牙床紅腫熱也破

爛胃火也唇乃脾之竅紅紫熱也淡白虛也黑者脾將絕也口右扯肝風也左扯脾之疾也 鼻孔肺之竅

乾燥熱也流清涕寒也

耳與牙乃腎之竅耳鳴氣不和也耳流膿腎熱也齒如黃豆腎氣絕也 目乃肝

之竅直視而睛轉者風也直視而睛不轉者肝氣將絕也以目分言之又屬五臟之竅黑珠屬肝純見黃色

凶證也白珠屬肺色青肝風傷肺也淡黃色脾有積滯也老黃色乃肺受濕也瞳人屬腎無光彩又兼髮黃

腎氣虛也 目外角屬大腸破爛肺有風也

目內角屬小腸破爛有心熱也 上胞屬脾腫則脾傷也下

胞屬胃青色胃有風也睡而露睛者脾有熱也

小便短黃澀痛心熱也清長而利心虛也 唇紅而吐胃

熱也唇慘白而吐胃虛也唇色平常而吐作傷胃論 大腸閉結肺有火也肺先熱而使秘血枯也不可攻

下脫肛肺虛也 口苦膽火也 聞聲作驚肝虛也 又面有五色面紅病在心有熱 面青病在肝多腹痛 面黃病在脾脾傷 面白病在肺中寒 面黑病在腎黑而先潤色腎氣敗也望其色若異於平日而苗竅之色與面色不相符則臟腑虛實先有不驗者矣

兒科外治法

疎表法

小兒發熱不拘風寒飲食時行痘疹以蔥一握搗爛取汁少加麻油在內和勻指蘸

蔥油摩運兒之心口頭頂背脊諸處每處摩擦十數下運完以厚衣裹之蒙其頭略疎微汗但不可令其大汗此法最能疎通腠理宣行經絡使邪氣外出不致久羈榮衛而又不傷正氣誠良法也 清裡法 小兒

發熱二三日邪已入裏或乳食停滯內成鬱熱其候五心煩熱睡卧不安口渴多啼胸滿氣急面赤唇焦大

小便秘此為內熱以雞蛋一枚去黃取清以碗盛之入麻油約與蛋清等再加雄黃細末攪勻復以婦女

頭髮一團蘸染蛋清於小兒胃口拍之寒天以火烘暖不可冷用自胸中推至臍口只須推半時之久仍以

頭髮敷于胃口以布紮之一炷香久取下一切諸熱皆能退去蓋蛋清能滋陰退熱麻油雄黃又能拔毒涼

肌故也此身有熱者用之倘身無熱惟啼哭焦煩神志不安者不用蛋清專以麻油雄黃亂髮推之仍敷

胃口即時安卧屢試屢驗 解煩法 凡小兒寔熱之症及麻痘毒甚熱甚者其候面赤口渴五心煩熱啼

哭焦擾身熱如火上氣喘急揚手擲足一時藥不能及用水粉一兩以雞蛋清調勻略稀塗兒胃口及兩手

心復以釀酒小麴十數枚研爛熱酒和作二餅貼兩足心用布紮之少頃其熱散于四肢心內清涼不復啼

擾或用雞蛋清調菜豆粉貼足心亦佳 開閉法 凡小兒風痰閉塞昏沈不醒約不能入甚至用艾火灸

之亦不知痛者蓋因痰塞其脾之大絡截其陰陽升散之隧道也原非死症用生薑蒲生艾葉生薑蔥各一

握共搗如泥以麻油好醋同煎四味炒熱布包之從頭項背胸四肢乘熱往下熨之其痰亦豁然而醒此方

不特治小兒凡閉症皆效 引痰法 凡小兒痰嗽上氣喘急有升無降喉中牽鋸之聲須引而下行用生

礬一兩研末少入面粉拌勻蓋生礬見醋即化成水入麵粉取其膠粘故也好醋和作二小餅貼兩足心布

包之一宿其痰自下 通脈法 凡小兒忽尔手足厥冷此由表邪閉其經絡或風氣阻其營衛又或大病

后陽不布和散于四肢連用生薑煨熟搗汁半小杯略入麻油調勻以指蘸姜油塗兒手足往下搓挪以通

其經絡候熱回以指拭去 煖痰法 凡小兒胸有寒痰不時昏絕醒則吐出如菜豆粉濃厚而帶青色此寒極之疾前法皆不能化惟有生附子一枚生姜兩同搗極爛炒熟一包熨背心及胸前熨完將姜附捻成一餅貼于胃口良久其痰自下 納氣法 凡小兒虛脫大症上氣喘急真氣浮散不得歸元諸藥莫效用吳茱萸酒和作餅封肚臍以帶紫之其氣自順 定痛法 凡小兒胸中飽悶臍腹疼痛一時不得用藥將食鹽一碗鍋內炒極熱布包之向胸腹從上熨下蓋鹽走血分最能軟堅取以止痛冷則又炒又熨痛定乃止此方男婦氣痛皆可治

指紋切要 小兒自彌月而至於三歲猶未可以診切非無脈可診蓋診之難而虛實不易定也小兒每法生人初見无不啼叫呼吸先亂神志倉忙而遲數大小已失本來之象矣診之何益不若以指紋之可見者與面色病狀相印證此亦醫中望切兩兼之意也

指紋三關圖



少商手太陰終此

手太陰旁枝至此交通
商陽手陽明經起此

令人抱兒對立於向光之處以左手握兒食指以我右手拇指推兒三關察其形色細心體認亦惟辨其表裏寒熱虛實足矣世人好異不從是地用功以此為淺近之談不屑留意不知臨症能辨此六者便為至高之手蓋表裡清則知病之在經在府而汗下無誤寒熱明則知用寒近熱用熱近寒或寒因寒用熱因熱用因事制宜用無不當虛實是辨則知太虛有盛候太實有羸狀不為假證眩惑凡真虛真實是易知假虛假實難明真假既明則无虛虛實是定之患於此切要關頭不知體會但以不經之言欺世誑俗謂何者為人驚何者為畜驚不特欺人而且自欺不特无益治療而且誤人生命是誰之咎哉

三關部位歌

三關部位歌
三關部位歌
三關部位歌

初起風關證未央氣關紋現急須防乍臨命位誠危急射甲通關

上海錦章書局石印

病勢彰現風開為病邪初入之象證尚輕微體亦未固治之誠易故現氣開邪氣正感病已沉重治之高而不能降為亢龍有悔之象治之者切宜留心慎勿輕視

浮沉分表裡歌 指紋何故乍然浮邪在皮膚未足愁膝理不通名表證急行疎解汗之投此紋與太淵脉相

連珠散磨其皮毛聞其膝理使邪隨微汗而解一刺成功何嫌而不投哉忽爾關紋漸漸沉已知入裏病

方深莫將風約輕相試須向陽明裏症尋指紋見沉知邪入肌解肌若外證壯熱不已指紋極沉已入于陽明胃

非其治也不特病邪不解通足以燔其陰血愈增其困者矣

紅紫辨寒熱歌 身安定見紅黃色紅豔多從寒裡得淡紅隱隱本虛寒莫待深紅化為熱神氣泰然營衛靜

蓋黃為中和之氣紅乃文明之色紅黃隱隱景物然馬有不安之理寒邪初入皮毛經絡乍滯所以紅見

紅鮮由血滯也無論內寒外寒初病久病一見此紋抵皆寒證凡寒人閉皮毛之腰理不通漸入身內之氣時

紅虛寒之應至謂涼紅一息之暫停令寒閉汗孔內出之氣無所洩鬱于皮毛之腰理不通漸入身內之氣時

與皮毛之氣相通實無一息之暫停令寒閉汗孔內出之氣無所洩鬱于皮毛之腰理不通漸入身內之氣時

內出之氣為熱非外關紋見紫熱之徵青色為風古所稱傷食紫青痰氣逆三關青黑禍難勝行脈中

受之寒能變熱也關紋見紫熱之徵青色為風古所稱傷食紫青痰氣逆三關青黑禍難勝行脈中

風壅經絡者其陰營之道所以紋紫上為熱熾千古定評也少陽甲木其色本青肝受邪熱必現紫色而兼青傷

風侯也夫者其陰營之道所以紋紫上為熱熾千古定評也少陽甲木其色本青肝受邪熱必現紫色而兼青傷

食之侯蓋飲食有形之物阻抑中焦壅滯脾氣不運禁衛愈見瀉則風痰食熱固結中焦所以青而兼黑此抑鬱之

滯令其流瀉可也倘鬱熱久脾氣愈不運禁衛愈見瀉則風痰食熱固結中焦所以青而兼黑此抑鬱之

至也急宜攻下庶有生机指紋淡淡亦堪驚總為先天稟賦輕脾胃本虛中氣弱切防攻伐損胎嬰小兒

誤認驚風百死一生也指紋四時皆變雖有病亦只淺紅淺青淺紫而已蓋淺紅虛寒淺青虛熱淺紫

陽虛肌膚見白唇舌淡紫者指紋四時皆變雖有病亦只淺紅淺青淺紫而已蓋淺紅虛寒淺青虛熱淺紫

虛熱此等之兒根本不堅中氣怯弱新病久病提歸于虛一毫攻伐不敗輕用傷損衛氣運化難

晚矣關紋瀉滯其因由邪遏陰營衛氣留食熱常焦風熱熾不行推滂更何求并降邪留所以指紋推之

轉滯全元活發流利之象由食飲風熱相搏是為寔證急宜推

腸去其莖並其愈亦易若三關紋黑推之不動死證也不治

紋形主病歌 腹痛紋入掌中心彎內風寒次第侵紋向外彎痰食熱水形脾肺兩傷陰掌心包絡所主紋入

氣寒也故為腹痛紅若彎弓內外有別其紋之兩頭彎向中指為內傷陰證為外感風寒治之猶易其紋

向大指為外傷逆証有內傷飲食治之稍難形如兩頭彎向中指為內傷陰證為外感風寒治之猶易其紋

指紋惟止一線安能有水字脈有左右安知紋之左右但能觸類旁通凡往非理豈特指紋為然凡看指紋

石確石豈非水字之形乎脈有左右安知紋之左右但能觸類旁通凡往非理豈特指紋為然凡看指紋

以我之大拇指側面推兒食指三關切不可覆指而推蓋螺紋有火剋肺肺金紋必變色有只可從命關推

上風關切不可從風關推出命關此紋愈推愈出其紋在先原未透關今誤推而出之大損肺氣慎之戒之

上風關切不可從風關推出命關此紋愈推愈出其紋在先原未透關今誤推而出之大損肺氣慎之戒之

上風關切不可從風關推出命關此紋愈推愈出其紋在先原未透關今誤推而出之大損肺氣慎之戒之

上風關切不可從風關推出命關此紋愈推愈出其紋在先原未透關今誤推而出之大損肺氣慎之戒之

上風關切不可從風關推出命關此紋愈推愈出其紋在先原未透關今誤推而出之大損肺氣慎之戒之

上風關切不可從風關推出命關此紋愈推愈出其紋在先原未透關今誤推而出之大損肺氣慎之戒之

上風關切不可從風關推出命關此紋愈推愈出其紋在先原未透關今誤推而出之大損肺氣慎之戒之

上風關切不可從風關推出命關此紋愈推愈出其紋在先原未透關今誤推而出之大損肺氣慎之戒之

上風關切不可從風關推出命關此紋愈推愈出其紋在先原未透關今誤推而出之大損肺氣慎之戒之

以上表裡寒熱虛實鑿有據但能於臨症時認得此六字分明胸中自有主宰雖不中不遠矣

稀痘並免驚風

小兒初生三日內用雞蛋一個打放盤中務于無風之處以手指蘸蛋清自腦后風門骨

即風門骨至尾間骨即尾間處

男左旋女右旋按背脊骨逐節輕揉週而後始下頸由有黑毛出如髮

愈揉愈出務令揉盡終身可免出痘即出亦少且免驚風六日九日再揉並揉前心手足心兩肩并穴

處即是有窩

又稀痘法

孕婦懷胎時用白生芝麻多不拘置來往處隨便撮食之及十月滿足生下子女不

受胎毒出痘甚稀

又方

銀花用全者不飯鍋粳每花一升入共研末用洋糖或做糕餅或開水調和每日令

小兒食之

又方

用橄欖一味不拘新陳愈陳愈妙按一年二十四節將橄欖於火上焙乾研末以清滾

水送下每節橄欖一個不可間斷服之一年小兒永不出痘如逢節偶忘須於下年照所忘之節補食一個

又方

冬時長在于屋內出入行走之地掘一坑約深尺許將新生雞蛋十五個埋于坑中兩頭各用磚

一撮煮雞蛋一個令兒食之

不可嫌腥以清水洗去也若不信但流一手或一足不洗過出痘時則味洗處偏多

小兒初生面紅啼哭不止

此熱極也宜急治之如過三日難治用

枳壳 梔子炒 扁柏葉炒 川連各三黃

柏仁生甘草

分薄荷分四水煎去渣入蜜糖四茶匙和勻以鴨毛點舌上下兩旁數次面色變淡紅色者止或

用吳茱萸

錢四好醋調敷兩足心日換數次過一夜即愈此法最妙

晝啼不止

台烏約一錢煎水服神效

夜啼不止

多因穿蓋過煖加以父母同床熱極所致諺云若要小兒安常帶三分飢與寒取雞糞塗臍中

用男用雞糞極妙

又方 硃砂磨新汲水塗心窩及兩手足心五處最驗

以薄荷二三分煎水調服立止如神如若不信將上生薑為末與服復啼如初矣

又方 雞窩中草安席下

勿令母知或用乾牛糞亦可若諸方不效仍復夜啼看面色青白手冷者用

川芎 當歸 茯苓 茯神

白芍 甘草 木香 鉤藤

紅棗引煎服面赤唇紅身熱者生地黃芩甘草木通燈芯竹葉引煎服或

用前吳茱萸數足最妙面赤唇口紅者方可用

又方 面赤心熱也青黛燈芯對煎服

又方

燈花五

上海醫學書局印

朵研末塗娘乳上令小兒吃乳○又方 五梧子研末口水和作餅納肚臍內以帶繫之效○又方 灶心

土錢砂分麝香麝香釐蜜水調每服分五○又方 硃砂寫于午二字貼肚臍上即止○又方 畫野子一個倒

貼在小兒床頭壁上自愈○又方 用本兒初穿汗衣放瓶內自不哭矣○又方 用其父母指甲一釐燒

灰綠蔥頭一錢煎水飲效○又方 用本家撥火棍或燒殘柴火頭一個削平焦處如無即取柴棍撥火數

日用之亦可用硃砂向上寫云撥火棍撥火杖天上五雷公差來作神將捉住夜啼鬼打殺不要放急急如

律令勅寫畢勿令人知安立床前脚下男左女右此黃澹翁所神也○又方 烏藥研末煎服亦效○又方

明鏡掛床脚下自止○又方 硃砂新汲水磨之塗心口及兩手足心最驗

曲腰啼哭 此受寒腹痛也 淡豆豉 生姜 葱白切鹽共炒熟以手巾包熨肚上立止

遍身奇癢 吐啼不止 生姜搗爛稀布包擦甚效

初生遍身發黃 此胎中濕熱也名胎黃用 生地 花粉 茵陳各一錢煎服或用卷十五黃疸門黃蠟紙

筒方治之穩而且妙

初生遍身紅赤 此胎中熱毒也名胎赤用 生地 花粉 甘草 連翹銼一水煎服外用浮萍水苦搗爛

絞汁調朴硝諸石敷之

初生無皮 小兒初生週身赤肉無皮如懷胎在樓上居住不受地氣者將兒安于泥地上卧一宿即長皮矣

○又方 早稻米磨粉乾扑之候生皮乃止

週身脫皮 此症因生時觸風滿身皮膚落下一層又一層名曰脫壳若作丹毒赤疹治之則誤矣宜用木通

藿香 黃芩各六麥冬一錢加灯草煎服

兩腿生瘡脫皮 兩大腿近小腹處生瘡皮脫開漸延小腹則不救此名胎剝宜用黃柏炙焦研末和猪胆汁

敷或用伏龍肝研末口水調敷亦可

身如蛇皮鱗甲 名胎垢又名蛇胎胎用白殭蚕研末為末煎湯洗之或加蛇脫研末和入亦可

初生身如魚泡如水晶 此症破則水流用蜜陀僧為末搽之

瘡似楊梅破爛有孔

凡小兒或頭面遍身形似楊梅瘡破爛有孔用飯飯上滴下氣水以蠶盛取搽之百為

不效者用此如神

紅絲瘡

一人生子一歲生紅絲瘡而死連生四子皆然一醫云此胃中有伏火胎毒故也遂令男服滋腎丸

見內外傷用方

女服六味地黃丸同後生子皆無此患

頭門腫大

黃柏末水調貼兩足心即愈

頭縫不合

名曰解顱此腎氣不足也用乾姜錢細辛肉桂錢共為末姜汁和敷顱上小兒面赤即愈○又

方

南星錢醋調攤舊絨上貼顱門用熱手時時熨之乾則用熱醋潤濕○又方 柏子仁 防風 南

星各四

為末每用一錢醋調攤紅絨上看顱門大小剪貼一日一換乾則以熱醋潤之○又方茵陳 車

前子

百合錢五為末烏牛乳汁調塗足心及頭縫開處用絨包裹二日一換

初生眼目紅赤腫爛

此胎中受熱也以蚯蚓泥又名搗敷顱門乾則再換不過三次即愈或以生南星生大

黃等分為末用醋調塗兩足心亦愈○又方 甘草猪胆汁泡過焙乾研末每用一二分乳汁服○又方

熊胆少許蒸水洗眼上一日七次如三日不開宜服 乾地黃 赤芍 川芎 炙草 歸身 花粉各一

為末灯芯湯調灌之○又方 雄雞胆灯芯蘸點極效或用人乳蒸川連點之亦效○又方 胡黃連錢研

人乳末調敷足心男左女右神效○又方 黃連 黃柏 當歸 赤芍錢二杏仁五分打碎以乳汁泡一夜

蒸熟取濃汁點眼內

小兒闔眼

黑眼珠呆而不動者是方見目部

小兒變蒸

自生下之日起三十二日為一變六十四日為一蒸再過三十二日為一變再過六十四日為一

蒸至五百七十六日而止每當蒸變之日身發微熱不必服藥

兩腮腫硬

新產月內小兒有噤口不乳啼聲難出兩腮腫硬有核名螻蛄子又曰炸腮熟諸穩婆將利及於

口內兩腮割開挖出堅光惡肉形狀頗肖桑螵蛸傷處搽藥自愈若割治少遲時刻則腫延喉鼻不可救矣

多有割傷致命者終非良法今得一方用

麝香錢

砂

五錢蜈蚣同搗如泥敷顱門上俟乾時自落切勿

剝去若重者將針微刺患處出血以好陳墨搽之自愈或唐雞糞塗之更妙切勿妄用刀割致傷兒命後有芙蓉花諸方最為神妙○又方 蚰蜒一條要便知銀硃半錢同研爛搽腫硬處勿令擦去即消○又方

桑葉灰少許入雄雞冠血二三滴再加鹽酒一匙和勻時時搽之亦效○又方 青橄欖核以名青果如兒去味亦可好醋磨汁搽之○又方 紅飯豆編小粒是七粒研末好醋調敷效

口角生瘡 亂髮燒灰豬油調搽

口流涎水 方見口部

口腫並生馬牙 小兒口中腫起如菌名馬牙方齲生白泡子為牙疳致兒不能喫乳以指摘去其頭倘有血出以綿拭去輕者京墨搽之即愈重者急以殭蚕絲去人中白冰片分共研細搽患處略停片刻用絹蘸茶洗淨再搽一日三四次自愈如未愈方中加礪砂血竭青黛各三分兒搽分半藥珠一分各為細末和入前藥每日洗擦三四次無不愈者或用馬齒莧根瓦上焙乾少加雄黃研末吹之並用后芙蓉花諸方更妙

口生白點 初生百日口中口內白點不計其數拭之則去少刻復有滿口纏遍內竄入喉日夜啼哭不乳俗名雪口又名鵞口疳用甘草黃連等分煎湯以絢裏指拭去取桑皮白汁塗之立愈或用陳墨點之亦可再以辰砂益元散調備用燈心湯調下則不再發○又方 栴檀燒枯研末點之立見功效並用后芙蓉花諸方更妙

更妙 初生小兒或兩腮腫硬或口內生瘡或生馬牙或重舌木舌蛇舌吐舌及口不開不食乳等症芙蓉花或葉或根均可用搗及融爛用雞蛋二個和勻煎熟候冷敷心口肚臍用布紮緊屢試如神○又方 生香附

生半夏各二錢研末生雞蛋白調作餅貼兩足心一週時即愈此林屋山人引熱下行經驗方也或用吳茱萸黃四錢好醋調敷兩足心亦效如口舌破爛者用活鯽魚以尾入口中頻頻搖擺隨擺隨換此方能去口中

熱毒初用時兒尚啼哭用一二次後口內生涼兒自不啼尾雖有刺甚軟並不傷人治后即能食乳不過三日全愈屢試甚驗真奇方也要用活魚方效仍用前方數足為要

重舌 舌根肉壅腫出短小如舌者是用黃柏和竹瀝泡一夜取汁點之○又方 巴豆餅飯四五粒共搗

木舌

舌失腫大塞滿口中直硬如木不能轉動者是用葶蔴子搗爛以紙取油將紙搓條點火吹滅以烟向

舌薰之即消若舌下腫起用銀針挑破出血以鍋墨烟以草燒和鹽醋厚調敷之脫去再敷或用水調敷亦

可○又方 蒲黃研末時敷舌上其腫自消○又方 煙燄為末吹入吐痰甚效並用前芙蓉花諸方更妙

舌忽脹大腫硬即時氣絕 名曰暴舌用見礬不拘多少新瓦上火煨紅色為度放地上候冷研細擦舌上立

效兼治重舌木舌○又方 頂上梅花冰片研爛敷或以食鹽百草霜共為末并水調敷即效○又方 百

草霜酒調塗舌上即消○又方 乾姜蒲黃各等分為末乾擦患處並用前芙蓉花諸方更妙

蛇舌用前芙蓉花諸方更妙

其舌常捲兩邊口角者是用明雄研末點舌數次即安或用灯芯泡水服重則用川連分茶

水服即愈

吐舌 人中白冰片和勻鷺毛刷上再用好川連一二分煎服舌自收入 冰片 雄黃 礞砂共為末乳調

塗舌上亦效

頸軟 乃肝腎虛風襲入用生附子法皮生南星錢二為末姜汁調攤貼天柱骨上

痰喘有聲 胡桃似名連皮搗爛麥芽煎水加冰糖冲服喘止痰消此觀音夢授方也或照前引痰法治之更

妙○又方 巴豆輕搗爛綿裏塞鼻男左女右痰即自下立愈

喉嘶聲啞 甘草 薄荷各五桔梗 麥冬錢一水煎服之愈○又方 蝦蟆胆取汁點舌上立愈

小兒病后口不能言 大生南星一個炮法為末每用二三分或四五分小兒大取猪胆汁調濕再用熟淡姜

湯冲服即能言矣

兒不食乳 乃心熱也用大蔥頭個一切四片用乳汁半盞同蒸分作四服即能食乳並用前芙蓉花諸方治之

更妙○又方 黃連分煎湯灌小兒數匙即食乳矣神效若臍旁青色反口撮緊者此臍風症也即照后臍方

緊治之速

則難救

吐乳 米粒水半酒半煎至五分服極效

缺乳 凡小兒無乳百物不食無法可施用離核棗於飯上蒸熟與兒食之食至飽飽即思飲食雖無乳亦可

曾資發方所編正集 卷十 小兒科雜治 上海錦章書局石印

活矣離核裏即真南裏持三五枚向耳邊搖之响者即是無則用大黑棗亦可

斷乳 山梔存一個雄黃 硃砂各二輕粉分麝香共為極細末擇伏斷日見后候兒睡者用麻油將藥調

勻搽兩眉毛上醒來便不食乳如不效再加黃丹五再擦必效神驗非常都肝氣聽其自落勿令小兒知

忌見生人夏天不宜並忌逢五逢七日方名畫眉丹 伏斷日 子日丑日日寅日日辰日日巳

日房午日日未日日申日日酉日日戌日日亥日日子日日丑日日寅日日辰日日巳

龜胸 大黃酒洗附子白皮 甜葶藶 熟石膏各八分 天冬 杏仁去皮 木通各一分 水煎服或用蜜為

丸服更妙

龜背並治 用龜尿摩其胸背久久自愈取龜尿法以鏡對龜照之即有尿出○又方 龜尿調首烏末敷背

上日久自愈

腹痛 小兒忽然腹痛其症不同有挾熱而痛者其痛多緩或一日只痛數次甚者或自下而痛上痛過一陣

則有時不痛良久又痛宜用涼藥加疎利藥治之有感寒挾食而痛者其痛多急連綿少有停止甚者或如

刀割欲吐不吐欲瀉不瀉手足冷面色青宜用升發藥加消導藥急治之外有虫痛者聞煎炙食物香氣則

痛宜用苦楝皮使君肉等藥以殺其虫則痛自止查虫疾問斟酌治之 枳連導滯湯 治熱痛 陳枳壳

羌活黃連 山梔仁炒 赤芍 前胡 連翹各四分 三稜 莪朮醋 檳榔 甘草各三 水煎服

熟其大便秘者加酒炒大黃一錢二分微利之三稜莪朮不用亦可 升消平胃散 治感寒挾食痛 小

川芎 炒香附 蒼朮 紫蘇 姜汁 炒過厚朴各五 藿香 砂仁白芷 陳皮法拍 各炙草分炒

芽六 山香肉錢 加羌活 防風各三 生姜片 水煎服

肚腹脹大亮如水晶 方見肚腹部

肚皮忽然青黑 方與上同

腹中鳴如蛙聲 淡豆豉 生薑各二錢 葱五 鹽同 炒熟置臍上熨之效○又方 葱薑煎濃湯洗肚