

活人慈航



六十二



氣虛有寒可加肉桂附子潰後作泄可加粟穀柯子肉食
少咳嗽可加吉梗麥冬五味子渴者加乾葛傷食者加麥

茅山查酒餅

托裏定痛湯

四物湯內加肉桂乳香沒藥粟殼

聖愈湯

四物湯內加人參黃芪

地骨皮飲

四物湯內加丹皮地骨皮

柴胡四物湯

四物湯內加柴胡人參黃芩半夏炙甘草

知柏四物湯

四物湯內加知母黃柏

三黃四物湯

四物湯內加黃連黃芩黃柏

桂附四物湯

四物湯內加肉桂附子

托裏定痛湯血虛疼痛者宜之聖愈湯潰後內熱心煩氣

少者宜之柴胡四物潰後寒熱者宜之地骨皮飲潰後身

但熱者宜之知柏四物潰後五臟陰火骨蒸者宜之三黃



四物潰後陽火煩熱者宜之桂附四物瘡口不飲色赤紫暗者宜之

人參黃芪湯

黃芪

人參

白朮

麥冬

黃柏

當歸

蒼朮

甘草

陳皮

升麻

神麴

五味

托裏清中湯

人參

白朮

桔梗

陳皮

半夏

茯苓

麥冬

五味

甘草

姜朮

托溫中湯

白朮

茯苓

木香

丁香

半夏

甘草

陳皮

羌活

益智

乾姜

人參

白朮

附子

透膿湯

托裏透膿湯

見下頭部

托裏排膿湯

見下頭部

托裏消毒飲

補中益氣湯

治瘡瘍四肢倦怠口乾時熱飲食無味脉洪



大無方心煩氣怯者宜之

人參 黃芪 白朮 當歸 炙甘 柴胡 升麻

陳皮 姜朮

溫胃飲 治潰後呃逆脘痛嘔吐清水

人參 白朮 乾姜 炙甘 丁香 沉香

柿蒂 吳茱萸 附子 各一 姜朮

桂皮竹茹湯 治傷胃虛火逆時時打呃身熱煩渴口乾脣

焦 枳殼 竹茹 生薑 柿蒂 人參 黃連 各一

胃愛丸 治潰瘍脾胃虛弱諸味不喜飲食不進

人參 淮山 蓮肉 白蔻仁 紫蘇 蜜研燕

陳皮 白朮 茯苓 炙甘 砂仁

右為末用酒餅打糊為丸菴豆大每服七八十丸

加味地黃丸 治癰疽已潰虛火上炎口乾作渴咽喉痛等



南京中醫藥大學圖書館版權所有

症

熟地 干八兩 淮山 四兩 桑皮 四兩 茯苓 三兩 澤瀉 生三兩

丹皮 三兩 肉桂 五兩 五味子 一兩半 右為末蜜丸

久漏瘡

丹溪云漏瘡須先服補藥以生氣血即參芪歸朮川芎

大劑服之外以附子末唾和作餅如錢厚灸之令微焦

不可令痛乾則易之乾者再研為末再和再灸如困則止

次日再灸宜至肉平為效灸後以膏貼之或用補氣血藥

作膏貼之尤效

一名醫曰瘡一月不治則有虫虫能蠕動氣血亦隨之故瘡

漏不可遷合則結毒實虫所為又曰人每有疾經月不痊

則必虛癯婦人則補脾血小兒則防驚丹二廣則并治瘡

癰



梅師云或發不變色或堅硬如石或捻之不痛久則然後變色疼痛漸軟而成膿如泄而稀久不能瘡瘡口不合變為疳漏敗壞肌肉侵損骨髓以致痿痺宜骨碎補丸主之

骨碎補丸

骨碎補

補骨脂

熟地黃

當歸

續斷

石楠葉

黃芪

石斛

淮夕肉

杜仲

萸薢各二兩

附子二兩

白芍

龜絲

川芎

沙參

羌活

防風

獨活

天麻各二兩

右為末蜜九空心鹽湯下

頭部

百會疽生在巔頂正中屬督脉經百會穴由膏梁太過火毒

凝結而成初起形如粟米漸腫根大如錢甚則形似葡萄

堅硬如鐵高尖紅腫微熱疼痛瘡根收束憎寒發熱大渴



隨飲隨乾口苦唇焦便閉煩躁脉見洪數者此氣實宜黃
 連消毒飲以清毒火外敷冲和膏若漫腫平塌紫暗堅硬
 作痛根散惡寒便瀉脉見細數者此屬陽虛宜十全大補
 湯以溫補之外敷玉龍膏若面赤過頻口乾不渴唇燥者
 此陽虛浮泛宜桂附地黄丸引火歸原初起貼琥珀膏
 潰滲黃靈藥貼膏藥腐肉已盡用生肌之藥若腫連耳項
 痰如投鋸七日無膿不潰神昏者死

黃連消毒飲

蘇木二分	甘草一分	陳皮二分	桔梗五分	黃芩五分
黃柏一分	蒿本一分	防杞五分	防風一分	知母四分
羌活二分	獨活四分	連喬四分	黃連一分	生地四分
黃芪二分	澤瀉二分	歸尾四分	水煎食遠服	

琥珀膏

水粉兩

頭髮分

輕粉四

銀硃京

花椒五粒

黃蠟屑

琥珀五分另末

麻油三兩

將頭髮花椒麻油煤焦去渣下鍋焙化傾入磁盞內下四味攪冷勻綿蘸脂攤貼

透腦疽生於百會穴之前顙門之際亦由督脉經火毒而成初如粟米漸如雞子堅硬疼痛瘡頂塌陷根腳漫腫色暗者虛色紅腫頂尖硬膿稠者實速潰者順遲潰透腦髓者逆治法按百會疽

侵腦疽生於透腦疽側下由太陽經滯火而成穴名五處紅

腫高起嫩熱疼痛膿色如蒼蠟者順而易治紫陷無膿腳散大逆而難治初起荆防敗毒散汗之次服黃連湯下之將潰服托裏透膿湯已潰服托裏排膿湯外貼琥珀膏敷

中和膏



南京中醫藥大學圖書館版權所有

托裏透膿湯

人參 白朮 山甲 白芷 各五分 升麻 甘草 各五分

當歸 生芪 各五分 角刺 犀角 青皮 各五分 和酒服

托裏排膿湯

當歸 白芍 人參 白朮 各五分 茯苓 連翹 各五分

貝母 生芪 陳皮 各五分 金銀花 各五分 肉桂 各五分 白芷 各五分

甘草 各五分 各加引經藥

佛頂疽生於頭頂顙門之前脊脉經上星穴由臟腑陰陽不調熱毒上壅而成色紫堅硬腫痛脉洪大而數者為實脉微細而數者為虛皆為險症若潰爛黑陷六脉散大神昏謬語二便閉結者為逆治法按百會疽

顙疽生前額正中者屬督脉經或生左右額角者屬足太陽經總由火毒而成初起瘡頂塌陷乾焦紫黑不生大膿者



陰紅腫高聳瘡根收束者順初服敗毒散汗之次服活命飲消之將潰氣虛者服托裏透膿湯氣實服透膿散外敷冲和膏已潰服托裏排膿湯外貼琥珀膏

勇疽生於目小眚之後五分屬足少陽經太陽穴左右同由怒火而成初起如粟漸腫疼痛形如伏鼠面目浮腫七日信膿不潰火毒攻睛腐爛損目若十一日針出黃膿毒從膿解為順若出紫黑血者氣虛不能化毒為逆初服活命飲毒甚宜黃連湯下之外敷拔毒散

鬚疽生於鬚角屬手足少陽經由於相火妄動外受風熱更因性情急怒慾火內炎而成此二經俱屬氣多血少最難腐潰更兼肌肉薄處不宜針灸候其自潰潰後膿血不宜多見膿多者過耗血液難愈初起宜柴胡清肝湯解之膿成者宜托裏消毒散外敷拔毒散

柴胡清肝湯

柴胡不平

生地不平

當歸示

川芎不平

連翹示

牛子不平

黃芩示

梔子示

花粉示

甘草示

防風示

丹皮示

左為天疽右為銳毒俱生耳後一寸三分高骨之後天者不盡天年謂之天銳者如鋒刃之銳利言毒甚也二症愈者甚少初起如粟粒漸腫如瓜堅硬平塌紫暗不澤較諸瘡疼痛倍增左右耳後俱屬足少陽經由謀慮不決鬱火凝結而成此處皮肉澆薄氣多血少終為險症急當治之遲則熱氣下淵腹前傷任脉內薰肝肺惡症悉添必致不救若紅腫速潰者順堅硬黑陷者逆初服柴胡清肝湯膿將成宜托裏消毒散虛者十全大補湯外敷鐵柅散或生遠志為末調酒敷止痛消毒



耳後疽生耳摺之間屬手少陽經風毒兼怒火上炎而成初起如粟漸增腫痛如杏如桃若紅腫有頭焮熱易潰膿稠者順若黑陷堅硬疼痛引腦甚則頂頰肩肘俱痛不熱潰遲紫黑血者逆治法同天疽又有初起失於托裏則毒不能外發遂攻耳竅膿從耳竅出者名為內潰屬虛多服十全大補湯大抵少年患此其愈最緩老年患此易於成漏耳發生耳後屬少陽經風熱相搏而成初如椒粒漸腫若蜂房將腐亦多眼孔焮赤疼痛腫連耳輪蓋發者乃癰症之毒甚者也不可待其自潰恐潰遲膿通耳竅當在十一日後剪破瘡頂出黃白膿者順出紫血者逆初服活命飲外敷拔毒散

耳根毒生耳後初起形如痰核漸增腫勢狀如伏鼠焮赤疼痛由三焦風火胆經怒氣上冲凝結而成但暴腫潰速根淺

易愈非若癰疽之勢大毒甚也初寒熱往來宜敗毒散汗之發熱痛甚活命飲消之膿成者服透膿散虛者托裏透膿湯潰後外撒紅靈藥貼膏藥若虛者膿水清稀瘡口不斂遲即服香貝養榮湯補之自斂

玉枕疽由腎脉經積熱外受風邪凝結而成生在玉枕骨尖微上腦戶穴初起如粟麻癢相兼寒熱往來口渴便閉漸增堅硬大者如茄小如鵝卵紅活高腫潰出稠膿者吉紫暗塌陷潰出血水者逆初俱服神效衛生湯消之虛者托裏消毒散外敷冲和膏

腦後發屬腎脉經枕骨之下風府穴由積熱外受風邪凝結而成初如粟狀腫作痛引頭頂肩項氣粗鼻塞漸太如盤紅活速潰出稠膿者吉紫暗難潰時津血水者逆治法按玉枕疽

腦鑠生腎脉經風府穴由陰精枯涸毒火乘之而成

椒粒堅硬紫暗漸腫如橫木甚則上至顛頂下至大椎如灶烟硬若牛脣未膿皮先腐爛時流清水肌肉冰冷者木痛重者全不知痛宜桑柴火烘或艾蒜灸以痛為度速服活命飲七日之後不發長不生大膿者宜十全大補湯救之若初起熱如火燎刺痛屬陽症宜黃連消毒飲外敷鐵柅散首尾見五善者順見七惡者逆

顱瘍顱疽二症生顱骨尖處屬手太陽經不論左右初小漸大如榴發陽分者由風熱而生焮紅浮腫疼痛七日即潰名顱瘍毒淺發陰分者由積熱而生色紫漫腫堅硬麻木疼痛三七方潰名顱疽毒甚瘍症宜活命飲疽症宜黃連湯下之或蟾蜍丸汗之

顱疔生顱骨之間屬足陽明經不論左右初如粟黃色小泡

頭部



次如赤豆頂四堅硬按似疔頭麻癢疼痛因過食炙煇藥酒以致胃經積火成毒初服蟾蘇丸次服黃連消毒散外治同疔門凡疔屬迅速之症即宜急治遲則毒火攻人昏憤譫語惡症多致不救

面發毒生面上頰車骨間初生一個漸發數枚形如赤紅焮痛堅硬似疔時津黃水由風熱客於陽明上攻而成初宜敗毒散汗之昏焦口渴便閉宜涼膈散外敷金黃散疔腮又名含腮瘡生二腮肌肉不着骨處無論左右皆陽明胃熱也初起焮痛寒熱往來高腫色紅焮熱因風熱若平腫色淡不鮮因溼熱始則俱以柴胡葛根湯表發之口渴便閉黃連湯四順清涼飲下之外敷金黃散

柴胡葛根湯

柴胡 乾葛 石膏 花粉 黃芩 甘草 全不

牛子 連喬 吉梗 各示 升麻 三分

四順清涼飲

當歸 赤芍 甘草 大黃 防風 羌活

梔子 連喬 炙味 水煎服

頰瘍生耳下頰車骨間由陽明胃積熱而生初如粟漸大如榴初宜服犀角升麻湯若失治或過服涼藥以致肌冷凝結堅硬難消難潰宜升陽散火湯將潰托裏消毒散膿熱針之膿出腫退瘡口易愈或牙關緊急不開或旁腫不消膿水清稀因而成漏復被寒侵瘡孔致生多骨經年纏綿難愈服桂附地黃丸外用附子灸每日灸之以朽骨脫出膿漸少而肌漸平為度兼用紅升丹擦入瘡口內貼膏藥日一易

犀角升麻湯



犀角二分半

升麻半

黃芩

甘草

白芷

川芎

羌活

防風各一

升陽散火湯

川芎分

京子

炒芍

防風

羌活

獨活

甘草

人參各一

柴胡

香附

葛根

升麻

各半 姜 虫 半

發頭又名汗毒生於頭領之間屬足陽明經初起身發寒熱

腫如結核微熱微痛漸腫如桃如李疼痛倍增由傷寒發

汗未盡或疹形未透而成初宜敗毒散汗之外敷拔毒散

即消仍腫痛日增勢必成膿宜托裏透膿湯失治毒必內

陷重至咽喉痰壅氣堵湯水難嚥者逆

眉發上心陵屬足太陽厥陰少陽手太陽四經積熱所致形

長如瓜疼痛引腦二目合腫堅硬色赤按之有根六日內



南京中醫藥大學圖書館版權所有