

傷寒約編卷一

吳江徐大椿著

太陽證提綱

太陽之為病脉浮頭項強痛而惡寒

太陽主表其脉浮而有力與陽明兼長大少陽兼弦細三陰之微浮者不同頭項主一身之表太陽經脉繫於頭會於項故太陽病則頭連項而強痛與陽明頭額痛少陽頭角痛者迥別惡寒為寒在表六經雖各惡寒而太陽應寒水之經故惡寒特甚與陽明二日自止少陽往來寒熱三陰內惡寒者懸脉矣脉浮頭項強痛惡寒八字為太陽一經受病之綱領無論風寒溫熱疫癘雜病皆當倣此以分經定證也

傷寒

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體病嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒

已發熱是寒傷於表即發熱以拒之未發熱是寒邪凝斂熱不遽發即發熱之遲早可知其人陽氣之盛衰寒邪之重輕雖有已發熱未發熱之不同而惡寒體痛嘔逆之證陰陽俱緊之脉先見便可斷其為傷寒而非他病也傷寒必惡寒寒邪外束一身之陽氣不舒則體痛寒邪內侵胃中之陽氣不化則嘔逆寒令脉緊陰陽指浮沉不專指尺寸此太陽經傷寒之脈證

麻黃湯證

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

太陽主一身之表其經直抵腰中故傷寒則身疼腰痛主筋所生病筋皆會於手足肢節故受寒則骨

傷寒約編目錄

太陽病卷之一

太陽經脉證提綱一條

加減建中湯證一條

養陰黑膏湯證一條

瘀熱發黃

麻黃連翹赤小豆湯證一條

大青龍無少陰證一條

夾血傷寒證一條

內傷夾傷寒證一條

葛根湯證一條

葛根加半夏湯方

茯苓甘草湯證一條

結胸與痞證一條

大陷胸丸方

藏結死證一條

甘草瀉心湯證一條

乾姜黃連黃芩人參湯證一條

太陽經傷寒一條

加減建中湯方

養陰黑膏湯方

麻黃連翹赤小豆湯方

小青龍湯證一條

夾痰傷寒證一條

陽氣夾傷寒證一條

葛根湯方

五苓散證一條

茯苓甘草湯方

大陷胸湯證一條

小陷胸湯證一條

結胸死證一條

甘草瀉心湯方

麻黃湯證一條

變化黑膏湯證一條

變化黑膏湯方

大青龍湯證一條

小青龍湯方

夾食傷寒證一條

即紅膏湯證

夾水傷寒證一條

五苓散方

十棗湯證一條

大陷胸湯方

小陷胸湯方

生薑瀉心湯證一條

半夏瀉心湯證一條

乾姜黃連黃芩人參湯方

麻黃湯方

變化黑膏湯方

大青龍湯方

夾氣傷寒證一條

夾虫傷寒證一條

溫中如膏湯方

葛根加半夏湯證一條

五苓散煩渴證一條

十棗湯方

大陷胸丸證一條

藏結證一條

生薑瀉心湯方

半夏瀉心湯方

大黃黃連瀉心湯證一條

大黃黃連瀉心湯方

附子瀉心湯證一條

附子瀉心湯方

赤石脂禹餘糧湯證一條

赤石脂禹餘糧湯方

旋覆代赭石湯證一條

旋覆代赭石湯方

抵當湯證一條

抵當湯方

畜血發黃證一條

抵當丸證一條

抵當丸方

桃仁承氣湯證

桃仁承氣湯方

畜血喜忘證一條

溫病

葛根湯與發散黑膏湯證合一條

葛根湯方

發散黑膏湯方

疎熱黑膏湯證一條

疎熱黑膏湯方

三甲散證一條

三甲散方

溫病夾陰

疎邪紅膏湯方

熱傳厥陰

羚羊角散方

溫熱與疫有別

葛根加石膏湯方

達原飲方

三消飲方

疫熱迫血

瀉熱理陰陽方

痢疫

寶花散方

清涼至寶飲方

暑疫



青蒿石斛飲方

中風

桂枝湯證二條

形作傷寒脈不弦緊一條

四逆湯方

桂枝加附子湯證一條

桂枝去芍藥生薑新加人參湯方

桂枝人參湯證一條

桂枝加厚朴杏仁湯證一條

桂枝加大黃湯證合上條

茯苓桂枝甘草大棗湯證一條

桂枝去桂加茯苓白朮湯證一條

桂枝加桂湯方

蘇子清氣湯證一條

濕痺

太陽經傷濕證一條

桂枝附子湯方

濕溫

桂枝湯方

藏無他病一條

柴胡桂枝湯證一條

桂枝加附子湯方

桂枝人參湯方

桂枝加厚朴杏仁湯方

桂枝加大黃湯方

桂枝去姜桂加龍骨牡蠣湯證一條

蘇子清氣湯方

甘草附子湯方

桂枝附子去桂加白朮湯方

鼠粘子湯方

病嘗自汗出一條

柴胡桂枝湯方

桂枝去芍藥生薑新加人參湯證一條

芍藥甘草附子湯證一條

葛根黃連黃芩湯證一條

桂枝加芍藥湯證一條

桂枝甘草湯證一條

茯苓桂枝甘草大棗湯方

桂枝去桂加茯苓白朮湯方

桂枝加桂湯證一條

桂枝未解一條

桂枝四逆相關證一條

桂枝湯禁

芍藥甘草附子湯方

葛根黃連黃芩湯方

桂枝加芍藥湯方

桂枝甘草湯方

桂枝加桂湯證一條

桂枝去姜桂加龍骨牡蠣湯方

去桂加白朮湯證一條

甘草附子湯證一條

甘草附子湯證一條

甘草附子湯證一條

蒼朮白虎湯證一條
前胡疎肺飲方

蒼朮白虎湯方
大力子湯方

發斑痧疹隱疹累水珠論一條
犀角地黄湯方

中暑

消暑十全散發一條

消暑十全散方

中暑脈證一條

補中益氣湯方

中暑渴證一條

消暑益氣湯方

痙證

炙甘草湯方 見傷寒脈結代心動悸

陽明病卷之二

陽明病提綱一條

胃實外證一條

陽明病脈三條

不可下證一條

誤汗便難證一條

蜜導方

豬膽汁導方

陽明傷寒證一條

陽明病機一條

太陽轉屬證一條

本經成實證一條

太陰轉屬證一條

陰結陽結證一條

陽明桂枝證一條

陽明麻黃證一條

小青龍湯 吳茱萸湯證一條

陽明衄血證二條

譫語證一條

譫語脈一條

酸棗仁湯方

譫語死證一條

譫語鄭聲一條

熱入血室證三條

梔子豉湯方

黑道遇散方

舉輕占拜散方

陽明中風證二條

陽明中寒證一條

固瘕證一條

穀疸證一條

枳實理中湯方

除中證一條

梔子豉湯證一條

白虎加人參湯證一條

白虎加人參湯方

猪苓湯證一條

猪苓湯方

梔子豉湯方

甘草豉湯方

梔子甘草豉湯方



梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯方

灰蒂散證一條

白虎湯證一條

寒濕發黃證一條

蒸蒸發熱證一條

大承氣湯證一條

譫語發潮熱證一條

汗出譫語證一條

腹滿不減證一條

目中不了了大便鞭證一條

腹脹不大便急下證一條

少陽病卷之三

少陽病提綱一條

太陽少陽併病一條

嘔而發熱證一條

陽明病脇下硬滿證一條

柴胡桂枝湯證一條

梔子乾姜湯證一條

梔子柏皮湯證一條

灰蒂散方

白虎加人參湯證三條

承氣湯證一條

胃不知譫語證一條

大承氣湯方

潮熱獨語證一條

譫語潮熱不能食證一條

二陽併病一條

口燥咽乾急下證一條

梔子乾姜湯方

梔子柏皮湯方

四逆湯證一條

三陽合病一條

調胃承氣湯方

小便數大便硬證一條

勿令大泄下證一條

大便秘則譫語證一條

繞臍痛煩躁證一條

發汗不解腹滿證一條

自利清水心下痛急下證一條

梔子厚朴湯證一條

梔子湯禁

吐後變證一條

茵陳蒿湯證一條

煩熱如瘧證一條

小承氣湯方

飲水噦證一條

下利譫語證一條

不大便腹滿痛證一條

發熱汗多急下證一條

少陽中風證一條

小柴胡湯證一條

小柴胡加減證一條

少陽轉屬陽明證一條

柴胡證反下一條

少陽欲罷脈一條

小柴胡湯方

陽明少陽合病一條

熱入血室如瘧證一條

柴胡桂枝乾姜湯證一條

柴胡桂枝乾姜湯方

柴胡加芒硝湯方

傷寒熱結寒熱證一條

小建中湯不瘥證一條

黃芩湯證黃芩加半夏生薑湯證合一條

少陽負脈一條

太陰病卷之四

太陰病提綱一條

太陰黃發證一條

桂枝加芍藥湯方

太陰經中風證一條

少陰病卷之五

少陰病脈證提綱一條

少陰亡陽證一條

少陰中風

少陰中風脈一條

少陰傷寒

少陰病可治不可治證三條

柴胡加龍骨牡蠣湯證一條

調胃承氣湯證一條

嘔而復利證一條

建中湯禁

黃芩湯并加半夏生薑湯方

理中湯證一條

太陰死證一條

桂枝加大黃湯方

寒實結胸證一條

少陰自利證一條

八味腎氣湯方

柴胡加龍骨牡蠣湯方

大柴胡湯證一條

小建中湯證一條

黃連湯證一條

黃芩湯并加半夏生薑湯方

自利證一條

桂枝加芍藥加大黃二湯證合一條

太陰經桂枝證一條

三物白散方即三物小陷胸湯

寒實結胸治二條

少陰病脈一條

少陰病脈陰陽俱緊二條

少陰不可汗不可下證一條

少陰病陽回證一條

少陰病欲解一條

麻黃附子細辛湯證一條



麻黃附子細辛湯方

火劫證一條

真武湯證二條

四逆湯證十條

通脈四逆湯證二條

少陰病冷結膀胱一條

茯苓四逆湯方

吳茱萸湯方

白通加豬胆汁湯方

猪苓湯方

甘草湯桔梗湯二證合一條并方

苦酒湯證一條

厥陰病卷之六

厥陰病提綱一條

肝乘肺證一條

烏梅丸方

當歸四逆加吳茱萸生薑湯方

厥陰脈二條

麻黃附子甘草湯證一條

下厥上竭證一條

真武湯方

四逆湯方

通脈四逆湯方

少陰傷寒脈足一條

乾姜附子湯證二條

白通湯白通加豬胆汁湯證三條

黃連阿膠湯證一條

猪苓湯禁

苦酒湯方

苦酒湯方

肝乘脾證一條

厥陰消渴證一條

當歸四逆湯證一條

厥陰病圖膿血證二條

厥陰病無陽證一條

目録

麻黃附子甘草湯方

附子湯證二條

桃花湯證一條

四逆加人參湯證一條

少陰病厥證二條

少陰傷寒煩躁證一條

乾姜附子湯方

黃連阿膠湯方

猪膚湯證一條

半夏散及湯證一條

四逆散證一條

左金丸方

厥陰中風證一條

當歸四逆湯方

白頭翁湯證二條

厥陰病無陽證一條

四

目録

少陰傳經便血證一條

附子湯方

桃花湯方

四逆加人參湯方

少陰亡血證一條

茯苓四逆湯證二條

吳茱萸湯證三條

白通湯方

猪苓湯證二條

猪膚湯方

半夏散及湯方

四逆散方

枳木丸方

烏梅丸證一條

當歸四逆加吳茱萸生薑湯證一條

白頭翁湯方

南京中國藥大學圖書館藏

熱厥利證

厥熱相應往來證四條

厥利難治證一條

傷寒欬逆上氣脈散死證一條

陰陽易證

燒裨散證一條

諸寒熱證

六味丸證一條

參附湯證一條

見厥復利證一條

燒裨散方

八味丸證一條

參附湯方

炙甘草湯證一條

六味丸方

發癰證一條

炙甘草湯方

八味丸

即八味腎氣湯方見少陰



傷寒約編卷一

吳江徐大椿著

太陽證提綱

太陽之為病脉浮頭項強痛而惡寒

太陽主表其脉浮而有力與陽明兼長少陽兼弦細三陰之微浮者不同頭項主一身之表太陽經脉榮於頭會於項故太陽病則頭連項而強痛與陽明頭額痛少陽頭角痛者迥別惡寒為寒在表六經雖各惡寒而太陽應寒水之經故惡寒特甚與陽明二日自止少陽往來寒熱三陰內惡寒者懸脉矣脉浮頭項強痛惡寒八字為太陽一經受病之綱領無論風寒溫熱疫癘雜病皆當倣此以分經定證也

傷寒

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體病嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒

已發熱是寒傷於表即發熱以拒之未發熱是寒邪凝斂熱不遽發即發熱之遲早可知其人陽氣之盛衰寒邪之重輕雖有已發熱未發熱之不同而惡寒體痛嘔逆之證陰陽俱緊之脉先見便可斷其為傷寒而非他病也傷寒必惡寒寒邪外束一身之陽氣不舒則體痛寒邪內侵胃中之陽氣不化則嘔逆寒令脉緊陰陽指浮沉不專指尺寸此太陽經傷寒之脈證

麻黃湯證

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

太陽主一身之表其經直抵腰中故傷寒則身疼腰痛主筋所生病筋皆會於手足肢節故受寒則骨



節疼痛具經會於頭為諸陽主熱寒邪外束陽氣不伸而皮毛閉遏故頭痛發熱惡風無汗而喘也太陽為開立麻黃湯以開之則汗出而邪自解散發熱疼痛自除矣前條惡寒嘔逆此條惡風無汗前陰陽俱緊此並不言脈是互文見意處二條俱麻黃湯證要知麻黃湯治中風重劑寒傷於表者可用之非專治傷寒之主劑也蓋風寒本同一氣風中無寒即是和風何足病人必風開腠理則寒得入於經絡乃病傷寒耳故不必於風寒而鑿分但審脈之虛實施治庶無差誤矣

麻黃湯

治發熱惡寒頭痛項強身疼腰痛骨節疼痛無汗而喘脈緊有力者

麻黃

去節桂枝一錢杏仁二錢甘草五分

水煎去渣溫服

嘔者加半夏生薑一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡氣煩躁不得眠也汗多者溫

粉撲之

寒邪傷表陽氣不伸故寒熱身疼無汗嘔逆而喘非此開表逐邪之峻劑不足以當之也麻黃入肺能去骨節之風寒從毛竅出為衛分發散風寒之品桂枝入心能化心液通經絡而出汗為營分解散寒邪之品杏仁為心果溫能散寒若能降氣為肺家逐邪定喘之品甘草甘平外拒表邪內和血氣為中宮安內攘外之品此湯入胃行氣於元府輸精皮毛毛脉合精而溱溱汗出表邪盡去不留則痛止喘平寒熱頓解不必藉汗於穀也不用姜棗者以生薑之橫散礙麻黃之上升大棗之甘滯礙杏仁之速降若脉浮弱汗自出或尺中微遲者是建中所主非麻黃所宜麻黃湯為發汗重劑專治表實裡氣不虛者投之恰當一戰成功可一不可再嘔逆加半夏生薑即非麻黃湯法矣兼治冷風哮喘證

加減建中湯證

脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗以營氣不足血少故也

脉繫身疼是據脉驗證法邪從汗解則陽氣得伸而身自不疼矣假令尺中脉遲以尺陽陰氣血少則營氣不足雖發其汗不特無汗而身疼不除則營氣反虛而亡血亡津液之變頓起陽脈者不特發汗變證惟衄衄乃邪解陰虛者不可發汗亡陽之變恐難挽回建中法加減始為合劑耳

加減建中湯 治發熱惡寒無汗身疼脉浮弱者
製首烏五錢 酒炒 川桂枝 六分 白芍藥五錢 酒炒 淡豆豉錢半 當歸身三錢 炙甘草錢半 白雲神錢半 新會皮錢半 鮮生姜三片 肥大棗三枚

水煎去渣溫服 此養營解邪之劑血少則營氣不足絡脈空虛寒邪得以留戀經中故用首烏滋血歸芍養營淡豆豉解表姜桂祛寒伏神霍梗安神啟胃炙草大棗緩中益虛緩方和劑合之陳皮共助養正祛邪之方

變化黑膏湯證

傷寒脉浮緊者麻黃湯主之不發汗因致衄

脉繫無汗用麻黃湯發汗則邪從汗解而陽氣得泄陰血不傷奪汗則無血也若不發汗而陽氣內擾陽絡受傷則血外溢而衄血奪血則無汗也再用辛溫汗劑何異抱薪救焚合變化黑膏湯主之

變化黑膏湯 治發熱無汗口燥鼻衄或汗後發熱不解脉浮數不振者
原生地五錢 荆芥穗錢半 建連翹三錢 白茯苓錢半 川貝母錢半 生薑肉三錢 淨蟬衣錢半 紫丹參錢半 生甘草五分 西湖柳三錢 糖拌炒

水煎去渣溫服 此疎熱存陰之劑不發汗則陽邪受陷陽絡受傷而衄血故以荆芥連翹疎熱外泄生地川貝解熱存陰茯苓丹參以安神和血查蟬柳草以調中攘外也

衄家不可發汗。汗出必額上脈緊急。目直視不能瞬。不得眠。

太陽脉起目内眦上額。已脫血而復汗之。則津液枯竭。故脉緊急而目直視也。亦必腎俱絕矣。目不瞬。故不能瞬。目不合。故不得眠。勉用墨膏。冀挽萬一。

養陰墨膏湯 治心腎液竭邪迫垂危脉瀉急疾欲脫者

懷生地^{六錢} 淡豆豉^{錢半} 生洋參^{三錢} 肥麥冬^{三錢} 去心真阿膠^{三錢} 生白芍^{錢半} 白玉竹^{三錢} 川貝母^{三錢}

二錢 淮山藥^{三錢} 忍冬藤^{三錢} 乾荷葉^{三錢}

水煎去渣溫服 已脫血而復汗之。則津血大傷。經脈失養。遂成危迫之候。生地滋先天之水。麥冬潤

後天之津。阿膠益血。芍藥飲陰。山藥洋參。填中土以生金。生水。玉貝忍冬。涵心氣以通脉。通經。淡荷

葉提陷升陽。如起涸轍之魚。以冀寒谷逢春。洵為生津潤燥。起死回生之劑。

瘀熱發黃證

病發於陽而反下之。熱入因作結胸。若不結胸。但頭汗出餘處無汗。至頸而還。小便不利。身必發黃也。

寒氣侵人。人即發熱以拒之。是為發陽。助陽散寒。一汗而寒熱盡解矣。若不發汗而反下之。熱反內陷。

寒邪與水氣隨熱而入於胸。必結熱氣。陷炎上不能外越。故頭有汗而身無汗也。小便利即濕熱在內。

亦解不利則濕熱內蒸於藏府。而黃色外見於皮膚。

麻黃連翹赤小豆湯

傷寒瘀熱在裏身必發黃。麻黃連翹赤小豆湯主之。

熱反在裡。不得外越。謂之疼熱。非發汗以逐之。則濕熱終不散。然仍用溫散。是抱薪救火也。故於麻黃

湯去桂枝之辛溫。加連翹梓皮赤小豆之苦寒降泄。可解表清火而利水。一劑而三善備矣。且以見太



陽發熱之治與陽明迥別也

麻黃連翹赤小豆湯 治表邪內陷不解發熱發黃脉濡浮數者

麻黃八分 連翹錢半 小豆三錢 梓皮錢半 杏仁二錢 甘草五分 姜皮八分 大棗三枚

潦水煎去渣溫服 皮膚之濕熱不散仍當發汗而在裡之痰熱不清非桂枝所宜故於麻黃湯去桂

枝而加赤小豆之酸以收心氣甘以瀉心火專走血分而通經絡行津液而利膀胱梓皮白皮寒能清肺

熱苦以瀉肺氣專走氣方而清皮膚理胸中而解煩熱連翹杏仁瀉火降氣麻黃姜皮開表逐邪甘草

大棗和胃緩中潦水煎之降火除濕也其表有不解黃有不退者乎

大青龍湯證

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青湯主之

寒風之厲熱鬱於中故煩躁而腹兼惡寒蓋風有陰陽汗出脉緩是中於鼓動之陽風不汗出而脉緊

乃中於凜冽之陰風也風令脉浮浮緊而沈不緊與傷寒脉陰陽俱緊有別發熱惡寒同桂枝證身疼

痛不汗出同麻黃證惟煩躁是本證所獨風盛於表非發汗不解熱鬱於裡非大寒不除故於麻黃湯

倍麻黃以大發其汗加石膏以并除其煩躁中風本惡風此惡寒甚故不見其更惡風耳

大青龍湯 治寒風在表火鬱於中發熱身疼無汗煩躁舌白中焙脉浮緊數有力若脉浮弱汗出惡風

者不可服服之則筋惕肉瞤此為逆也

麻黃錢半 桂枝錢半 杏仁二錢 甘草錢半 石膏五錢 生姜三片 大棗五枚

水煎去渣溫服 煩躁是熱傷其氣無津不能作汗故發熱惡寒身疼不解特加石膏之泄熱生津以

除煩躁然其性沈而大寒恐內熱頓除表寒不解變為寒中而脇熱下和故也必倍麻黃以發表又倍

甘草以和中。更用姜棗調和營衛。一汗而表裏雙解。風熱兩除。何患諸證不平乎。此大青龍清內攘外之功。所以佐麻黃二方之不及也。青龍以發汗命名。少陰亦有發熱惡寒無汗煩躁之證。但脉不浮。頭不痛為異。

傷寒脉浮緩發熱惡寒無汗煩躁身不疼但重。乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯發之。

陽氣太重。微寒外束。亦令無汗煩躁發熱惡寒也。傷寒脉浮緊身必疼。浮緩身不疼。前條中陰列之風。此條受輕微之寒。蓋陽運則身輕。陽鬱則身重。乍有輕時。乃衛陽得伸也。無少陰證者。則少陰虛陽不歸。亦有發熱惡寒無汗煩躁之證。法當溫補以回陽。若反用麻黃之散。石羔之寒。則真陽立亡。此條陽氣重。傷寒微。故以大青龍湯。小其制而雙解之。

大青龍湯見前

小青龍湯證

傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而咳。或渴或利。或噎或小便不利。少腹滿。或喘者。小青龍湯主之。發熱是表不解。乾嘔而欬。是心下之水氣不散。水性流動。其變多端。水氣下而不上。則或渴或利。上而不下。則或噎或喘。留而不利。行則小便不利。少腹因滿也。小青龍兩解表裏之邪。復立加減法以治或然之證。此為太陽機樞之劑。

小青龍湯 治發熱心下有水氣。乾嘔而欬。脉緊弦細者。

桂枝一錢 芍藥一錢 甘草五分 半夏錢半 麻黃一錢 細辛三分 乾姜五分 五味五分

酒炒

製

錢半

麻黃

一錢

細辛

三分

乾姜

五分

五味

五分

五分

五分

五分

五分

五分

五分

五分

五分

五分

五分

水煎去渣溫服。渴者去半夏加栝實。微利去麻黃加芫花。熬令赤色。噎者去麻黃加茯苓。喘者去麻黃加杏仁。去皮尖。

風寒夾水氣浸漬胸中內侵脾胃則發熱乾嘔而欬是小青龍主證故於桂枝湯去大棗之甘泥加麻黃以開元府半夏除嘔細辛逐水氣五味乾姜以除欬也既用麻辛發表不須生薑之橫散渴是心液不足故去半夏之燥易括蕞之潤利與噎小便不利與喘則病機偏於向裏故去麻黃之發表加附子以除噎羌花茯苓以利水杏仁以定喘耳大小青龍俱是兩解表裡之劑當知大青龍治裡熱小青龍治裡寒且小青龍治水之動而不居亦與五苓散治水之留而不行者不同兼治膚脹最捷又王水寒射肺冷哮證

夾氣傷寒證

發熱惡寒胸滿脇痛手按不堅不硬左關脈實大傷寒藥中加鬱金弦實加青皮弦滯加香附弦澀加青木香弦浮加烏藥右三部脈實大加檳榔右關獨實加枳實弦實加厚朴弦滯加枳殼弦澀加白豆蔻緊澀加草豆蔻滯澀加廣木香弦澀微澀加新會皮氣陷加升柴氣虛加參芪氣熱加苓連氣寒加姜附

夾血傷寒證

脇間拒按脇下或刺下必有一處堅硬實滿痛有定跡非若氣病之流走也左關脈實大加歸尾桃仁弦實加全歸赤芍弦滯加全歸延胡弦澀加全歸羌蔚子弦浮加當歸紅花弦澀加當歸丹參若脉大血堅非蒲黃五靈脂不能奏効

夾痰傷寒證

胸滿惡心或心嘈眩暈嘔出痰涎或痰鳴氣喘欬吐肢麻右關脈滑數有力加括蕞實弦細有力加法半夏右寸浮滑加蘇子滑數加川貝弦滑加白芥子滑大加杏仁泥右關滑實非萊菔子不能破結開



痰

夾食傷寒證

胸滿惡心。心下堅實拒按。噯腐吞酸。惡食疼痛。右關滑實。加建朮山查。弦實。加生山查。炒麥芽實。加萊服子。弦滯。加白木炭。弦細。加糊汁煮炒白木皮。

夾水傷寒證

胸中飽悶。漉漉有聲。惡心泛泛。嘔出清涎綠水。右關脉弦。加半夏白通草。右關脉細。加細辛茯苓。石三緊細沈實。非猪苓澤瀉黑丑白丑。不能破結逐水。

夾虫傷寒證

臍腹絞痛。吐瀉出虵。心嘈思食。嘔出青涎。甚則面生白點。是為虫化。亦必腹中起扛為確據。脉實。加檉榔。鶴蟲無美雷丸。脉虛。史君子作湯煎本病藥。

內傷夾傷寒證

倦怠懶言。無氣以動。右脉偏細偏軟。或濶大無力。加參耆朮草於表散藥中。間有氣傷不能化血。而血積於中者。切勿破之。但須調營托裏。血絡化而邪自解。

陽虛夾傷寒證

足冷陽縮。古白戴陽。脉細緊濇。宜紅膏湯。加調營解邪藥。凡係傷寒無不發熱惡寒。至於夾證。或托或化。必期中病為節。切勿過行剋伐。有傷清陽之氣。反致外邪內陷。救藥莫及矣。

溫中紅膏湯 治陽虛傷寒。足冷陽縮。身熱面戴陽。脉細緊濇者。

製附子八分 益淡豆豉錢半 鹽炮姜炭八分 川桂枝八分 當歸身三錢 白茯苓二錢 炙甘草錢半



南京中醫藥大學圖書館藏