

霍亂門

或問霍亂吐瀉病起倉卒者何氣使然也。

答曰霍

亂者揮霍變亂之義。人身以陰陽和平爲貴。若陽爭

于內。陰擾于外。或抗于中。陽拒于外。謂之陰陽錯亂。

彼此不和。如仇敵。然倉卒間。氣蔽不通。悶絕欲死。腸

腹絞痛。氣逆則惡心嘔吐。氣亂則暴注下泄。危在頃

刻。有若醫藥不及措手之勢。故曰亂也。或問霍亂

暴發。有先吐者。有先瀉者。亦有不吐不瀉者。有轉筋

者。有呃逆而四肢厥冷者。或生或死。何以別之。答

曰。霍亂誠爲暴證。生死實在頃刻。不可不慎之。於初

然致病之因。總不外於無形之暑濕所于。有形之痰食所阻。使三焦氣道閉絕不通。以致陰舛錯。寒熱交功。而變起倉卒。其時但求升降。分疎表裏。透達氣得通暢。不致隔塞。病當隨減。若上不得吐。下不得瀉。其氣閉于胸腹。爲之乾霍亂者。其勢更危。不拘冷熱。湯水入口卽死。卽定後猶忌。以防變病。治此症者。宜通宣忌塞。忌補救急之法。惟用生姜五錢。食鹽二兩。煎湯四五碗。不冷不熱。涼水頓溫。頻呷探之。使吐。若急切不及煎湯。頓溫者。可用陰陽水。或酒調明礬末。頻呷。約酒一碗。用礬二錢。痛定卽止。切勿多服。吐後再

用打痧法。先刮頸背。次刮兩臂肘彎。又次刮兩腿彎。
俟刮出紫黑痧爲妙。病勢自緩。然後審其屬寒屬熱。
屬食屬痰。分而主治。然此証猶有內傷外感。在經在
腑。在臟及虛實寒熱不同。臨症必須細察無忽。外
感風寒。暑濕霍亂。脉証。夏秋之交。暑氣正酷而涼

風驟爽。人於此時最易感觸。蓋寒邪遏於外。暑毒鬱
于中。必致頭疼惡寒。身熱煩渴。兩關脉沉弦。或浮緊。
此係營衛不通。陰陽舛錯。腸胃閉塞。上閉則胃先疼。
而惡心。下閉則腹先痛而欲瀉。吐則胃痛止。瀉則腹
痛緩。是寒暑隨吐瀉而散。氣得通也。若不能吐瀉者。

即宜探吐刮痧。繼服後方疎通表裏。

外感霍亂主方。

乾葛

三錢

陳皮

一錢五分

半夏

一錢五分

藿香

一錢五分

厚朴

一錢

香茹

一錢

蘇葉

一錢

甘草

二分

生姜

三片

水煎不拘時服。

蘇葉乾葛。專清風暑。若頭疼關節痛者。加羌活以治

在表寒邪。香茹藿香姜朴兼清暑濕。若嘔吐泄瀉。加

炒扁豆以和脾胃之氣。凡為嘔吐泄瀉。多屬氣滯痰

凝。而一陳又為必用之藥。頭疼關節痛。加防風一錢

五分。羌活一錢。如不能吐。加淡豆豉一錢。葱頭

一枚。不能瀉。加木香一錢五分。熱服即瀉。已經吐

瀉者。加炒砂仁一錢。茯苓一錢五分。去蘇葉香薷

若頭已減。體熱吐瀉未止。加炒扁豆二錢。茯苓一錢

五分。炒砂仁炒淫瀉各一錢。減葛根二錢。去蘇葉香

茹不用。若外受風暑。內停飲食。心腹絞痛。霍亂吐

瀉。急服蘇合丸。如不能吐瀉者。上用鹽湯探吐。內用

蘇合一丸。先服。隨用。脩急丸十粒。取利。或用玉樞丹。

連服兩三錠。以取吐利。俟甦醒。隨症用藥。若上吐

下瀉。心腹窘痛。四肢厥冷。倦卧惡寒者。宜服二氣丹。

若獨受暑熱。霍亂吐瀉。上則順渴燥熱。下則前陰獨秘。小腹脹滿者。服六一散。若卒中暑毒霍亂。急以

熱童便。或人尿灌服。俟甦。用藥。如轉筋吐瀉。囊縮

攣倦者。服藿茹散。

蘇合丸。

見中寒門寒中太陰條

脩急丸。

見內傷門食物內傷條

玉樞丹。治山巒瘴霧之毒。與暑濕之

氣併結于中為病。或中尸氣瘡毒。及蛇虫獸毒。或食

毒菌河豚。一時心腹脹悶不通。絞痛欲死。吐瀉不能。

上下閉絕。語言錯亂。人事不省。急用此丹連服二三

錠。以取吐利。

文蛤

二兩焙燥

山茨菇

三兩焙燥

千金子

一兩五錢取霜

紅芽大戟一兩七錢五分 山豆根六錢二分五厘

全蝎三個 硃砂一錢二分 麝香七分

雄黃一兩二錢五分

為細末。五月五日午時。糝子尖和印成錢。

約二錢重。臨症緩則磨汁。急則搗末。滾湯

調服。中暑冷服。霍亂溫服。

二炁丹見中暑門中喝條 六一散見中暑門陰虛傷暑條

藿如散

暑毒傷肝則厥陰風木與火兼化。鬱遏不伸。以致霍亂。轉筋吐瀉。囊縮卷卧。肚腹絞痛。急用此劑。表裏疎

洩



香茹

四兩

藿香

三兩

陳皮

二兩

扁豆

炒二兩

乾葛

一兩

厚朴

一兩

蘇葉

一兩

防風

一兩

澤瀉

一兩

木灰

一兩

猪苓

一兩

青皮

一兩

砂仁

五錢

甘草

三錢

為細末薑湯調服三錢

內傷暑濕痰飲食積脉証

長夏初秋暑熱用令最

宜謹慎飲食否則脾胃易傷若任性違時當風露坐

浮瓜沉李冰菓飲食恣啖不擇則風寒暑濕食積停

飲先已隱伏於中遇有內傷外感陡然觸發則口乾

嘔惡胸膈脹悶肝腹疼痛若使吐瀉不行上下閉絕



必致四肢厥逆。冷汗如雨。煩渴燥妄而死。六脉或沉伏。或沉滑。或浮弦洪數不一。先宜前列脩急諸藥。及探吐之法。隨症施治。繼用後方調理。蓋外感必兼內傷。而內傷竟有絕無外感者。故諸藥俱脩列于外感條後。若遇後三症。卽內傷轉筋虛損等症。不妨對病取用。

內傷霍亂主方。

淡豆豉 三錢

陳皮 二錢

藿香

一錢五分

半夏

一錢五分

蒼朮

一錢

厚朴

一錢

甘草

二分

生姜

三片

水煎不時服。

凡食填至陰。必先疎通氣道為主。前方內通劑。非利劑也。不偏寒熱香燥。剋伐中和。利于通治。煩渴燥妄。加乾葛二錢。去蒼朮之燥。如不瀉。加香茹一錢。五分。枳實一錢。去豆豉。蒼朮。如傷肉食。加炒山查三錢。粉食。炒穀芽三錢。炒杏仁二錢。麵食。神糲二錢。炒葡萄子一錢。煩渴溺閉者。六一散。惡心欲嘔。以鹽湯探吐。嘔惡腹痛。服蘇合丸。吐瀉不通。蘇合同脩急丸。吐瀉並行。腹痛肢冷。惡寒捲卧者。服二炁丹。或問轉筋吐瀉。勢亦危篤。其由腑由臟。為實為虛。屬寒屬火。幸以教我。答曰。轉筋之症。純屬



暑火絕無寒濕。正爲諸嘔吐酸。皆屬於火。暴注下迫。皆屬於暑。蓋暑具燥烈迫速之性。而宗筋則絡于腸胃。兩陽明之分。若暑毒干於腸胃。則陽明熱極。筋燥縮緊急。故滿腹抽引爲痛。此陽症也。四肢不厥爲輕。又肝主筋。若暑毒傳于厥陰。則厥陰之絡循陰器而主宗筋。所以轉筋入腹。有絞腸疼痛之危。甚至四肢厥逆。舌卷囊縮。此陰症也。係陰虛血少所致。故爲重。六脉浮弦急數者。易愈。若沉伏不應者。難治。雖經吐瀉。未能全愈。尚須清暑以和氣。潤燥以舒筋脉。轉筋霍亂主方。



扁豆

三錢炒黃

藿香

五錢

木瓜

一錢五分

橘紅

一錢五分

車前

一錢

茯苓

一錢

香菇

五分

水煎不拘時服。

病因暑濕而致。不分外清解散。若陽明厥陰喜潤惡燥之物。佐以滋澤清潤之味。未經吐瀉者。加淡豆豉三錢。香菇一錢。去扁豆。茯苓。已經吐瀉而轉未愈。煩渴飲冷。肢溫多汗。脉浮數者。屬陽明症。加人參一錢。麥冬一錢五分。黃連五分。去香菇。藿香。若吐瀉之後。轉筋腹痛猶在。渴不欲飲。厥冷無汗。脉沉數。或沉弦者。屬厥陰症。雖曰厥逆。多由痛極原屬於火。忌



服溫燥。宜加當歸一錢。川芎五分。辛潤之劑。以滋舒筋。去香茹藿香之燥。此症初起。藿茹散宜服。若腹痛厥冷轉筋。脉伏惡寒。卷卧。服二死丹。外以兩手兜陰囊。女以兩手摩乳頭。蓋厥陰之經絡於陰器。厥陰之氣上至乳頭而終耳。或以滾醋潑炭薰鼻。或以濃滾鹽湯浸兩腿可愈。或問有因霍亂而吐瀉。或吐瀉以致肢體厥冷。自汗煩燥。渴不欲飲。脉虛浮。或沉伏而欲脫者。何也。答曰。此等必猶酒色過度。或謀慮傷神。平日中氣先虛。本元淺薄。適因暑濕外觸。生冷內傷。遂成霍亂。或自行吐瀉。或使之吐瀉。以



宣通鬱遏閉塞之邪。以致真元之氣。隨吐瀉而暴脫。津液隨吐瀉而枯涸。苟非後方接補。十無一可生。虛損霍亂主方。

人參

五錢

麥冬

一錢五分

陳皮

一錢

炮姜

一錢

附子

一錢

肉桂

一錢

五味子

五分

甘草

五分

水煎濃。不時急服。

元氣暴脫。全藉人參附子。回陽。津液暴竭。必得麥味生津。陳皮甘草。和中。姜桂辛溫。益氣。卽建中理中之義。不煩渴。不發躁。欲近熱。飲熱者。加白朮二錢。去麥冬五味。如畏寒倦卧。面青肢厥。胸滿腹痛。舌卷。



囊縮。不煩燥。發渴。此真三陰虛寒症也。六脉沉伏不起。急加白朮三錢。茯苓一錢五分。乾姜一錢。去炮姜。麥冬五味。服參附理中丸。若吐瀉不止。胸腹脹悶。加茯苓塊三錢。白朮一錢五分。半夏一錢。陳皮五分。肉蓯一錢。益智仁七分。生姜二片。去麥冬五味。減人參三錢。附子五分。如腹痛不已。服蘇合丸。或二炁丹。參附理中丸。見中寒門寒中太陰條或問霍亂症。見于暑天。獨多。緣何亦有二陰之虛寒者也。答曰。人以夏日行酷暑之令。有熱無寒。恣以六一散。香茹飲水。桃瓜菓。種種生冷之物。以解暑。遂可杜中暑霍亂及瘧痢。

諸病。毫不解。夏三月。陽氣盡情。發越於外。惟有伏陰
在內。過食生冷。不惟無解於暑熱。而反以寒益寒。陽
胃元氣受傷。變起不測。是欲却病。而反速之病也。豈
不謬哉。況以七情六慾。沉溺久虛之體。當之雖屆盛
暑。焉能免于重陰之交剝也。願生之士。可不慎之。

嘔吐噦門

或問嘔吐噦三者皆由胃氣不和所致。何故又有陽之別也。答曰。胃氣不和。則嘔吐噦三症。然有不和者。三陽也。太陽寒水主吐。少陽寒熱相兼主嘔。陽明純火主噦。不可不察也。或問致病之因。有三。

受病總屬于胃。胃既自病。以何法和之。甚有湯藥不受者。又將何如。答曰。胃爲水穀之海。無物不容。無物不納。主人而不出者也。若嘔吐噦。乃不能容納。出而不入者也。亦不止于三陽爲病。且有新久寒熱虛實。有形無形之不同。或胃因邪觸。其氣不和而受此。