

傷寒集驗卷之四

秀水陳文治輯

桂枝湯

一酒客不可服服之則嘔因不喜甘故也若
弱而誤發其汗遂漏不止其陽欲亡用黃耆建
湯調榮養衛稍用桂枝扶陽歛汗以助黃耆功
病即止勿多用

桂枝

三錢
去皮

赤芍藥

甘草

炙各
一錢

生薑

三片

大棗

二枚

右用水二鍾煎至一鍾溫服須臾飲粥一盞以助藥
力得漿漿微汗為佳若遍體淋漓者病必不除若一
服不汗再如前法又不汗無妨二三劑但禁生冷肉
麵五辛及難消化之物陶節庵加防風羌活川芎白



傷寒集驗卷之四

秀水陳文治輯

桂枝湯

一酒客不可服服之則嘔因不喜甘故也若
弱而誤發其汗遂漏不止其陽欲亡用黃耆建
湯調榮養衛稍用桂枝扶陽歛汗以助黃耆功
病即止勿多用

桂枝

三錢
去皮

赤芍藥

甘草

炙各
一錢

生薑

三片

大棗

二枚

右用水二鍾煎至一鍾溫服須臾飲粥一盞以助藥
力得漿漿微汗為佳若遍體淋漓者病必不除若一
服不汗再如前法又不汗無妨二三劑但禁生冷肉
麵五辛及難消化之物陶節庵加防風羌活川芎白



木名踈邪實表湯又加膠飴二匙

評曰內經云辛甘發散為陽桂枝湯辛甘之劑也所以發散風邪又云風淫所勝平以甘辛佐以苦甘以甘緩之以酸收之是以以桂枝為主芍藥甘草為佐又云風淫於內以甘緩之以辛散之故以生薑大棗為使

桂枝二越婢一湯二

發熱惡寒熱多寒少因脈微弱不可發汗宜服之

桂枝

二錢五分

芍藥

二錢五分

甘草

二錢

生薑

三片

麻黃

二錢五分

石膏

三錢

大棗

二枚

右用水二鍾先煮麻黃二三沸去沫入諸藥煎至一

鍾溫服



桂枝麻黃各半湯

三太陽病八九日其狀如瘧熱多寒少

微緩者為欲愈脈微惡寒者陰陽俱虛不可更發身必亡
下然面赤反有熱故未欲解以其不得小汗身必亡

桂枝 三錢

芍藥 二錢

甘草 一分

麻黃 二錢

生薑 三片

大棗 二枚

右用水二鍾先煮麻黃二三沸去沫入諸藥煎至八

分溫服

桂枝二麻黃一湯

四服桂枝湯大汗出脈洪大者再與桂枝如前法若至形如瘧狀日再發者

得汗必解
宜服此

即桂枝湯加麻黃 二錢

杏仁 二錢

煎法如前



桂枝加附子湯

五太陽發汗過多遂漏不止陽虛腠理不密因而惡風

難四肢微急難以屈伸又風溫誤汗身痛脉沉遲

肢急乃太陽標少陰本病經水適斷恐至血結本方加紅花

即桂枝湯加附子二錢

煎法如前

桂枝加芍藥湯

六太陽病下後脉促胸滿宜服若太陽病為醫者誤下之因而腹滿時痛者屬太

陰宜服此若微惡寒脉遲弱陽氣已虛再加附子二錢

即桂枝湯加芍藥三錢

煎法如前

桂枝加茯苓白朮湯

七服桂枝後頭項強痛發熱無汗心下滿小水不利

即桂枝湯加白朮五錢

茯苓五錢

煎法如前

桂枝加厚朴杏仁湯

八太陽病下之微喘表未解也宜服之



即本方加杏仁 十枚 厚朴 二錢

煎法如前

桂枝新加湯

九發汗後身痛者邪未盡也脉沉遲者

參治

即桂枝湯加芍藥 二錢

生薑 二片

人參 二錢

煎法如前

桂枝茯苓白朮甘草湯

十 眩吐後心下逆滿氣上冲胸

振搖者服此仍與後赤茯苓參治

桂枝

去皮 辛熱

茯苓

四錢

白朮

苦甘溫

甘草

五分

煎法如前

桂枝茯苓甘草大棗湯

十一 治大汗後臍下悸欲作奔豚

茯苓

四錢

甘草

二錢

桂枝

錢



北京中医药大学图书馆版权所有

大棗 十個

右用耳爛水四升先煎茯苓減二升入諸藥煎取

升去粗服

桂枝救逆湯

十二傷寒脉浮醫以火迫之遂至汗大出邪內迫則心神浮越故

驚狂起卧不安宜服此

即桂枝湯去芍藥加牡蠣三錢

龍骨 二錢五分洗去腥

蜀漆 二錢

右用水三鍾煎煮蜀漆減一鍾入諸藥煎至一鍾分

二次溫服

評曰與桂枝湯表未盡解者緣芍藥益陰非陽所宜故去之火氣錯逆宜加蜀漆之辛以散之陽氣脫而以龍



骨牡蠣固之

桂枝加桂湯

十三燒針却汗針處核起而赤必發奔豚氣從小腹上冲心灸其核處宜服此

即桂枝湯加桂

一錢五分

如桂枝湯法煎服

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十四先火逆復下之裏氣虛又加燒鍼虛而火却故生煩躁

桂枝 二錢

甘草 二錢

牡蠣 煅五分 一錢

龍骨 一錢五分

如桂枝湯法煎服

評曰桂枝甘草之辛甘發散經中火邪龍骨牡蠣之滋

以收浮越之正氣

柴胡加桂枝湯

十五傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結餘證未去或風溫汗後

身熱心下妨悶或有動氣燒鍼取汗針處被寒核起而赤者灸患處各一壯宜服此



南京中医药大学图书馆藏

即桂枝湯加柴胡 三錢

黃芩 二錢

半夏 二錢

如桂枝湯法煎服

柴胡桂枝乾薑湯 十

六傷寒五六日已發汗而復下
脇滿微結小便不利渴而不嘔下

出往來寒熱
心煩宜服此

柴胡 四錢

桂枝 二錢
去皮

乾薑 一錢
五分

瓜蒌根 二錢

黃芩 三錢

牡蠣 二錢
煅

甘草 一錢
五分

如桂枝湯法煎服

評曰熱復於內以苦發之柴胡黃芩之苦以解傳表之邪辛甘發散為陽桂枝甘草辛甘以散在表之邪鹹以
更之牡蠣之鹹寒以消胸脇之滿乾薑之辛以潤之固



陽虛之汗津液不足而為渴苦以堅之瓜萋根之苦以

生津液

桂枝人參湯

十七大陽證外候未除而數下之遂挾熱下利利不止心下痞鞭表裏不解宜服

桂枝

二錢五分

甘草

一錢

白朮

二錢

人參

一錢五分

乾薑

一錢

如桂枝湯煎服

評曰表未解者辛以散之裏不足者甘以緩之此以裏

氣大虛故加入人參甘草於理中湯也

桂枝附子湯

十八傷寒八九日風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴脉浮虛而濡者宜服

即本方加附子

如桂枝湯法煎服

評曰濕在表者散以桂枝甘草之辛其濕在經者逐以

附子之辛熱薑棗辛其行榮衛通津液以和表也

桂枝加大黃湯

十九關脉沉實腹中大實而痛大便秘者此屬太陰證

即桂枝湯減甘草加大黃三錢

芍藥

一錢五分

如桂枝湯法煎服

桂枝大黃湯

二十足太陰脾經受證腹滿而痛咽乾而渴手足溫脉來沉而有力此因邪熱從陽經

傳入陰經也若本經腹滿不惡寒而喘者加腹皮去甘草

桂枝

芍藥

甘草

大黃

枳實

柴胡

右用水二鍾薑一片棗一枚煎至八分臨服入檳榔

磨水三匙熱服



桂枝葛根湯

二十一太陽項背強几几汗出惡風柔痙有汗不惡風者

即桂枝湯加葛根

三錢

如桂枝湯法煎服

桂枝瓜蒌葛根湯

二十二治柔痙

即桂枝湯加葛根

二錢五分

括蒌根

各錢

煎法如前

桂枝甘草湯

二十三太陽病發汗過多叉手自冒心心下悸欲得按者

桂枝

三錢

甘草

二錢

煎法如前

桂枝石膏湯

二十四治太陽陽明合病間日作瘧熱多寒少

桂枝

一錢

石膏

知母

各三錢



寧夏中醫藥大學圖書館版權所有

黃芩 二錢

右水煎溫服

柴胡桂枝湯

二十五治少陽頭額痛項強脇痛胸滿

治風溫汗後身熱及動氣等證或

柴胡 一錢

桂枝

黃芩

人參

白芍藥

半夏

各一錢

甘草

五分

右薑棗水煎

柴胡加桂湯

二十六治半表裡證盜汗身熱不欲去及

但有頭疼惡寒者

柴胡 三錢

黃芩

桂枝

各二錢五分



半夏 一錢

甘草 四分

右薑棗水煎

此方與柴胡桂枝湯少芍藥一味

半夏桂耳湯

二十七治中非時暴寒伏於少陰經始不利

腎傷寒也即仲景之半夏散但咬咀之用不同

半夏

桂心

甘草

炙各一錢五分

右咬咀水煎候冷少少細呷二日便愈

七味桂附湯

二十八治足少陰傷風胸滿心煩咽痛白汗腰連脛骨酸痛嘔吐涎沫頭痛脉沉而弦

桂枝

白芍藥

甘草

乾薑

生附

白茯苓

桃仁

各五分

如咽痛加桔梗二分半

右水煎溫服



桂枝黃芩湯

二十九治太陽陽明少陽合病瘧疾寒熱

胡治少陽意甚明顯扶痰合二陳湯食積合平胃散
木有汗加黃芩白木夜發加桃仁白芍
藥日父加常山檳榔吐之其法已大備

知母

人參

黃芩

半夏各八分

柴胡一錢

石膏二錢

桂枝五分

甘草四分

右薑水煎服

茯苓桂枝湯

三十治陽明證但頭眩不惡食能食而咳兼
治水氣在半表乘於心胸怔忡悸惕乾嘔

自汗不渴

白茯苓三錢

桂枝二錢

甘草一錢

右薑水煎服



評曰茯苓甘草之甘益津而和衛桂枝生薑之辛助陽而解表

桂枝參苓湯

三十一治汗吐下後胃虛而嘔拂鬱面赤

桂枝

白芍藥

錢各三

人參

白茯苓

錢各二

甘草

錢一

右薑棗水煎溫服

桂枝附子紅花湯

三十二治婦人傷寒表虛自汗身涼四肢拘急脉沉而遲太陽標病少陽本

病經水適斷

桂枝

錢三

白芍藥

生薑

錢各二

甘草

錢一分五分

附子

炮

紅花

錢各七

右水煎服



桂枝芍藥當歸湯

三

十三治婦人有孕傷寒
脉浮頭重腹中切痛

桂枝

白芍藥

當歸各二錢

右水煎服

桂枝紅花湯

三

十四治婦人傷寒發熱惡寒四肢拘
急口燥舌乾經脉凝滯不得往來

桂枝

赤芍藥

甘草各一錢五分

紅花一錢

右薑棗水煎溫服汗出而解

麻黃湯

三

十五傷寒太陽證發熱無汗寒惡尺寸脉緊頭
疼腰脊強此因寒邪傷榮腠理閉密况當大寒

之令非此藥不能開腠發汗解散若太陽與陽明
合病喘而惡寒亦可月如脉不緊則不可用春令

尚寒亦暫可服用於夏月必有亡陽之失衄血之
變若尺中遲乃榮氣不足也尺中脉微乃裏虛也

雖有表證不可輕用



南京中医药大学图书馆藏