

婦科冰鑑

二



婦科水鑑卷三

帶下門目錄

五色帶

帶下門彙方目錄

加味四物湯 一

清白散 二

導水丸 三

萬安丸 四

蒼蘘檣皮丸 五

威喜丸 六

固精丸 七

吳茱萸湯加減法 八

積聚門目錄

積聚癥瘕痞血血蠱名義 一

癥瘕證治 二

食癥證治 三

血癥證治 四

痞證治 五

積聚證治 六

瘀血血蠱證治 七

瘰癧證治 八

疝病證治 九

治諸積大法 十

積聚門彙方目錄

大七氣湯 一

芎歸六君湯 二

烏藥散 三

血竭散 四

助氣丸 五

開鬱正元散 六

桃奴散 七

葱白散 八

烏雞丸 九

當歸散 十



婦科冰鑑卷三

帶下門

五色帶下

帶下者陰中穢物時下也由五志不遂或產育房
勞傷及衝任風邪乘間入於胞中血受其邪隨
藏氣寒熱虛濕而化其色有五故有五藏之分焉
色青者屬肝為風濕色赤者屬心為熱濕色黃者
屬脾為虛濕色白者屬肺為清濕色黑者屬腎為
寒濕也治法有六曰補瀉燥清溫寒也隨宜而施

靡有不効若帶已久更審其淋漓之物氣臭或腥而穢者係胞中敗血所化倘似瘡膿乃內癰膿潰而致下如米泔魚尿竅不利因膀胱蓄熱名為白濁此出自溺孔若如膠黏小水清長名曰白淫來自胞中由乎精道者也經曰思想無窮所願不得意淫於外入房太甚化為白淫也

若因六淫之邪入於胞中者少腹多痛宜吳茱萸湯加減主之色白黑而清稀者虛寒也色白者補中益氣湯色黑者六味地黃湯色黃

而淡者六君子湯或加味歸脾湯 胞中痛色
兼黃赤者濕熱也知藥四物湯 胞中冷痛者
寒濕也加味四物湯日久滑脫者照加法施用
五色相兼者濕熱尤甚也清白散主之 五
色相雜皆從濕化若少腹脹痛污水綿綿屬濕
熱者宜導水丸屬濕寒者宜萬安丸其寒熱之
辨在尺脈有力無力間分也 人肥者多屬痰
濕蒼蘘檉皮丸 白濁白淫亦帶類也宜威喜
丸固精丸 帶有因瘀血所化者以通逐為主

因內癰膿出者當詳瘡瘍施治毋容混也

吳茱萸湯 見月經門三一 本門八 附加減法

補中益氣湯 見月經門四八

六味地黃湯 見月經門十五

六君子湯 見經閉門五

加味歸脾湯 見崩漏門三

知藥四物湯 見崩漏門一

加味四物湯 本門一

清白散 本門二



導水丸 本門三

萬安丸 本門四

蒼藥標皮丸 本門五

威喜丸 本門六

固精丸 本門七

帶下門彙方

加味四物湯 一

熟地 三錢

白芍 二錢
酒炒

當歸 二錢
酒洗

川芎 一錢

附子 炮 一錢

肉桂 一錢

水煎服

日久滑脫者加升麻柴胡舉之龍骨牡蠣石

脂瀉之

清白散 二

生地 酒洗

白芍 酒炒

黃蘗 鹽水泡

炮薑 一錢

當歸 酒洗

川芎

椿根皮 酒炒



貝母 各一錢
甘草 各五分

薑炭

薑三片 水煎溫服

色赤加地榆 別芥黃芩 濕加蒼朮 白朮滑加
龍骨牡蠣 久則與四君湯合用

導水丸 三

牽牛 頭末

滑石 各四兩
水飛

黃芩

川大黃 各二兩

右末蒸餅為丸 滾白湯送服 丸數量虛實服

萬安丸 四

牽牛頭末

廣木香

右末水泛為丸量虛實白湯送服

蒼蘘樓皮丸 五

蒼木 米泔製

檳根皮

半夏

川芎

胡椒

小茴香

焙各等分

黃蘗 鹽水泡

南星 姜炙

海石 煨

香附

青者加防風梔子

積聚門

積聚癥瘕痞血血蠱名義一

五藏氣積名曰積故積有五六府氣聚名曰聚故聚有六難經有心肝脾肺腎五藏之積而無六聚蓋以積為血病而聚為氣病耳故東垣有五積九方治法巢氏病源載七癥八瘕但有八瘕名證而無七癥病形其他方書亦不概見大抵又以癥為氣病而瘕為血病也夫病皆起於氣必氣聚而後



血凝不必過凝於黃青燥血脂凝而驚等名但以
牢固不移有定處者為癥為積椎移轉動忽聚
散者為瘕為聚可也若夫痞者痞悶不通氣道
塞之謂瘀血者血瘀腹中未成堅塊之形蓄之既
久必成血蠱矣凡此諸證皆由新產之後與經行
之時不謹調避以致風冷外襲邪正相搏結於腹
中而成也

癥瘕證治二

癥者有所徵驗瘕者聚散無常由飲食失節脾胃



乾薑

炮各等分

君末醋和九桐子大每服五六十丸白湯

署月去乾薑加滑石

威喜丸六

白苓

四兩者廿餘沸取出晒乾不用猪苓二錢半同於磁器

黃蠟

四兩

右以白苓為末煉黃蠟為丸如彈子大空心

細嚼滿口生津徐徐咽服以小便清為度忌

冰醋只喫糠醋忌動氣惱

固精丸七

牡蠣煅粉

韭子

白龍骨

菟絲子酒蒸煨

五味子

白茯苓

桑螵蛸酒製

白石脂各等分

右為末酒糊丸如桐子大每服七十九空心

鹽湯下

吳茱湯

見月經門三一

色赤或黃而濁黏者熟也加黃連梔子色