

嘉慶二十二年冬 鑄

雲間翁仲仁著

增補痘疹參工
髓道全鏡錄

姑蘇書業堂梓



增補痘疹金鏡錄序

人稟天地陰陽五行以生而有餘不足或肇自先天或原於失養外因內傷病變無窮然小兒雖無七情而內傷惟乳食居多焉至六淫外侵與大人無異但疾苦痛癢不能向父母而悉告之所以調治倍難也

古人云寧醫十男子莫醫一婦人寧醫十



婦人莫醫一小兒蓋謂此耳醫有望聞問切若孩抱之兒週歲未幾血食未充唯風寅氣卯命辰三關畧有可憑而望色聞聲表裏洞然矣故五臟皆列於頭面而啼哭呴呼聞其音之清濁長短而病之寒熱虛寢莫不悉現於此若痘疹總憑色象以別吉凶辨症候蓋痘疹之出雖有五臟六腑

之分要皆遺毒肇自先天發出之時無
因內而達于外者余先大人汝霖公博覽
群書嘗謂余曰幼科方書唯金鏡錄一冊
可謂約而該簡而明矣余亦每閱是書其
中歌括并賦辨類方極其指示詳明美善
兼盡絕無偏寒偏熱偏攻偏補之弊誠後
學之津梁痘科之明鑑也但其書購求者



南京中医药大学图书馆版权所有

頗多而傳世甚久近見坊間類多殘缺余
甚惜焉適有客出書向余叅訂欲重刊行
世余幸其福世不淺酬應之暇卽揮汗考
正不自覺其倦之何以忘也志學之君子
尚亦與余有同情耳是爲序皆

康熙庚午歲季夏錢塘仇澐

天一氏題

于養素草堂

增補痘疹金鏡錄

申明貫珠攢簇怪痘

痘不在乎稀得勻朗散布雖多何害若連串貫珠有形相似而雜乎其間者若堆聚攢簇有象可名而間乎其內者有一于此空地雖多亦何取焉須知梟毒深藏氣血銬閉毒無領載痘不得透故多隙地內却受其殃其貫珠攢簇者梟毒衝突氣血不能駕馭一任毒之縱橫凝結成條者外見連串貫珠團結成塊者外見堆聚攢簇誠中形外信不誣也是毒頑而不鬆伏而不透猶賊之巨魁也此毒不治諸痘皆爲抗拒治不以攻治之何益巨魁授首前途不戰有銅戈之勢然世於貫珠者習矣不察

而多忽于攢簇者歸咎於命而棄絕焉興言及此亦慘甚矣無
狀其圖像或得觸目經心詳其治法或得挽回萬一未必無
補云

遊蚕

星疽貫穿成條其形如蚕故名遊蚕亦謂之繭瘡

是疽擴綴聚象似燕窩而名者也

皆有長短身主者輕頭凶者重其頭

稀所見無多者輕而可治多者則難治

疊錢

是疽圓丘攢簇絕不成點錢者

行雁行者如似遊蚕但曲而甚長且排行

多之僅見三者雖多見者輕而可治

亦以藥胞脂膏封貼更和猪尾膏大系虫

子劑內透之子毒如蒸餅其募方服

懸掛如餅其毒若化以油胭脂調入化毒
膏細糊貼更佐以猪尾膏大系虫

鼠迹是痘或内五粒或六七粒相簇如鼠跡

是疽或內五粒或七八粒相簇如鼠跡
故以是名無多者輕見于周身者重

重則必攻今相併成泡其毒方鬆劑
內調入化毒丹并猪尾膏

珠殼珠殼者其痘有頂而平四圍貼附

細密宛如珠駿無多者輒及于周身
者重七省必政務令圓滿綻尖其毒

乃
卷之三

蟹爪者貢珠連串粒細一粒尖稍有

隱七黑絲如髮竟與蠍爪無異無幾
者較繁多者每上者必攻其形統服

威條而遠奸謀
矣

卷之三

蘇沙者其痕扁濶歪斜無須無毛
細點如沙攢簇于囊宛似蘇沙可穿

也可以數紀者輕倫父者重而必敬
令高撫如焚實其毒絕化而成母

鳥跡鳥跡者連串三條頭簇脚開其

痘若鳥之跡也。單見者輕五六
處者重七者必攻亦如遊垂絲
透爲準

蛇皮叢簇成片散漫無拘形似蛇皮而名之

也見過不治或見點之初燈下照之甚

隱疾仁細密無倫滑形未形之際即更攻之
佐以指尾脅破之不使其成庶可有爲

癰底腫脹形似蛇皮不若蛇皮散漫耳隨處

皆以其形得小更難治庶可有爲速以猪

星有加入攻毒藥內者大藥虫透之急以藥

廻貼當到點令得膿水淋漓方能慶生

螺疔其頭如頭大根尖項黑形若螺肉深入子肉裡

有大小有深淺按其四圍板硬治法見于餘毒

若放點時而即見者最惡先以挑起即將膿

服之藥大人含于口中吮其數次隨用貼法

是痘瘡串環故以是名有月回鍋咀痘

卽如鍋而遠者有項以圓繫乳痘卽如圈

而聚者半臂稍輕于項則重因阻九重無

圓更重非特項省爲然頭昏亦有之凡見宣攻

蟻窩蟻窩者較疊錢而更大也另別其名者

其形大其毒亦更重也即屈指無多毒也不

漢學之首不容已佐以大藥虫猪星膏外亦以

藥膏貼之得鬆泛平抬方可成膿

紫背

焱之形似萍其色似萍之皆空而帶紫

繁多者莫救急宜攻毒破瘀務令漸淡

淡而退去方可回生必須早圖

有大有小目之有點手按無形無幾便重

繁多者莫救急宜攻毒破瘀務令漸淡

淡而退去方可回生必須早圖

覆

金

兩

截



是痘盤聚于巔頂如金之覆名曰覆
金是毒參陽位之二症也其餘疎朗明
潤者以鬆肌通聖散和猪尾膏化毒
丹治之外用胆脂膏擦貼更稠密大
熱者必加大黃令膿水腐爛其毒方化
是痘上與下綿密如鋪中股絕無一
點梟毒擁于上下氣血阻于中宮以
致上下膈截痘之最惡者也首尾一
以攻毒爲主尤以豬尾膏地龍合氣
血疏達要截處得散匕透點方可挽回

是痘盤聚于巔頂如金之覆名曰覆
金是毒參陽位之二症也其餘疎朗明
潤者以鬆肌通聖散和猪尾膏化毒
丹治之外用胆脂膏擦貼更稠密大
熱者必加大黃令膿水腐爛其毒方化
是痘上與下綿密如鋪中股絕無一
點梟毒擁于上下氣血阻于中宮以
致上下膈截痘之最惡者也首尾一
以攻毒爲主尤以豬尾膏地龍合氣
血疏達要截處得散匕透點方可挽回

蒙

頭

經

腰



是痘瘡頭貫頂有似兜帽故名蒙頭
毒參陽位之首惡也餘更稠密火熱
者不治卽則必攻與覆金同法必早圖
可挽有獨聚于天庭者亦是蒙頭餘若
疎朗明潤體不熾熱者不必用大黃
腰者腎之候也連串環繞于此緣毒伏于
腎而有此象貫殊之最惡者也餘卽疎朗
不得視為美治必以攻得此鬆摵統成一
團如豇豆莢方不為害否則痘縱可觀九
朝忽然悶亂變焦紫而斃矣



托

腮

口



領下亦腎經所屬痘瘡攢成一片是爲
托腮清氣爲其所阻頭面必不能題身
更可知痰湧氣喘可立而待從來不治
若見點之初毒勢未成以治蒙頭之法
治之亦可救三速宜封貼


雙鎖口者兩口角左右一粒較旁痘獨
大板實而無盤者是也此毒壅于脾
而有此像口乃脾之竅飲食接送之門
可令毒藏此地乎治法輕重與覆金
一轍有連串遠于上下唇畔亦是

鎖

項

攢

背




項係水穀之路呼吸出入之門痘瘡連串環繞于此是毒鎖咽喉與托腮無異咽啞水噠皆由此致但屬不救但得放點之初卽以清金攻毒飲并猪尾膏杜患于將萌容有可起
毒發于背便閼生死况痘攢簇隨地皆鹵而可令此地犯及乎攢而得鬆者以鬆肌透毒散合化瘀丹猪尾膏治之外以胭脂膏貼攢而更板壯熱如火者必攻須得腐爛方可慶生

胸

攢

腹

囊



腹近五內猶之同室與他處不同
有變症毒卽入裏捷于反掌但壯地
空隙而未得爲吉者矣未有此聚如
囊而得無恙者也治法攢背同

胸與腹俱逼近臟腑攢胸猶之囊腹
調劑之法亦與攢背同

呻吟抱膝



呻吟當喉攢簇而犯疊錢者也。若增
竇則尤重矣。呻與項皆水穀之路。呼
吸出入之門。其害與鎖項無異。鎖項
之害病在環遠。呻閼之害病在攢簇。
治法與鎖項同。更以胭脂膏貼。
兩膝攢簇如餅。毒聚於此。漿不能達
足腫而致脣子一竇。餘地無竇。更無
內症。止以鬆肌透毒散加牛膝合化
毒丹治之。并用胭脂膏貼。更多惡象
而症者必攻。



唇者脾之華脾臟安和痘不相及。溫潤不則攢聚于此有黃熟如蠟有黑突如雷有黑硬燥裂而血逆皆毒也。脾象見于唇如無他症瀉黃散合猪尾膏治之更壯熟如炮者必攻。

痘攢簇于耳後高骨是謂蒙胱亦腎經伏毒之一徵也頭面餘處皆稀止此犯忌以鬆肌透毒散加玄參合化毒丹猪尾膏治之外用貼法更調密而炮熟者必攻。