

亥 21

3-10-18

孫真人備急千金要方

一八



孫真人千金方卷之七十一

仁十

孫真人千金方卷之七十二

慈一

孫真人千金方卷之七十三

慈三

孫真人千金方卷之七十四

慈三

新真人全金石卷之六十一

新真人全金石卷之六十二

上海涵芬樓影印正統道藏本

新真人全金石卷之六十二

新真人全金石卷之六十一



南京中医药大学图书馆版权所有

孫真人備急千金要方卷之七十一

仁十

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

五痔第三

論一首
灸法二首
方二十六首

論曰夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脉痔四曰腸痔五曰血痔牡痔者肛邊如鼠乳時時潰膿血出牝痔者肛腫痛生瘡脉痔者肛邊有瘡癢痛腸痔者肛邊核痛發寒熱血痔者大便清血隨大便污衣又五痔有氣痔寒溫勞濕即發蛇蛻皮主之牡痔生肉如兒乳在孔中頗出見外妨於更衣鼈甲主之牡

痔集驗作痔

從孔中起外腫五六日自潰出膿
血猾皮主之腸痔更衣挺出久乃縮母猪左
足懸蹄甲主之脉痔更衣出清血蜂房主之
五藥皆下篩等分隨其病倍其主藥爲三分
旦以井花水服半方寸七病甚者旦暮服之

一
七十

亦可四五服禁寒冷食猪肉生魚菜房室惟
得食乾白肉病瘥之後百日乃通房內又用
藥導下部有瘡內藥瘡中無瘡內孔中又用
野葛燒末刀圭內藥中服藥五日知二十日
若三十日愈痔痛通忌草菜

方要全急備人真孫

治五痔衆醫所不能愈者方

秦苑

白芷

厚朴

紫參

亂髮

紫菀

雷丸

藁本

石南

麌蟲

各壹兩

貫衆

參兩

蟲蟲

半升

猪後懸蹄

拾肆枚

黃耆

右十三味合擣下篩以羊髓脂煎和丸如梧子大空腹飲下十五丸日二若劇者夜一服四日肛邊癢止八日膿血盡鼠乳悉癰滿六十日終身不復發久服益善忌魚



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆版权所有

猪肉等

槐子圓治燥濕痔痔有雄雌皆主之方

槐子

乾棗

秦艽

吳茱萸根白皮

各肆兩

白芷

桂心

黃芩

黃耆

白斂

牡蠣

龍骨

雷丸

丁香

木香

蒺藜

附子

各貳兩

右十六味爲末蜜丸如梧子大飲服二十

丸日三

千金翼無白斂深師無黃耆云治
苦暴有乾燥腫痛者有崩血無數

方要金千急備人真孫

小槐實圓治五十年者方

者有鼠乳附核者有腸中煩癢者二五年皆殺人主忌飲酒及作勞犯之即發

槐子參

白糖斤

礬石

硫黃各壹斤

大黃各一兩

乾櫟

龍骨各拾兩

生

生

右七味四味擣篩其二種石及糖並細切
內銅器中一石米下蒸之以綿絞取汁和
藥末併手丸如梧子大陰乾酒服二十九
日三稍增至三十九

槐子酒治同前



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆

槐子粃

槐東南枝

細剉
壹石

槐東南根

細剉
參石

右三味內大釜中以十六斛水煮取五斛
澄取清更煎取一石六斗炊兩斛黍米上
麴二十斤釀之攬令調封泥七日酒熟取

清飲適性常令小小醉合時更煮滓取汁

仁十
三

淘米及洗器不得用水須知此事忌生水
故也

又方塗熊膽取瘥止神良一切方皆不及此
又方七月七日多採槐子熟擣取汁內銅器

方要金千急備人真孫

中重綿密蓋著宅中高門上曝二十日已上
煎成如鼠屎大內穀道中日三亦主瘻及百
種瘡

又方取生槐白皮十兩熟擣丸如彈丸綿裹
內下部中此病宜常食萹竹葉及煮羹粥大
佳也

又方取鯉魚腸三具以火炙令香綿裹內穀
道中一食久蟲當出食魚腸數數易之盡三
具瘥一方炙腸令香坐上蟲出經用有效

又方虎頭

犀角

右二味爲末和不中水猪脂大如雞子塗
瘡上取瘥

治五痔及脫肛方

槐白皮

鹽

猪脂

半

棗子

桃仁

各一枚

巴豆

一枚

薰草

辛夷

甘草

白芷

各半兩

野葛

陸銖

右十味㕮咀煎三上三下去滓以綿沾膏
塞孔中日四五過蟲死瘻止癢痛大佳

治五痔方

猾皮方參大切指熏黃棗大未熟艾雞子大

右三味穿地作孔調和取便熏之口中熏
黃煙氣出爲佳火氣消盡即停停三日將
息更熏之凡三度永瘥勿犯風冷羹臘將
補慎猪雞等

十六

四

又方取槐根煮洗之

又方用桃根煮洗之

猾皮圓治療方亦治漏

猾皮

壹

礬石

連翹

乾薑

當歸

附子

續斷

乾地黃

伍兩

黃耆

各貳兩

槐子

參

右十味爲末蜜丸如梧子大飲服十五丸

日再加至四十九

集驗方無
礫石地黃

又方治崩中及痔方

猬皮

人參

茯苓

白芷

禹餘糧

乾地黃

槐耳

續斷各參
兩

蒲黃

黃耆

當歸

艾葉

橘皮

白欵

甘草

各貳兩



方要金千急備人真孫

白馬蹄

酒浸一宿
熬令黃

鰻鱺魚頭

鹿拾

猪懸蹄甲

鹿拾童
收熟

牛角鰓各半

雨

右十九味爲末蜜丸如梧子大酒服二十

丸日再稍加

治痔方

右取槐耳赤雞一斤

即是槐櫟

爲末飲服方寸

七日三

又方以蒲黃水服方寸七日三良妙

外臺云
治腸痔

每大便常
有血者

又方取桑耳作羹空腹飽食之三日食佳



南京中医药大学图书馆版权所有

治痔下血及新產漏下方

附子

好礬石
兩各壹

右二味爲末白蜜丸如梧子大酒服二丸
日三稍加不過數日便斷百日服之終身

不發

崔氏方有
乾薑壹兩

治外痔方

亦治惡瘡
瘻瘍壹兩

真珠

雄黃

雌黃

各壹兩

竹茹

參

猪膏

壹斤

右五味爲末內猪膏中和調又切亂髮半
雞子大和東向煎三上三下髮焦出其痔

先用鹽湯洗拭乾後傳之

治療下部出膿血有蟲傍生孔竅方

右以槐白皮一擔剉內釜中煮令味極出
置大盆中適寒溫坐其中如浴狀蟲悉出
冷又易之不過二三度瘥

治穀道癢痛繞緣腫起裏許欲生肉突出方

大豆

參升以水朱升急火煮取肆升

槐白皮

參升

甘草

兩參

右三味以豆汁煮取二升浸故帛薄之冷
則易日三五度

槐皮膏治穀道癢痛痔瘡方

槐皮

棟實

各伍兩
臺作塵
或外

甘草

刪繁用
蜂房

白芷

各貳兩

桃仁

陸拾枚

赤小豆

貳合

當歸

參兩

右七味㕮咀以成煎猪膏一斤微火煎白
芷色黃膏成取摩瘡上日再并導下部

六十

六

方無當歸治腎勞虛或酒醉當風所損
藏病所爲肛門腫生瘡因酒勞傷發瀉清
血肛門疼

刪繁

治穀道痛方

右用菟絲子熬黃黑和雞子黃以傅之日



南京中醫藥大學

1951

南京中醫藥大學圖書館版權所有