

醫方選要卷之十目錄

折傷門

附論

傷原活血湯

加味芎歸湯

破血散

調經散

止痛當歸散

禁聲飲子

沒藥降聖丹

花蕊石散

接骨散

導滯散

沒藥乳香散

如聖散

定痛乳香散

紅圓子

塞上方

至真散

紫金皮散

生肌膏

接骨定痛紫金丹

接骨藥

婦人門

附論

四物湯

柴胡四物湯

八物湯

大溫經湯

逍遙散

加味吳茱萸湯

紅花當歸散

伏龍肝散

六神湯

延胡索湯

柴胡散

斷下湯

涼血地黃湯

膠艾湯

紫石英圓

黃附萬安圓

內補當歸圓

勝金圓

滋補煖宮圓

神仙聚寶丹

濟陰丹

烏雞煎圓

通經圓

替灸圓

備金散

當歸煎

艾煎圓

黃附圓

秦桂圓

驗胎法

桑寄生散

白朮散

竹葉湯

鯉魚湯

安胎飲

茯苓半夏湯

參橘散

安胎和氣飲

紫蘇飲

芩藳補中湯

安胎散

平安散

芩歸湯

人參當歸散

抵聖湯

連翹湯

如聖膏

黑神散

調經散

神應黑散

牛膝湯

玉露散

三之一湯

失笑散

小兒門 附論

益黃散

人參和中散

藜蘆白朮散

惺惺散

錢氏白朮散

人參羌活湯

實勝散

異功散

星香散

銀白散

瀉白散

瀉黃散

加味四聖散

紫草木香湯

黃芩甘草湯

如聖湯

消毒加味犀角飲

木香散

異功散

人參麥門冬飲

七香圓

香砂保安圓

天麻防風圓

五福化毒丹

助胃膏

加味盧會圓

木香圓

香礬圓

涼驚圓

固真湯

太安神圓

大青膏

開關散

活血散

萬金散

人齒散

五疳消食圓

抱龍圓

肥兒圓

暖驚餅子

香橘餅子

五疳保嬰圓

大盧會圓

虎睛圓

金箔鎮心圓

硃砂圓

醫方選要卷之十目錄畢

醫方選要卷之十針灸起其脊骨惡血

折傷門

良醫副臣周文采編集

折傷者謂其有所損傷於身體也或為刀斧所傷或墜墮險地或打撲身體損傷筋骨皮肉皆能使出血不止或瘀血停積於臟腑結而不散去之不早則有入腹攻心之患治療之法當視其所損輕重若血不止者外宜敷貼之藥內宜和散之劑血蓄於內者宜下去之然後調理必以順氣活血止痛和經使無留滯氣血之患此其要畧也若夫揅折筋骨及出腸傷胃其用接縛縫補之法則有專門者在茲不備述

傷原活血湯

治從高墜下惡血流於脇疼痛不可忍

大黃

酒浸五錢

柴胡

去苗

當歸

各錢

桃仁

五十箇研如泥

紅花

半錢

天花粉

穿山甲

炮

甘草

各錢一

右作一服用水二鍾酒半鍾煎至八分食前服

加味芎歸湯

治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血

如豆汁

川芎

當歸

芍藥

百合

水浸一日

荊芥

各二錢

右作一服用水一鍾半酒半鍾煎至八分不拘時服

破血散

治乘馬損傷跌其脊骨惡血流於脇下其疼

苦楚不可轉側

羌活

防風

肉桂

各一錢

水蛭

炒煙膏研半錢

柴胡

當歸

稍

連翹

各二錢

麝香

少許另研

右作一服用水一鍾酒一鍾煎至一鍾去滓入水蛭

麝香末調勻不拘時服

調經散 治跌撲損傷後疎利服此藥調理

川芎

當歸

芍藥

黃芪

各一錢半

青皮

烏藥

陳皮

熟地黃

乳香

另研

茴香

各一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

止痛當歸散

治打撲損傷腫痛不可忍

粟殼

去蒂隔四兩

白芷

二兩

甘草

炙一兩半

乳香

沒藥

各少許

煎好去粗方入

研待藥

右咬咀每服三四錢水一大盞酒半盞煎至八分入

乳香沒藥末少許不拘時溫服

禁聲飲子

治棒瘡刀刃傷疼痛不可忍

防風

去蘆

南星

湯泡各等分

右咬咀每服五錢水酒各一鍾生薑一塊煎至八分

食遠溫服日三服効若爲細末名玉真散定風散專

治破傷風及風狗咬神効每服二錢用溫酒調服或

敷慘瘡上亦妙此藥起死迴生神効不可具述

沒藥降聖丹

治打撲傷損筋斷骨折攣急疼痛不能

屈伸及榮衛虛弱外受風邪內傷經絡筋骨緩縱皮
肉刺痛肩背拘急身體倦怠四肢少力

沒藥

別研

當歸

酒浸焙

白芍藥

骨碎補

鹽去毛

川烏頭

生去皮

自然銅

火煨醋淬十二次研為末水飛過焙各一兩

生地黄

川芎

各一兩半

右為細末以生薑自然汁與煉蜜和圓每一兩作四

圓每服一圓搥碎用水酒各半鍾入蘇木少許煎至

八分去蘇木空心服

花蕊石散 治一切金刀折傷打撲身體血出急於傷

處搽藥如有內損血入臟腑熱煎童子小便入酒少

許調二錢服之立効若牛舐腸出不損者急送腸入

用細絲或桑白皮爲線縫合肚皮縫上搽藥血止立

活如無桑白皮用麻線縫之亦可並不得封裹瘡口

恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後搽藥婦人產後

敗血不盡惡血奔心胎死胎衣不下並用童子小便

調服

花蕊石

一兩搗爲粗末

硫黃

上色明者四兩搗爲末

右二味和勻先用紙筋和鹽泥固濟罐子一箇候乾

入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚上上書八卦五行字用炭一秤籠壘周圍於巳時午時從下着火令漸漸上徹直至經宿火冷炭消又放經宿鏹冷取出細研磁瓶內盛依前法服

接骨散 治從高墜下及馬上折傷筋骨碎痛不可忍

者此藥能接骨續筋止痛活血

鵬砂半錢

水粉

當歸

各二錢

右爲細末每服二錢煎蘇木湯調下服後時時進蘇木湯

導滯散

治重物壓傷或從高墜下或吐血不能禁止

或瘀血在內胸腹脹滿喘促氣短

當歸

大黃

各二兩

右爲細末每服三錢不拘時溫酒調服一方加麝香

少許

沒藥乳香散 治打撲傷損痛不可忍者

白木

炒五兩

當歸

焙

白芷

沒藥

另研

肉桂

去皮

乳香

另研

甘草

炙各一兩

右爲細末入乳香沒藥研勻每服二錢不拘時溫酒

調下

如聖散 治破傷風止血定痛

蒼朮 六兩

川烏 炮去皮

兩頭尖 炮各四兩 草烏 炮去皮

防風 去蘆

細辛 各二兩半

白朮 川芎

白芷 各一兩半

蝎梢 微炒

雄黃 各半兩

右爲細末每服一錢不拘時溫酒調下

定痛乳香散 專治金刀所傷并折骨打撲傷損

乳香

沒藥 各二錢

敗龜板 一兩 紫金皮 二兩

當歸 酒

虎骨 酥炙

骨碎補 各半兩 穿山甲 火炮

半兩錢 五箇又無以自然銅代之火煨醋淬

右爲細末每服一錢好酒調服病沉服二錢損上者

食後服損下者食前服

紅圓子 治打撲傷損骨碎筋斷疼痛痺冷內外俱損
不問年月日久瘀血留滯外腫內痛肢節拘攣一應
傷損並宜服之常服補損堅筋骨滋血生力神效
不可具述孕婦勿服

牛膝

酒浸一宿

川烏

炮

南星

醋煮三次

細辛

洗去苗

何首烏

煮

桔梗

去蘆

山桂

去粗皮

當歸

白欬

赤芍藥

沒藥

別研

骨碎

補

羌活

去蘆

赤小豆

自然銅

醋淬七次別研

右藥十五味各等分爲細末酒糊爲圓如梧桐子大
每服五十圓隨病上下服之溫酒食遠送下

塞上方 治墜傷撲損瘀血在內煩悶

蒲黃爲末每服三錢空心熱酒調服

玉真散 治諸瘡口入風爲破傷風項強牙關緊急欲

死者

防風

南星 各二兩

右爲細末每服三錢童子小便一大鍾煎熱調不拘

特服

紫金皮散 治打撲傷損金刀箭鏃傷處浮腫用此

紫金皮 醋炒 南星 半夏 川當歸

黃蘗 鹽炒 草烏 炮 川烏 炮 杜當歸

川芎

烏藥

破故紙

川白芷炒

劉寄奴

川牛膝

桑白皮各等分

右為細末生薑薄荷汁無水調傅腫處或傷處皮熱

甚加黃蘗皮生地黄半兩有瘡口者勿封瘡口四邊

傳之

生肌膏 治金瘡及一切打損瘡

胡粉

白芍藥

薰陸香

乾薑炮各一兩

油四兩

黃蠟一兩

右為細末以油蠟相和煎如膏用貼瘡上日二換之

接骨定痛紫金丹 治打撲傷損筋骨斷折