

孫思樞要 卷九、十
十一、十二



吳郡薛鑑集

薛已驗

江都吳中珩校

吐血

武進王鳳岐重校

經曰清者為榮濁者為衛榮行脈中衛行脈外益榮者水穀之精氣也。和調於五臟灑陳於六腑故能入於脉夫榮者陰血也所主在心統化在脾藏內在肝宣布在肺輸泄在腎灌潤一身滋養百脈諸經由此而生毓焉然血之所統者氣也故曰氣主煦之是以氣行則血行氣止則血止陽生陰長天晴人旺小兒患之多因稟賦積熱或食膏梁厚味或乳母七情鬱火所致治法若氣虛血弱當以人參補之陽旺則陰生血也若四物湯者獨能主血分受傷為氣不虛也若左寸關脉數而無力血虛也四物湯加參木浮而無力氣虛也補中益氣湯尺脉數或無力腎虛也六味地黃丸右寸關脉數而有力者肺胃熱也犀角地黃湯後用四物湯加參苓白术尺脉數而無力陰虛也用六味地黃丸若面黃目澀眵多手麻者脾肺虛也用黃芪芍藥湯。

治驗

一小兒年十餘歲鼻衄肝脉弦數肝藏血此肝火血熱而妄行用小柴胡加山梔龍膽草四劑而血止。又用四物芩連蘆薈山梔甘草作丸服又以地黃丸滋腎水生肝血而愈。

一小兒久鼻衄右顎鼻准微赤此脾胃傳熱於肺而不能統也先用六君桔梗當歸山梔而血止次用人參黃芪故以調補脾肺而愈。

一小兒壯熱吐血或兼衄血右顎鼻准赤色乃肺胃積熱用濟生犀角地黃四劑而血止後因母飲酒復作用清胃散母子服之而愈。

一小兒吐血不止。鼻准赤色。審其乳母有鬱熱。用加味歸脾湯加味逍遙散。母子並服。各數劑。血止。又用八珍湯加柴胡牡丹皮而愈。

一小兒因母屢恚怒。發熱吐血。或時衄。用加味小柴胡湯之類治其母。並愈。後其母因勞役。乘怒氣致。兒患驚搐。或用抱龍丸。又加吐血子以加味道逍遙散。母子並愈。厥後乳母仍勞役。發熱。此兒即驚搐。或吐血。或衄。血母用補中益氣湯子。用犀角地黃湯頓愈。

一小兒十歲。因傷厚味。吐血。用濟生犀角地黃湯解食毒。清胃熱。又用四君。牡丹皮升麻調補脾胃而愈。惟肢體倦怠。兩手作麻。用黃芪芍藥湯數劑而安。

一小兒吐血。因乳母火鬱發熱。兩脇作痛。後吐血。以加味歸脾湯加吳茱萸。製黃連治母。兌不時飲數匙。月餘並愈。後母因怒吐血。寒熱。兜亦吐血。先用加味小柴胡湯二劑。後用加味道逍遙散治其母。愈。一女子年十四歲。因驚寒熱。發搐。服鎮驚之藥。更吐血。尋衣撮空。身如炙。煩燥不眠。飲食不入。脈洪大而無倫次。按之豁然而空。用加減八味丸料二劑。諸症悉退。脈息按之如線。無氣以動。用人參一兩。前服不應。仍用人參一兩。附子五分。二劑元氣頓復。

一女子十三歲。因怒吐血。咬牙發搐。用加味道逍遙散。加鈎藤鈎而愈。次年出嫁。懷抱鬱結。胸滿食少。吐血面赤。此因肝火動而血熱。氣虛而不能攝血也。用六味丸及歸脾湯。加山梔貝母而愈。

一小兒十四歲。發熱吐血。屬足三陰虛。余謂宜補中益氣。以滋化源。不信。仍用寒涼降火。前症愈甚。或謂曰。小兒未有室。何腎虛之有。參芪補氣。奚為用之。余述丹溪亦生云。腎主閉藏。肝主疏泄。二臟俱有相火。而其系上屬於心。心為君火。為物所感。則相火翕然而起。雖不交會。而其精亦暗耗矣。又褚氏云。男子精未滿而御女。以通其精。則五臟有不滿之處。異日有難狀之疾。正此謂也。遂用補中益氣湯。及六味地黃丸而痊。

黃氏芍藥湯治衄多歲。面黃眼澀。多眵手麻。

黃芪

甘草

升麻

葛根

芍藥

一兩各羌活一兩

右每三錢水煎服

愚按此手足太陰陽明藥也。然血虛久則陽亦虛矣。故血不足則麻木。陰虛大動變症百出。實非風寒此出升陽滋陰例。

人參當芪散治虛勞客熱。消瘦倦怠。口燥咽乾。日晡潮熱。五心煩熱。盜汗胸滿。食少作渴。咳唾時有膿血。

天門冬二兩半夏

知母炒

桑白皮

赤芍藥炒

黃芪炒

紫苑

甘草炙略

白芩丸

柴胡

秦艽

生地黃

熟地黃

地骨皮略

人參

桔梗略一

鼈甲

右剉散

每服三五錢水煎服

大人亦得一方有生薑

加味小柴胡湯

小柴胡湯方見

四物湯

方見

加味歸脾湯

加味小柴胡湯

小柴胡湯方見

清胃散

加味歸脾湯

加味小柴胡湯

加味逍遙散

四君子湯

六君子湯五

八珍湯

即四君四物

濟生犀角地黃湯

方見

虛羸

六味九

方見

補中益氣湯

方見

虛羸

仲陽云：小兒虛羸，因脾胃不和，不能乳食，使肌體瘦弱，或大病後，脾胃氣尚弱，不能傳化穀氣所致。若冷者時時下利，唇口清白，熱者身溫壯熱，肌體微黃，更當審其形色，察其見証，如面赤多啼，心之虛羸也；而青目劄肝之虛羸也；耳前後或耳下結核，肝經虛火也；頸間肉裏結核，食積虛熱也；面黃痞滿，脾之虛羸也；面白氣喘，肺之虛羸也；目睛多白，腎之虛羸也。仍審相勝而藥之。又寒熱二症，不可不辨。若腹痛瀉利，利清白不渴喜熱，此屬熱症，雖在冬月，宜木香丸。身熱煩躁，瀉利焦黃，作渴喜冷，此屬熱症，雖在冬月，宜胡黃連丸。皆捨時從症之治法也。

治驗

一小兒十三歲，面赤驚悸發熱，形體羸瘦，不時面白，噯氣下氣，時常停食，服保和丸及清熱等藥，余曰：

面赤驚悸心神怯也。面白噯氣心火虛也。大使下氣脾氣虛也。此皆稟心火虛不能生脾土之危症。前藥在所當禁者不信又服枳木丸鎮驚等藥而諸症益甚。大便頻數小腹重墜脫肛痰涎飲食日少。先用六君子湯為主。佐以補心丸。月餘飲食少進。痰涎少止。又用補中益氣湯送四神而愈。華姪後方復作墜時至仲冬。面白或黧色。手足冷。喜食胡椒薑物。腹中不熱。脈浮。按之微細兩尺微甚。乃用八味丸。元氣復而形氣漸復。年至二十。苦畏風寒。面目赤色。發熱吐痰。唇舌赤裂。食椒薑之物唇口即破爛。熱愈甚。腹中怯不熱。診其脉或如無或欲絕。此寒氣逼陽於外。內真寒而外假熱也。仍用八味丸而諸症頓愈。

一小兒八歲面常青色。或時色赤。日間目劄。夜睡咬牙一年餘矣。服清肝降火之藥益甚。形氣日羸。余考績列京求治於余曰。肝主五色。入心則赤。自入則青。蓋肝屬木而生風。故肝氣為陽為火。肝血為陰為水。此稟肝腎精血不足。虛火內動。陰血益虛。虛而生風。風自火出。故變面赤目劄等症耳。非外風也。遂用地黃丸以滋腎水。生肝木。兩月目劄咬牙悉止。又二月許諸症尋愈。而元氣亦充矣。凡肝木之症。若肝木實熱。生風而自病。或肺金實熱而耗木者。宜用清肝降火之劑以瀉其邪氣。若肝經風熱而目直等症。用柴胡梔子散以清肝火。加味四物湯以養肝血。若腎虛而咬牙諸症。用六君子湯以健脾胃。六味地黃丸以滋腎水則愈。

一小兒脾氣虛弱。飲食停滯。發熱作渴。服瀉黃散不時下痢。余先用保和丸二服而愈。但不食惡心。面白冷。又用六君柴胡升麻四劑。面色逐黃。食進手溫。惟形體羸甚。倦怠發熱。小腹重墜。肛門脫出。用補中益氣湯加半夏肉豆蔻二劑而安。凡脾胃之症。若發熱作渴。飲食喜冷。或泄瀉色黃。睡不露睛者。屬形病。但養胃宜用瀉黃散疏導之。若發熱口乾惡冷。或泄瀉色白。睡而露睛者。屬形病。但虛宜用異功散調補之。若脾氣下陷者。補中益氣湯。寒水侮土者。益黃散。肝木犯脾者。六君加柴胡。若目睛微動。朝熱抽搐。吐瀉不食。宜用祕旨保脾湯。凡小兒諸病。先當調補脾胃。使根本堅固。則諸病自退。非藥所能。

盡祛也

一小兒五歲形氣虛羸睡中咬牙夜間遺尿日間頻數余以為稟腎氣不足用補中益氣湯加補骨脂地黃丸加鹿茸以補脾胃而痊畢姻後小便頻數作渴發熱日晡益甚恪服黃柏知母等藥以滋陰降火後患腎痿卧床年許余因考績北上仍用前藥喜其慎疾半載而痊

一小兒年十一歲面白或亦足軟不能久行用地黃丸加鹿茸年許而瘥畢姻後兩目羞明兩足軟用前丸及補中益氣湯而痊後病復發增口渴足熱頭顛覺開視物覺大此腎虛瞳人散大而然也服前藥遠房事則愈因不自保終患腎痿而沒仲陽先生云此症屬腦髓不足不能營養且用地黃丸補之有至七八歲或十四五歲氣血既盛而自合若繼盜色發戰賊真陰亦不盡其壽矣

一小兒體素虛弱患咳嗽痰涎服化痰藥而痰益甚余以為脾虛食積大用六君子神曲山楂漸愈後傷風咳嗽腹脹不食泄瀉峻臭此食滯傷脾而肺氣虛也用六君子桔梗而愈又飲食停滯嘔吐痰涎喘嗽面白余謂脾虛不能消化飲食而為痰肺虛不能攝氣歸源而作喘仍用六君子湯而愈大凡腠理不密外邪所感而肺病者因脾胃氣虛不能相生必用六君子湯若脾胃氣實大腸不利而肺病者用瀉黃散若心火炎燒肺金而喘嗽者用地黃丸

一小兒形瘦不時咳嗽自用參蘇散一劑更加喘急驚搐面白或黃余謂此稟脾胃不足而形氣虛羸因前劑峻利外邪雖去而肺氣益虛肺虛則具補脾先用異功散加桔梗鈎藤鈎一劑痰喘頓定乃去桔梗加半夏當歸再劑驚搐亦去又加酸棗仁治之而安年十五歲發熱瘧疾作渴面白形體羸瘦用地黃丸加五味子及補中益氣湯各百餘劑而形氣漸壯若認為陰大用黃柏知母等藥復傷生化之源其亦不治者矣

一小兒五歲尚飲乳耳前後頸間至缺盆以手推尋其筋結小核如貫珠隱於肌肉之間小便不調面色青黃形氣羸瘦此稟母之肝火為患用九味瀉心丸五味異功散加山梔柴胡與兒飲之又以加味

逍遙散與母服之尋愈

仁學指掌卷之九

一小兒患虛羸耳出微水左手尺關洪數而無力余為清肝補腎耳中雖愈脉未全歛畢姻後患三癰症誤服黃柏知母之類復傷元氣不勝寒暑勞役無日不病幾至危殆余大補脾腎滋養元氣而愈一小兒患症如前肢體消瘦面色萎黃大便酸臭此脾虛食積用四味肥兜丸五味異功散治之而愈一小兒體瘦腹大寒熱嗜卧作渴引飲以白朮散為主佐以四味肥兜丸諸症漸愈乃以異功散六味丸月餘而安

一小兒患痘瘡身熱如炙此肝疳之症也朝用異功散夕用四味肥兜丸諸症稍愈佐以歸脾丸數服而痊

一小兒停食發熱服芩連三棱等劑飲食日少胸腹膨脹體羸瘦余謂脾虛飲食停滯元氣復傷先用補中益氣湯加木香釣膝鈎數劑漸愈又用六君子炮薑調理而安

一小兒虛羸昏倦咳嗽驚悸自用參蘇散一劑更加喘急此肺氣虛而妄發表也用惺惺散微解外邪調和胃氣諸症頓愈但手足逆冷又用六君子湯調補元氣而安

一小兒九歲吞酸惡食肌體消瘦腹中數痛余謂食積虛羸也用保和丸而愈後腹中數痛皆服保和丸余曰此因脾胃虛而飲食所傷也當調補脾土以杜後患不信後腹痛喜按全用五味異功散二劑因未應自用平胃散等藥腹脹作痛余仍以異功散加木香四劑而愈若屢用攻伐之劑陰損元氣多致虛羸深可慎也

參芩白朮散治脾胃虛弱飲食少心中滿痞噫心忪氣喘嘔吐泄瀉

白蘿豆二兩半當歸半錢人參

白茯苓

甘草炒

山藥各三兩半

蓮肉

桔梗炒黃

薏苡仁

宿砂仁略二

右為末每服一錢棗湯調下

地黃丸加肉桂一兩名治小兒肝經虛熱血燥或風客淫氣而患瘰疬結核或四肢發搐眠目抽動痰涎地黃丸加肉桂一兩名治小兒肝經虛熱血燥或風客淫氣而患瘰疬結核或四肢發搐眠目抽動痰涎

上湧又治腎疳腦熱消瘦。手足如冷寒熱往來滑瀉腹脹口鼻乾渴齒齦潰爛爪黑面黧黃遍身兩耳生瘡或兩耳出水或發熱自汗盜汗便血諸失瘡等症其功不可盡述即六味地黃丸方見腎篇

補中益氣湯治中氣虛弱體疲食少或發熱煩渴等症

人參

黃芪各八

白朮

甘草

陳皮各五

升麻

柴胡各二

當歸錢

右薑棗水煎去滓分午前服。

愚按前方若因藥尅伐元氣虛損惡寒發熱肢體倦怠飲食少困或兼飲食勞倦頭痛身熱煩渴作渴脉洪大弦虛或微細軟弱或寸關獨甚者宜用之。凡久病或過服尅伐之劑虧損元氣而虛症悉具者最宜前湯若母有脾胃不足之症或陰虛內熱致而為患者尤宜用之。

錢氏異功散治脾胃飲食少困吐瀉不食或驚搖痰盛或睡而露睛手足指冷或肺脾虛弱咳嗽吐痰或虛熱

愚按前方治脾胃虛弱吐瀉不食或驚搖痰盛或睡而露睛手足指冷或肺脾虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母脾胃虛弱患此症亦當服之。

四君子湯治脾氣虛損吐瀉少食肌肉羸瘦加附子一錢

保和丸治飲食停滯胸膈痞滿噯氣吞酸或吐瀉腹痛加白朮一兩助大安丸

神曲炒

山楂

半夏

茯苓各一

陳皮

連翹

蘿蔔子各五錢

右為

米粥九桐子大每服三十九白湯送下

愚按前方行氣尅滯之劑若元氣無虧暴停乳食而致斯症者宜用此消導之。若元氣虛弱而乳食所傷者必調補胃氣為主而佐以消導。若乳食已消而作嘔者乃胃氣被傷當用異功散補之不宜仍用前藥重損胃氣治者審之。

肥兒丸治肝肺食積肢體消瘦二便不調

黃連

神曲

木香各一兩

檳榔二十

肉豆蔻一兩

史君子酒浸一兩

麥芽各四

右為末。

神曲糊丸麻子大每服二三十九粒飲下。

愚按前方若食積五疳發熱口乾大便不調小便不清或頸項結核髮稀成穗寒熱作渴宜用之。蓋脾胃稍虛者用五味異功散兼服虛甚者異功散為主佐以前藥。

枳术丸方見

六君子湯方見

四神丸方見

八味丸方見

柴胡梔子散

四物湯方見

九味蘆薈丸方見

加味逍遙散方見

白朮散方見

蛔蟆丸方見

加味逍遙散方見

白朮散方見

胃氣虛寒

經曰胃為水穀之海六腑之大源也人身氣血腑臟俱由胃氣而生故東垣之法一以脾胃為主所謂補腎不若補脾正此意也。在小兒難得乳食水穀之氣未全尤仗胃氣。胃氣一虛則四臟俱失所養矣。故丹溪謂小兒多肝脾之疾也。若面色㿠白目無睛光口中氣冷不食吐水肌瘦腹痛此胃氣虛寒之症。用五味異功散或六君子湯主之。若大便不實兼脾虛也。加乾姜溫之中滿不利脾不運也。加木香開之。臺零便祕胃實熱也。用瀉黃散涼之。命門火衰不能生土者用八味丸補之。稟賦胃氣不足亦用此丸益下焦真陽充盛則上生脾元自能溫蒸水穀矣。

治驗

一小兒傷食吐濁不已後便泄青色睡而露睛手足指冷額黑唇青余謂大便青色木勝土也或時溏泄脾氣不足也。額黑唇青寒水侮土也悉屬中氣虛寒用五味異功散加升麻柴胡木香附子一劑而愈。一小兒盛暑嘔吐飧泄服黃連香薷飲益甚用白虎石膏湯而腹脹止痛手足並冷余謂脾氣虛寒且夏月伏陰在內也用五味異功散加木香而愈。

一小兒因傷乳食雜用消導之藥遂變利久而不愈先用一君加木香而漸全後用五味異功散而全



愈

一小兒手足常冷。腹中作痛。飲食難化。余謂胃氣虛寒也。先用益黃散二服。痛止。次用六君子湯數劑即愈。

一小兒九歲。素畏風寒。飲食少思。至秋冬口鼻吸氣陰冷。至腹手足如水。飲薑湯及燒酒方快。其脈細微兩尺。如無。余謂此稟命門火衰也。用還少丹不應。改用八味丸。旬餘諸症即愈。

平胃散治脾胃不和。不思飲食。心腹脹痛。口苦短氣。惡心。嘔氣吞酸。面黃體瘦。嗜卧。體痛。霍亂。吐瀉等症。厚朴薑十製陳皮五兩

甘草炙略一兩蒼朮麸八兩

右為末。每服二錢。薑棗水煎沸湯點服。亦得。

常服調氣緩胃。化宿食消痰飲辟。四時不正之氣。

愚按前症。若乳食停滯。嗳腐吞酸。嘔噦恶心者。宜服是方。若飲食既消。脾胃虛弱。嘔吐恶心者。則宜用君子湯。

調中丸治脾胃虛寒。

白术

人參

甘草五分

芍藥

八味地黃丸。即六味地黃丸加肉桂附子各一兩。治稟賦命門太衰。不能生土。以致脾土虛寒。或飲食少思。及食而不化。腹中疼痛。夜多澁溺等症。內經謂益火之源。以消陰翳。此藥也。

錢氏益黃散。脾散補治脾胃虛冷。吐瀉方見

愚按前方。若脾土虛寒。或寒水侮土。而嘔吐泄瀉。手足並冷。或痰涎上湧。睡而露睛。不思乳食者。宜用此方。若脾土虛弱。吐瀉者。用六君子湯。如不應。或手足俱冷者。屬虛寒。加木香炮薑。若因乳母脾虛肝侮。亦治以前藥。若乳母鬱怒。致兜患前症者。其母兼服加味道遜湯。

瀉黃散。肺瀉。

觀音散。嘔吐。

銀白散。方見慢驚

歸脾湯

異功散

六君子湯。三方見

食積寒熱

小兒食積者。因脾胃虛寒。乳食不化。久而成積。甚症至夜發熱。天明復涼。腹痛膨脹。嘔吐。夜寐足冷。腹熱喜睡。神昏。大便酸臭是也。有前症而兼寒熱者。名曰食積寒熱。若食在胃之上口者。吐之。胃之下口者。渴之。腹痛痞脹。按之益痛者。下之下。後仍痛。按之則止者。補之。夾食傷寒者。先散之。用參蘇飲。熟其寒。必者先利之。用大柴胡湯。如無外感。但口傷食。不至於甚。保和丸調之。蓋脾為至陰之藏也。故凡脾病者。至夜手足並冷。喜熱飲食。此中州虛寒也。宜溫之。大便欲去不去。脾氣下陷也。宜升之。若夜間或侵晨泄者。脾胃俱虛也。用四神丸。手足並熱。作渴飲水者。脾胃實熱也。用瀉黃散。大便祕結。用大柴胡湯。子足雖熱。口不作渴。大便不實者。用白朮散。仍參腹痛腹脹。積痛滯治之。

治驗

一小兒傷食腹脹。胸滿有痰。余用異功散而痊。後復傷食。腹脹作痛。或用藥下之。痛雖止而脹益甚。更加喘粗。此脾氣傷而及於肺也。用六君桔梗調補而痊。

一小兒腹脹惡食。寒熱惡心。症類外感。余曰。氣口脉大於人迎。此飲食停滯也。用保和丸一服。諸症頓退。但腹脹未已。用異功散而痊。

一小兒傷風咳嗽痰湧。用六君桔梗桑皮杏仁而愈。後飲食停滯。腹瀉脹痛。又用六君加山楂厚朴。而安復停食。作嘔或用藥下之。更加咳嗽。余謂此脾肺益虛。欲行調補。彼以為緩。乃服發表吐滯之藥。前症益甚。更加搖頭。余用天麻散。倍加釣藤鈎及異功散而愈。

一小兒胸腹脹痛。夜熱。以手按腹即哭。此飲食停滯也。先用保和丸一服。前症即愈。更加煩渴。按其腹不哭。此宿食去而脾氣未復也。用五味異功散。加柴胡治之而瘳。

一小兒飲食停滯。服消導之劑。飲食既清。熱尚未退。此胃經虛熱也。用六君子加升麻柴胡四劑而愈。

一小兒先因飲食停滯服吐伐之藥。更加腹痛。按之則止。余用六君子湯而愈。後復傷食。服保和丸。及三稜檳榔之類。更加腹重。善噫。此脾氣虛而下陷也。仍用前湯加升麻柴胡木香而愈。

一小兒面色青白。飲食難化。大便頻泄。或用消積化痰等藥。久不愈。余謂脾胃虛弱也。用六君子湯漸愈。或以為食積宜驅逐之。遂反作濁痰喘發。瘡余謂脾氣復傷。不能生肺。肺虛不能平肝。而作瘧症。先用六君加釣藤鈎。飲食少進。又用五味異功散。加當歸升麻而愈。

一小兒患前症。腹痛服攻下之劑。發熱不已。大便不化。按其腹不痛。與冷水不飲。此食積去而脾氣虛也。用五味異功散。加當歸升麻而愈。

三黃枳术丸治傷肉濕。麩辛辣味厚之物。致填塞閼亂不快。

枳實

炒

五錢

黃連

炒

酒浸

大黃

炒

一錢

白术

略

一

黃芩

錢

右為末。湯浸飴餅為丸。如桑豆大。每

服五十九。白湯下。臨時量所傷多少。加減服之。

大柴胡湯

方見
瘦症

四神丸

方見
驚濁

五味異功散

二方見
內訌

瀉黃散

方見
脚癰

保和丸

方見
虛羸

加減腎氣丸

方見
腹脹

白术散

方見
精餽

天麻散

方見
頭暈

白芍

方見
內訌

腫脹

經曰。至陰者腎水也。少陰者冬脉也。其本在腎。其末在肺。皆積水也。又曰。腎者胃之關也。關門不利。故聚水而從其類也。上下溢於皮膚。故附腫脹大。上為喘呼。不得卧者。標本俱病也。丹溪云。惟腎虛不能行水。脾虛不能制水。胃與脾合。又胃為水穀之海。因虛而不能傳化。腎水泛濫。反得以浸清脾土。於是三焦停滯。經絡壅塞。水滲於皮膚。注於肌肉。而發腫也。其狀目胞上下微起。肢體重着。喘咳。怔忡。股間清冷。小便澀。苔皮薄而光。手按成窟。舉手即滿是也。古方有十種論症。以短氣不得卧為心水。兩脇紫痛為肝水。大便鶯溏為肺水。四肢苦重為脾水。腰痛足冷為腎水。口苦咽乾為胆水。下虛上實為大膀水。腹急肢瘦為

膀胱水小便關泄為冒水。小腹急滿為小腸水。又有濕氣毒氣傷寒後濁利後氣虛者之五腫及疳氣。癥積鎖肚胸膈作膨脹氣虛冷積者之七脹亦當詳之。其受濕氣者由脾胃之氣敦阜四肢頭面皆脹。食毒者脾傷積毒停閑於胃也。傷寒下早者邪氣乘虛而入也。濁利後者脾氣虛也皆宜先調胃氣次可治腫其患七脹皆中血氣不足。臟腑怯弱表裡俱虛邪正相亂以致四肢浮腫腹肚膨滿亦當先調榮衛分別陰陽治法宜補中行氣利小便凡有熱者水氣在表也可汗之身無熱者水氣在裏也宜下之。腰已上腫宜利小便腰已下腫宜發汗此仲景之法也。若遍身腫煩渴小便赤澀大便祕結此屬陽水遍身腫不渴大便溏泄小便清利此屬陰水陽水兼陽症者脉必浮數陰水兼陰證者脉必沉遲氣若陷下宜用二陳加升提之藥如腹脹少加木香調之。若朝寬暮急屬陰虛朝用四物湯加參。夕用加減腎氣丸。朝急暮寬屬陽虛朝用六君子湯夕用加減腎氣丸。朝暮皆急陰陽俱虛也用八珍湯主之。真陽虛者飲用八味地黃丸。夕用補中益氣湯。若肚腹痞滿肢體腫脹手足並冷飲食難化或大便泄濁呼吸氣冷者此真陽衰敗脾肺腎虛寒不能司攝而水泛行也。急用加減腎氣丸否則不治惟調補脾土多有生者。

治驗

一小兒傷食膨脹服冠代之劑小便澁滯改服五苓散小便益閉四肢頓腫余謂脾胃虛寒不能通調水道下輸膀胱故也。朝用加減金匱腎氣丸夕用補中益氣而愈。

一小兒患前症小便頻赤盜汗發熱朝間用補中益氣湯午間用五味異功散晚間用六味地黃丸而愈後作功課太勞盜汗發熱用八珍湯六味丸而痊。

一小兒患前症飲食少乏大便不實先用補中益氣湯又用五味異功散而愈畢姻後復發更手足並冷飲食難化或吞酸噯腐用六君子炮薑而痊後又發用八味地黃丸補中益氣湯而痊。

一小兒小腹脹溼小便澁滯午前為甚以補中益氣湯加木香與朝服以五味異功散加升麻柴胡與夕服兩月餘而愈後飲食失節腹脹發酸用五味異功散四味茱萸丸而痊畢姻後復患如前更惡寒

腹令小便清頻大使不實手足並冷。用補中益氣湯八味地黃丸而尋愈。

二陳湯

寒噏

五苓散

方觀

八珍湯

即十全大補湯去黃

肉桂方見自汗

六君子湯

附鉗

加減腎氣丸

腹脹

八味地黃丸

方觀

補中益氣湯

勸觀

蛇蟲

巢氏云。蛇蟲者。九蟲之一也。長尺許。或五六寸者。因臟腑虛弱。及食甘肥而動。其動則腹中疼痛。或乍或輒口吐涎水。貴心則死。用使君子丸之類。下之。錢仲陽云。吐水不心痛者。胃冷也。吐沫心痛者。蟲病也。如癩相似。但目不斜。手不搖耳。安蟲散主之。田氏云。蟲痛者。喘哭危仰坐卧不安。自按。腹時時太白面白。青黃唇色兼白。目無睛光。口吐涎沫也。若因胃冷。即吐。用理中湯加炒川椒五粒。橘榔五分。煎下烏梅丸。古云。蟲蝕上部。則上唇有白點。蟲蝕下部。則下唇有白點。腹中諸蟲。望其頭向上。望後其蟲向下。如欲用藥。先以猪肝油炙香。令兒聞其香味。使蟲頭向上。則藥易伏。若中氣虛而蟲不安者。但調補脾胃。自安。丹溪先生云。冬月吐蟲多是胃氣虛寒。用錢氏白朮散加丁香二粒。主之。

治驗

一小兒患蟲動心痛。先服大蕪荑湯。下瘀穢。反作嘔少食。右顫鼻准。白中兼黃。此脾胃氣虛也。用異功散二服稍應。更加炮薑一劑而安。

一小兒吐瀉將愈。心痛吐水。手足並冷。忽自手按心腹。此胃氣虛寒。類乎蟲痛也。用益黃散而愈。一小兒病後吐水。心間作痛。余謂胃氣虛寒。用五味異功散而愈。復母吐。凡患病飲食不進。手足並冷。卽吐水心痛。余用前散加升麻柴胡卽愈。或用逐蟲之劑。前症益甚。更加腹痛重墜。末用補中益氣湯。加炮薑。治之而愈。

史君子丸。治五疳。脾胃不和。心腹膨脹。時復作痛。不食漸瘦。並宜服之。

史君子肉兩厚朴

橘紅

白芍藥

甘草炒

川芎各一

右為末蜜丸如皂角

安蟲散治蟲痛

胡粉炒

鵝風炒

川棟子

檳榔各二錢

白礬一錢半

右為末每服二五分米飲

大黃丸

烏梅丸治蛇厥當吐蛇。今反靜而復煩此為臟寒。蛇上入其膈故須臾復止得食而嘔又煩蛇聞之嘔吐及治久痢方見傷風咳嗽

理中湯冷瀉

大蕪荑湯方見

異功散加鉗

白木散樹齶

益黃散樹齶

疝氣

小兒陰腫疝氣者多屬肝腎氣虛反坐卧寒濕之地或風邪所傷血氣相搏或啼叫氣逆水道不行或票父經肝虛熱或妊娠肝氣鬱結或乳母怒動肝火而致者若兜肝經熱用梔子清肝散兒啼躁怒用均氣散乳母恚怒用柴胡清肝散肝火氣逆用加味逍遙散小腹作痛小便澁滯用龍膽瀉肝湯久坐冷地小便不利用四苓散加柴胡山梔車前子不時寒熱者加味小柴胡湯經云肝氣熱則茎脹不筋弛縱腎脹腫脹或出白液痒癟或裏急筋縮挺縱不收或精隨便下者此名肋疝但屬肝火不係於腎當詳治之。

治驗

一小兒陰囊赤腫余作胎毒治瘥後發熱瘡癩等症診其母素有鬱熱用加味歸脾逍遙二藥子母俱服而愈後吐瀉小便赤澁兩目瞓動視其寅卯二關脉赤此肝經風熱也用柴胡清肝散加釣藤鈎木賊草而愈

一小兒陰莖作痒小便頻數此屬肝火之症反服五苓散頸間結核余用柴胡梔子散四味肥兒丸諸症稍愈又用蝦蟆丸而痊

一小兒裏濕熱後陰囊散腫莖中作痛時出白津余脾之肝火也用龍胆瀉肝湯六味地黃丸而愈
一小兒睾丸作痛小便赤澀寒熱作嘔乃肝脾之症用小柴胡湯加山梔車前子茯苓而愈

一小兒睾丸腫鞭小便黃澀用小柴胡湯加車前子山梔升蘆薈丸而消

一小兒莖中作痒一小兒下疳潰爛作痛發熱一小兒莖中潰痛小便秘澀日晡尤盛一小兒目痒出水連劄項間結核陰囊搔痒俱屬肝火之症俱用九味蘆薈丸而愈

一小兒小便澀滯陰囊腫痛寒熱此肝經濕熱也用龍胆瀉肝湯而消但內熱倦怠此兼脾虛也用四君柴胡山梔芩歸而愈

一小兒陰囊赤腫因乳母怒氣及飲酒而發余審之因於怒則用加味道遙散因於酒則用加味清胃散並加漏蘆乾葛神曲與母子服之隨愈

一小兒陰囊腫痛小便赤澀用加味小柴胡湯加漏蘆母子並服而愈

一小兒稟肝腎虛弱睾丸常腫用六味地黃丸料加柴胡母子並服兩月餘而痊

劉武庫子睾丸作痛小便赤澀寒熱作嘔用小柴胡湯加山梔車前子茯苓而愈

一小兒腹內一塊攻痛小便不調用龍胆瀉肝湯蘆薈丸而愈後形氣消燥發熱作渴此肝木制脾土也用補中益氣湯及蘆薈丸而愈

龍胆瀉肝湯治肝經濕熱兩拘腫痛或腹中作痛或小便澀滯等症

龍胆草炒黃

澤瀉各二

車前子炒

木通

生地黃酒

當歸酒

山梔炒

黃芩炒

甘草各二

右水煎服

四君子湯

加味道遙散

加味清胃散

加味歸脾湯四方見

五苓散五味

九味蘆薈丸方見

補中益氣湯三方見

加味小柴胡湯方見

六味地黃丸方見

桔子清肝散

柴胡清肝散二方見

四味肥兜丸

方見寒吐

四苓散即五苓散去肉桂

渴症

百問云。小兒唇紅如丹。即發渴。紅甚焦黑。則危篤。若三焦虛煩作渴者。用三黃湯。傷寒後唇口焦者。用白虎湯。竹葉湯。渴利作渴者。用四苓散之類。常治暑積心脾煩渴引飲者。用白虎湯下利脾虛作渴者。用七味白术散。熱結膀胱。小便祕渴者。用五苓散。上焦虛熱者。用四君子湯。膏梁積熱者。用清胃散。脾胃積熱者。用瀉黃散。中氣虛熱者。用異功散。腎水虛熱者。用六味丸。其餘疳症發熱。各詳本症胎票所致者。當各審其因。若誤用寒涼降火。脾胃復傷。則腹脹而為敗症矣。

治驗

一小兒發熱作渴。用瀉黃散。大便重墜。口角流涎。仍欲瀉火。余曰。鼻准青白多而黃色。少屬脾胃虛寒。肝木所侮。益口角流涎。胃氣不能統攝也。大便重墜。脾氣不能升上也。不信。另用涼劑。果眉唇微動。四肢微搐。余曰。此虛極而變慢驚風矣。用六君當歸木香炮薑釣藤鈎二劑。益甚。意欲更劑。余曰。此藥力未及也。仍以前藥加附子一片。服之即安。去附子。又二劑而愈。

一小兒吐瀉後患渴症。飲食少思。肌體消瘦。用七味白术散。渴漸止。五味異功散。加升麻飲食漸進。又用補中益氣湯。肌肉頓生。

一小兒嗜膏粱甘味。發熱作渴。小便白濁。用四味肥兜丸。佐以瀉黃散。稍愈。復傷食吐瀉。服消食丸。胃氣復傷。飲食少思。肢體倦怠而渴。先用七味白术散。而渴止。次用五味異功散。而痊。

一小兒面色目白。患渴症。唾痰發熱。服清熱化痰之藥。大便洞瀉。小便頻數。此脾胃虛而復傷也。朝用補中益氣湯。夕用四神丸。諸症漸愈。又佐以六味地黃丸而愈。

一小兒十五歲。用心太過。兩足發熱。日晡益甚。服人參固本丸之類。熱益甚。痰涎上湧。體倦更唾痰。服