

傷寒緒論

卷下

發

熱

等

證

雜

方

刺

灸

穴法

傷寒緒論卷下

清

長洲石頑張

璐路玉父纂述

登誕先

男

倬飛疇

泰訂

門人

鄒廉鐸鶴坡 較

日本

大泉長菴前田安宅子仁

再訂

男

典子守

發熱

發熱多屬表證。傷寒寒鬱肌表。則腠理閉密。故翕翕發熱。捫之烙手。當以脈之浮緊浮緩。證之無汗有汗。分風寒營衛施治。若汗不得出而煩躁者。營衛俱傷。陽邪內擾也。大青龍湯。若尺中無力者。此為本虛。小建中湯加減。凡服表藥三劑。

汗不出。熱不止者死。然有陽微不能作汗者。可用再造散或
 黃耆建中加附子。血虛加芎藭。始能作汗。此皆冬月發表藥
 也。若汗下後惡寒。脈弱。大便不結者。屬虛。宜溫補助陽爲主。
 寒邪傳裏而變熱。則蒸蒸發熱。此卽本身中元氣爲寒所
 鬱。不得泄而化爲火也。若裏證具而表證未已者。大柴胡湯。
 表證旣罷而裏證已急者。三承氣湯選用。三陰經寒證。太
 陰。少陰。厥陰。俱不發熱。惟少陰病有反發熱。脈沉者。此非傳經。乃
 直小陰而仍兼太陽。故能發熱也。春分以後。雖感寒邪。
 皆屬五時暴寒。不必拘於傷寒例治。古人治感冒諸方。如芎
 藭。麻黃。桂枝。皆不分三陽經藥。以時屬少陽風木。不獨太陽寒
 也。夏月汗府疎豁。偶感微寒。發熱必心包先受。消暑十
 宣散。秋涼發熱欬嗽。宜金沸草散。甚則小青龍湯。若交

霜降節後。卽屬正傷寒矣。○其或冬時過暖。而病發熱。心煩咽痛。或自利者。爲冬溫。陽且湯證也。○凡春時發熱。頭疼。煩渴。飲水。爲伏氣發溫。○春夏發熱。而脈大無力。爲夾內傷。○發熱而脈細小。或虛。足脛逆冷。而陽縮入腹者。爲夾陰。○發熱。脈沉小。或短濇。而足冷。陽縮。兼腹滿。或痛。爲食鬱。雖夏月不妨用薑桂。使溫暖之氣。助其陽和。并食亦得消散。雖有表證。慎不可純用表劑。升其虛陽。亦不可過用消導。引邪內犯。○有食積發熱。則胸脇煩熱。熱則蠱脹。復有瘀血發熱。則脇下或少腹痛。不可拊。又有陰虛發熱。必夜熱晨涼。若瘡瘍初起發熱。必有痛處。並不可誤施汗劑。○其脈陰陽俱虛。熱不止。大汗後。身愈熱。下利。煩躁熱不止。汗下後。大熱。脈躁亂者。皆不可治也。

孫兆治一道士發熱汗出驚眩身戰掉欲擗地有欲發汗者有欲作中風治者有欲以涼藥解之者孫曰此太陽經欲解腎氣虛不能作汗所以心悸目眩身戰與真武湯三服微汗而解

頭痛

昔人以頭痛專主太陽殊不知三陽經各有部分如大陽頭痛自腦後上至巔頂下有頂強腰脊痛之異以太陽經脈行身之後也當辨中風傷寒汗之○汗後頭痛如破此轉屬陽明也○風火相煽頭痛如破諸藥不効愈表愈痛痛連眉稜者選奇湯證也○陽明頭痛上連目珠痛在額前兼鼻孔乾下有身熱不眠之分以陽明經脈行身之前也○少陽頭痛上至兩角下有耳聾脇痛之殊以少陽經脈行身之側也○

三時感冒。皆有頭痛。當從芎蘇香蘇輩選用。三陰經至頸而還。惟厥陰之脉上巔與督脉會。故有頭痛。上則巔頂收引。頭角下有脉沉弦細。手足厥冷。此爲在經。當歸四逆湯。若在裏則乾嘔吐涎沫頭痛。吳茱萸湯。太陽中濕。則上有鼻塞吐痰。下有腹滿自利。少陰中寒。上則入連腦齒。下則煩躁爪甲青。此真頭痛。不治。陽明熱蒸頭痛。必小便黃赤而短數。調胃承氣湯。太陽脉沉。身熱頭痛。爲夾陰。黃耆建中湯。若誤汗不差者。四逆湯溫之。太陽證下之。頭痛未除。脣寒面青。指頭微厥。復發熱者。爲表邪內陷於陰分。雖頭痛發熱。不可用表藥。宜竹葉石膏湯。冬溫發熱頭痛。心煩咽痛。自利。陽且湯。溫病熱病時行疫癘。初起頭痛。皆不可用表藥。宜黃芩白虎加蔥豉。或葛根蔥白湯以治外。涼膈雙解達原。

承氣加葱豉薑棗。合內外而治之。裏氣一通。頭痛自愈。○內傷火炎。新產血虛。皆有頭痛。但時痛時止。而無腦後痛者。蓋火炎則痛自兩角。血虛則痛連魚尾。以其自內達外。故必行少陽部分。是以頭痛見兩角者。則有少陽風熱與虛火之別。若見額前者。亦有陽明與食積之殊。其見腦後者。必太陽外感無疑也。

頭重

濁陰寒濕之邪。上干清陽之位。故使頭重。○頭重惡寒。項強不能舉者。屬太陽。汗之則愈。○若陰陽易。頭重眼中生花者。逍遙湯下。燒褌散。○若眩暈而頭重不能舉者。此雖夾痰。亦屬氣虛。導痰六君選用。

頭脹

頭脹者。氣虛火炎也。冬溫風溫溫病熱病時行中喝中暑。多有頭重脹痛。皆是濕熱火氣內燔。慎不可用發散藥。如冬溫陽且湯。風溫萎蕤湯。溫病黃芩湯。熱病時行中喝。白虎湯。中暑清暑益氣湯。此皆傷寒家切務。其他濕熱痰飲食積疰夏等。俱有頭重脹痛。乃屬雜證。此不復贅。

項強

太陽之脈。從頭下項連風府。故項強爲太陽表證。然項強凡凡如凍鳥縮頸。欲伸而不能自如者。此胃氣不得上升。乃邪將犯陽明之候。若汗出惡風者。桂枝加葛根湯。無汗惡風者。葛根湯。項強連脇下滿。身熱惡風。手足溫而渴者。爲邪干少陽。小柴胡湯。乃知項強多兼陽明少陽。不可執認太陽也。又結胸證。項強如柔痙狀。此裏實證。以背爲胸之府。背強

項亦強也。急下之。○天行時氣發熱。至晚則腰脊痛。頭項強。身重。輕則涼膈。重則幾解。並加葱白香豉。○寒濕項強發瘕。及過汗經虛生風發瘕。與陰毒項強。治法詳總論中。

惡風

傷風惡風。見風則怯。密室之中則不惡也。蓋風爲陽邪。必傷衛氣。衛虛則腠理疎而自汗。汗去則脉浮緩也。是以桂枝湯專主自汗發熱惡風之證。然寒傷營。亦有惡風無汗而喘者。蓋惡寒則有陰陽之異。惡風悉屬於陽。故惡風未罷者。必當先解其外也。○若發汗太過。衛虛亡陽。遂漏不止。惡風。桂枝加附子湯。○風濕熱病。寒疫內傷惡風。詳總論中。

惡寒

傷寒惡寒。雖身居密室。猶自憎寒。拘急甚。則寒慄鼓頤。向火。

不能遏其寒。非若寒熱之惡寒。熱至則不惡也。如已發熱。則身熱不欲去衣。由陰氣上入陽中。或陽微。或風虛相搏所致。惡寒一切屬表。雖裏證悉具。而微惡寒者。猶當解表。俟惡寒已。乃可攻裏。故先惡寒而發熱者。爲外惡寒。爲陽病。在陽宜發汗。然尺中遲弱者。慎不可汗。當用黃耆建中湯。若太陽證犯本。惡寒發熱未除。渴而小便不利者。五苓散。先服一半。探吐之。發汗後惡寒爲虛。芍藥甘草附子湯溫之。若下利惡寒。手足溫者。陽邪內陷於太陰之經也。小建中湯。下證悉具而微惡寒。及下利惡寒。時時自煩者。爲陽邪內伏。並宜大柴胡湯。結胸證微惡寒者。必先用桂枝湯解表。然後用陷胸湯下之。若表不解而便攻之。表邪復結。其證必危。故結胸有一毫惡寒。不可下也。若初起惡寒。蹉臥脈沉者。爲內

惡寒。爲陰病。在陰則宜溫。雖夏月亦須薑附。輕則理中。重則四逆。若當盛暑。須參大順。冷香漿水等治之。少陰病惡寒身踈而利。手足厥冷。煩躁脉不至。及四逆惡寒。不煩而躁。皆死證也。經曰。發熱惡寒發於陽。無熱惡寒發於陰。尚何疑哉。溫熱時行惡寒。詳總論本例中。

石頑治玉峰陸去非繼室。嘉平患惡寒。周身骨節皆疼。飲食不入者已三日。而惡寒未止。全不發熱。診其六脉悉緊而細。詢之平日起居。飲食絕少。雖暑月不離複衣。知其素稟虛寒。而不能發熱。洵爲太陽寒傷營證無疑。但從來極虛感寒。無正發汗之理。乃以黃耆建中製生附汁於薑內。以助衛氣。一服肢體卽溫。但背猶畏寒不止。更與補中益氣十全大補。並加熟附而安。

背惡寒

人身背爲陽。背惡寒者。陽虛之驗也。然陽氣內陷。亦有此證。是以背惡寒。有陰陽之異。若風寒在表。則一身盡寒矣。但背惡寒者。陰寒氣盛可知。以陰氣不能消耗津液。故少陰病二三日。口中和。背惡寒者。宜附子湯。及灸氣海。熱病初起。口燥心煩。而背微惡寒者。此陽氣內伏於陰中。肌表之陽不勝邪。及陽明中竭。俱有是證。以陽邪內消津液。故煩渴引飲。並宜白虎加人參湯。若誤認陽虛而用溫藥。必致斑爛不救也。故曰口中渴。知其內有熱。口中和。知其內有寒。此理皎然矣。○勞役內傷。背惡寒者。必寒一陣。止一陣。爲陽虛內熱。東垣升陽散火湯。○又濕痰證。亦背惡寒。必肢體重痛。導痰湯加減。○若寒熱屢作。而背惡寒。脈來弦數。身有痛處者。爲發癰。

疽之候^上

寒熱

傷寒寒熱往來者。邪正分爭也。表邪欲入。而正氣拒格。陰陽相勝而作也。然寒熱往來與寒熱如瘧不同。如瘧則作止有時。往來則作止無時。有日二三發者。傷寒寒熱往來。雖專屬少陽經。亦有兼太陽陽明者。邪居表多則多寒。邪居裏多則多熱。然治法專用小柴胡湯。隨證加減。寒多增桂枝。熱多倍柴胡。加芍藥。寒多而脈虛。去芍加熟附。熱多而脈實。去參用大黃。凡少陽證。必先與小柴胡湯和之。服後不解。若其脈反浮者。當與柴胡桂枝湯。使其邪從表而散。若脈加數者。當與大柴胡湯。使其邪從裏而去也。○有元氣寡弱之人。素挾痰鬱。畧有動作勞傷。則憎寒發熱。有似傷寒。其脈弦數無力。

腋下及臂。或腿縫中有核腫痛者。謂之勞發。切勿汗下。宜補中益氣。加降火清痰藥。輕者周時微汗自解。

如瘧

如瘧者。作止有時。非若寒熱往來之無定也。病二三日。寒熱往來有時而作。脉浮洪者。此太陽似瘧也。若熱多寒少。尺脉遲爲血少也。若日晡時作。汗出而煩。脉實者。此陽明似瘧也。陽明少陽合病。日晡寒熱如瘧者。大柴胡湯。若六七日發熱惡寒。舌不短囊不縮。脉浮緩者。此厥陰似瘧也。爲欲愈。小柴胡湯加桂枝。大率往來寒熱不離少陽。不拘日數多少。邪氣淺深。及婦人熱入血室。並宜小柴胡湯加減。太陽病八九日如瘧狀。一日二三度發。爲欲愈。

潮熱

陽明旺於未申。故日晡潮熱。一日一發。如潮信然。傷寒邪入陽明胃府。爲邪熱內結。故可用承氣攻裏。凡欲攻裏。須病人脈實有力。再當審臍下有鞭滿結痛處。及問平昔有無動氣。量輕重施治。○發於寅卯者。屬少陽。發於巳午者。屬太陽。皆不可下。俟表證已。方可攻之。○潮熱而嘔。胸脇滿。盜汗出者。不可下。柴胡桂枝湯。○潮熱而脇下汗出。爲膽實。大柴胡湯。手足心汗出者。爲胃實。大承氣湯。二處無汗。爲結未實。尚宜小柴胡和解。俟結定攻之。

無汗

風暑濕三者干人。皆衛氣受病。惟寒則營血受傷。腠理緻密。津液內滲。陽邪有餘。故身熱無汗而喘也。蓋邪氣在表。熏蒸腠理。則汗出。今邪不外蒸。必傳入裏。急用麻黃湯汗之。若惡

風項強者。葛根湯。緣邪漸次入陽明經也。○陽明病無汗。小便不利。與懷者。必發黃。若渴欲飲水。小便不利。無汗者。爲犯本。俱宜五苓散。有飲水內畜而無汗。桂枝去桂加茯苓白朮湯。○有脉遲無陽。不能作汗者。桂枝麻黃各半湯。○若溫熱病無汗。黃芩白虎三黃石膏選用。熱病發狂。有汗者生。無汗者死。○成無已言。三陰爲病。不得有汗。朱奉議亦云。三陰與陰陽易皆無汗。而仲景厥陰例中。大汗出。熱不忤。內拘急。四肢疼。下利。厥逆而惡寒者。四逆湯主之。又陰毒則額上及手背冷。汗不止。爲亡陽將脫之兆。素問云。陰氣有餘。爲多汗身寒。由是言之。則三陰不宜有汗。非三陰皆無汗也。

自汗

太陽中風。不由發表而汗泄。謂之自汗。以風傷衛則表虛不

能自固而汗。故用桂枝湯散邪以實衛也。然濕氣傷於脾。暑氣傷於心。皆令自汗。惟冬月寒傷營。則發熱無汗。若始本無汗。四五日後忽然自汗出。此寒邪傳裏而變熱。知邪已入府矣。凡傷風則惡風自汗。頭痛發熱。若裏證自汗。必煩躁惡熱。不惡風寒。迴手不倖也。又太陽經邪犯本。則汗出而渴。小便難。陽明經證。則頭目痛。眉睫骨疼。而自汗。陽明府證。則腹滿自汗。當詳審治之。有汗後惡寒。汗不止爲表虛。黃耆建中湯。并用溫粉撲之。有汗多亡陽不止者。桂枝附子湯。小便少者加茯苓。若陰證自汗。必身冷厥逆。經云。陰氣有餘。則多汗身寒。四逆湯甚則加人參。溫病誤服表藥。大汗出煩渴不解。脈洪大者。白虎湯。若傷濕則身重自汗。中暑則脈虛自汗。中暍則煩渴自汗。濕溫則妄言足冷自汗。風