

鄖县中药资源普查

下册




鄖县中药资源普查办公室

一九八八·五

鄞县中药资源普查

下册



鄞县中药资源普查办公室

一九八八·五

目 录

藻类	1	鳞始蕨科	4
石莼科	1	骨碎补科	4
海带科	1	凤尾蕨科	4
马尾藻科	1	蕨科	5
石花菜科	1	中国蕨科	5
菌类	1	水蕨科	5
内孢霉科	1	蹄盖蕨科	5
麦角科	1	裸子蕨科	5
肉座菌科	2	铁角蕨科	5
银耳科	2	金星蕨科	6
木耳科	2	乌毛蕨科	6
多孔菌科	2	鱗毛蕨科	6
伞菌科	2	水龙骨科	6
马勃科	2	苹科	7
地衣苔藓类	3	槐叶苹科	7
石耳科	3	满江红科	7
松萝科	3	裸子植物	8
地钱科	3	苏铁科	8
蕨类	3	银杏科	8
石杉科	3	紫杉科	8
石松科	3	粗榧科	8
卷柏科	3	松科	8
阴地蕨科	4	杉科	8
紫萁科	4	柏科	9
海金沙科	4	被子植物——双子叶植物	9
蚌壳蕨科	4	三白草科	9
碗蕨科	4	胡椒科	9

金粟科	9
杨柳科	9
杨梅科	10
胡桃科	10
桦木科	10
山毛榉科	10
榆科	10
桑科	10
大麻科	11
蕁麻科	11
桑寄生科	12
马兜铃科	12
蛇菰科	12
蓼科	12
藜科	14
苋科	14
紫茉莉科	14
商陆科	14
马齿苋科	15
石竹科	15
睡莲科	15
毛茛科	16
木通科	17
大血藤科	17
小檗科	17
防己科	18
木兰科	18
蜡梅科	19
樟科	19
墨栗科	20
十字花科	20
茅膏菜科	21
景天科	21
虎耳草科	21
金缕梅科	22
杜仲科	22
蔷薇科	22
豆科	25
酢浆草科	30
牻牛儿苗科	30
芸香科	30
苦木科	31
棟科	31
远志科	32
大戟科	32
黄杨科	33
漆树科	33
冬青科	34
卫矛科	34
省沽油科	34
槭树科	34
无患子科	35
清风藤科	35
凤仙花科	35
鼠李科	35
葡萄科	35

椴树科	36	柿树科	44
锦葵科	37	野茉莉科	44
梧桐科	37	木犀科	44
猕猴桃科	37	马钱科	45
山茶科	37	龙胆科	45
金丝桃科	38	夹竹桃科	45
柽柳科	38	萝藦科	45
堇菜科	38	旋花科	46
旌节花科	39	紫草科	46
秋海棠科	39	马鞭草科	47
仙人掌科	39	唇形科	47
瑞香科	39	茄科	49
胡颓子科	39	玄参科	50
千屈菜科	40	紫葳科	51
石榴科	40	胡麻科	51
紫树科	40	苦苣苔科	51
八角枫科	40	爵床科	51
桃金娘科	40	车前科	52
野牡丹科	40	茜草科	52
菱科	41	忍冬科	53
柳叶菜科	41	败酱科	53
五加科	41	葫芦科	53
伞形科	41	桔梗科	54
山茱萸科	43	菊科	55
鹿蹄草科	43	单子叶植物	58
杜鹃花科	43	香蒲科	58
紫金牛科	43	泽泻科	58
报春花科	44	禾本科	59

莎草科	61	蜈蚣科	69
棕榈科	61	方蟹科	69
天南星科	61	昆虫	69
浮萍科	62	鳖蠊科	69
谷精草科	62	螳螂科	69
鸡跖草科	63	蟋蟀科	69
灯心草科	63	蝼蛄科	69
百部科	63	蝉科	70
百合科	63	金龟子科	70
石蒜科	65	丽金龟科	70
薯蓣科	66	鳃金龟科	70
鸢尾科	66	芫青科	70
芭蕉科	66	蚕蛾科	70
姜科	67	蛇科	70
美人蕉科	67	胡蜂科	70
兰科	67	蜜蜂科	70
环节动物	68	鱼类	71
水蛭科	68	鳝科	71
钜蚓科	68	鲤科	71
软件动物	68	石首鱼科	71
田螺科	68	两栖类	71
蚶科	68	蟾蜍科	71
牡蛎科	68	龟科	71
帘蛤科	68	鳖科	71
乌贼科	68	壁虎科	71
蚌科	69	游蛇科	71
节肢动物	69	蝮蛇科	71

鸟类	72
鶲科	72
雉科	72
文鸟科	72
哺乳动物	72
蝙蝠科	72
猴科	72
穿山甲科	72
兔科	73
松鼠科	73
鼠科	73
犬科	73
鼠兔科	73
猫科	73
猪科	73
鹿科	73
牛科	73
刺猬科	74
矿物类	75
其他类	75
正误表	

藻类

石莼科 Ulvaceae

石 莼 *Ulva lactuca* L. 全草入药。分布在大嵩区沿海岩石。消炎、利水。

孔石莼 *Ulva pertusa* Kjellm. 又名海青菜，功用同石莼。

浒 苔 *Enteromorpha prolifera* (Mull) J. Ag. 又名苔条，全草入药。分布大嵩沿海。软坚散结、清热解毒。

管浒苔 *E. tubulosa* (L.) Grev. 分布功用同浒苔。

海带科 Laminariaceae

海 带 *Laminaria japonica* Aresch. 干燥叶名昆布，球山乡有养殖。软坚散结、清热利水、平喘降压。

马尾藻科 Sargassceae

海蒿子 *Sargassum pallidum* (Turn.) C. Ag. 全草入药名海藻。分布大嵩沿海。软坚散结、利水消肿、泄热化痰。

石花菜科 Gelidiaceae

石花菜 *Gelidium amansii* (Lamx.) Lamx. 全草入药，分布占岐乡，清热解毒。

大石花菜 *Gelidium pacificum* Okam 同石花菜。

小石花菜 *Gelidium divaricatum* Mart. 同上。

菌类

内孢霉科 Endomycetaceae

啤酒酵母 *Saccharomyces cerevisiae* Hansen. 浙东啤酒厂、三溪浦啤酒厂人工培养。制酵母片。消食止泻。

麦角科 Clavicipitaceae

麦 角 *Claviceps purpurea* (Franch.) Tul. 菌核入药，分布姜山、茅山产粮区。资源少。有毒、收缩子宫、止血。

蝉 花 *Cordyceps sobolifera* (Hill) Berk. et Br. 初夏于毛竹林下土中蝉蛹头部长出如花冠状的子实体，又名金蝉花。分布在云洲乡、金城乡等，为本县特产之一。资源中量。可治惊痛、心悸、小儿夜啼及疟疾。

肉座菌科

竹 黄 *Shiraia bambusiola* P. Henn. 菌核入药，寄生在竹林，山区有一定量分布。通经活络、散瘀止痛、止咳化痰。

银耳科 *Tremellaceae*

银 耳 *Tremella fuciformis* Berk. 又名白木耳。占岐乡曾栽培，滋阴、润肺、养胃、生津。

木耳科 *Auriculariaceae*

木 耳 *Auricularia auricula* (L. ex Hook) Underw. 子实体入药，寄生桑、栎树上，夏季多，分布樟村乡，养血、活血、收敛。

多孔菌科 *Polyporaceae*

灵 芝 *Ganoderma lucidum* (Leyss. ex Franch.) Karst. 子实体入药，樟村乡、天童乡有少量野生。滋补强壮、健脾安神、止咳祛痰。

紫 芝 *Ganoderma japonicum* (Franch.) Lloyd. 分布功用同灵芝。

茯 苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf. 菌核入药，赤水乡有少量野生，生于松根上。渗湿、健脾、宁心。菌核外皮名茯苓皮；利水、消肿。茯神木：养心安神。

伞菌科 *Agaricaceae*

蘑 菇 *Agaricus bisporus* (Lange) Singer. 子实体入药，樟村、龙观、云洲等地有野生，栽培较少。健脾、消食、平肝。

雷 丸 *Omphalia lapidescens* Schroet 菌核入药，龙观有少量分布。有小毒，杀虫。

马勃科 *Lycoperdaceae*

脱皮马勃 *Lasiosphaera fenzlii* Reich. 子实体入药名马勃 樟村、横溪、天童等有少量分布。清热解毒、利咽、止血。

紫色马勃 *Calvatia lilacina* (Mont. et Berk.) Lloyd. 分布功用同脱皮马勃。

大 马 勃 *C. gigantea* (Ratsch ex Pers.) Lloyd. 分布功用同上。

地衣、苔藓类

石耳科 Umbilicariaceae

石耳 *Umbilicaria esculenta* (Migeshi) Minks. 药名石木耳地衣，樟村乡密岩岙有稀少分布。滋阴清热、利尿、化痰。

松萝科 Usneaceae

长松萝 *Usnea longissima* Ach. 药名云雾草。杖锡乡梅树孔有稀少发现。化痰止咳、清热明目、活络、止血。

地钱科 Marchantiaceae

钱苔 *Conocephalus conicus* (L.) Durorf 又名蛇地钱，分布樟村乡等地。清热解毒。

蕨类

石杉科 Huperziaceae

千层塔 *Huperzia serrata* (Thunb.) Trev. 又名蛇足石松、全草入药，樟村乡崖岙有稀少分布。有毒，活血行瘀、消肿解毒、麻醉止痛。

石松科 Lycopodiaceae

石松 *Lycopodium clavatum* L. 全草入药名伸筋草，又名过山龙，横溪、龙观、梅岭、金峨等乡有分布。舒筋活络、祛风利湿。

卷柏科 Selaginellaceae

深绿卷柏 *Selaginella doederleinii* Hieron. 又名石上柏，全草入药，龙观洞坑、赤水陶坑阴岩有分布。清热解毒、抗癌。

江南卷柏(摩来卷柏) *Selaginella moellendorffii* Hieron. 全草入药名岩柏草，分布龙观油莲山等地。清热利湿、消肿和血。

杭州卷柏 *Selaginella involvens* (Sw.) Spring. 同上

伏地卷柏 *Selaginella nipponica* Franch. et Savat. 同江南卷柏。

卷柏 *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring. 全草入药名卷柏，又名九死还魂草，主产龙观乡。生用破血、炒用止血。

垫状卷柏 *S. pulvinata* (Hook. et Grev.) Maxim. 分布功用同卷柏。

翠云草 *Selaginella uncinata* (Desv.) Spring. 全草入药，龙观、大嵩阴坡

偶有分布。清热利湿、收敛止血。

阴地蕨科 *Botrychiaceae*

阴地蕨 *Botrychium ternatum* (Thunb.) Sw. 全草入药名小春花，分布龙观茶
壠、横溪金峨等地。清热解毒、散结。

华东阴地蕨 *Botrychium japonicum* (Prantl) Underw. 同上。

紫萁科 *Osmundaceae*

紫萁 *Osmunda japonica* Thunb. 根茎入药名贯众，生于林下、荒坡、沟边草
丛中，全县分布广，蕴藏量大，主产樟村、云洲、横溪等地。清热解毒、止血。

海金沙科 *Lygodiaceae*

海金沙 *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. 孢子名海金沙，全草入药，生
于路旁、山坡、灌丛中，全县各地遍布。利尿渗湿、清热解毒。

蚌壳蕨科 *Dicksoniaceae*

金毛狗 *Cibotium barometz* (L.) J. Smith 根茎入药名狗脊。生于龙观洞
坑、大嵩牛郎湾溪沟阴处。祛风湿、补肝肾、壮筋骨。

碗蕨科 *Dennstaedtiaceae*

边缘鳞盖蕨 *Microlepia marginata* (Houtt.) C. Chr. 叶入药，生
于灌丛溪边，资源遍布全县。可治痈肿。

鱗始蕨科 *Lindsaeaceae*

乌韭 *Stenoloma chusanum* (L.) Ching. 全草入药名乌韭，资源广布全县丘
陵地带。清热解毒、利湿、止血。

骨碎补科 *Davalliaceae*

圆盖阴石蕨 *Humata tyermannii* Moore. 根茎入药名鲜石蚕，又名白毛蛇，主产
龙观油莲山。祛风通络、解毒。

肾蕨 *Nephrolepis cordifolia* (L.) Presl. 块茎入药，生于赤水乡陶坑、乌
坑溪边，资源少。清热利湿、补气固表。

凤尾蕨科 *Pteridaceae*

凤尾蕨 *Pteris multifida* Poir. 全草入药名凤尾草。全县大量广布，清热解毒、利
湿、止血。

掌羽凤尾蕨 *P. dactylina* Hook. 分布功用同凤尾蕨。

大叶井口边草 *Pteris nervosa* Thunb. 多生于老井内壁，功用同上。

剑叶凤尾蕨 *Pteris ensiformis* Burm. 同上。

蜈蚣草 *Pteris vittata* L. 全草入药，樟村崔岙株柱岗溪沟有少量分布。解毒、杀虫。

蕨科 *Pteridaceae*

蕨 *Pteridium aquilinum* (L.) Ruhn, var. *latiusculum* (Desv.) Underw., 根茎及全草入药，生于荒山、荒坡，全县资源广布。清热解毒、利尿消肿。

中国蕨科 *Sinopteridaceae*

银粉背蕨 *Aleuritopteris argentea* (Gmel.) Fee, 全草入药，龙观青草湾有稀少分布。活血散瘀、补虚止咳。

金粉蕨(乌蕨) *Onychium japonicum* (Thunb.) Kze 全草入药，资源广布全县山区。清热利尿，凉血止血，解毒。

水蕨科 *Ceratopteridaceae*

水蕨 *Ceratopteris thalictroides* (L.) Brongn. 全草入药，生于池塘、水沟、水田中，分布望春、邱隘等乡。消积、散瘀、解毒。

蹄盖蕨科 *Athyriaceae*

假蹄盖蕨 *Athyriopsis japonica* (Thunb.) Ching. 根茎及全草入药，龙观油莲山稀少分布。可治目赤肿痛、乳痛。

单叶双盖蕨 *Diplazium laneum* (Thunb.) Presl. 全草入药。分布樟村大岙等地。清热凉血、利尿通淋。

裸子蕨科 *Hemionitidaceae*

凤丫蕨 *Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels, 全草入药，分布樟村，云洲，爱中等地。清热解毒，祛瘀止痛。

铁角蕨科 *Aspleniaceae*

虎尾铁角蕨 *Asplenium incisum* Thunb. 全草入药，资源稀少，分布枝锡，清热解毒，平肝镇惊，利尿。

华中铁角蕨 *Asplenium sarelii* Hookl. 全草入药，资源稀少，分布枝锡、赤水。清热利湿，消肿解毒，止血。

铁角蕨 *Asplenium trichomanes* L. 全草入药，生于山脚溪沟岸沿，分布樟村大

等地。清热解毒，祛瘀止血。

金星蕨科 Thelypteridaceae

延羽卵果蕨 *Phegopteris decursive-pinnata* Fee. 根茎入药，分布全县山区，可治水湿膨胀。

鸟毛蕨科 Blechnaceae

狗脊蕨 *Woodwardia japonica* (L. f.) Smith 根茎入药名贯众，遍布全县山区，以樟村，横溪最多。清热散瘀。解毒，杀虫。

单芽狗脊散 *W. unigemmata* (Makino) Nakai. 根茎入药，同狗脊蕨。

鱗毛蕨科 Dryopteridaceae

斜方复叶耳蕨 *Arachniodes rhomboidea* (Wall.) Ching 根茎入药，县内仅见于天童森林公园，可治关节疼痛。

长尾复叶耳蕨 *Arachniodes simplicior* (Makino) Ohwi 同上。

贯众 *Cyrtomium fortunei* J. Smith 根茎及叶柄残基入药名贯众，生于阴坡溪沟边，分布樟村崔岙、龙观人头山、大嵩牛郎湾等地。清热解毒、平肝、止血、杀虫。

全缘贯众 *Cyrtomium falcatum* (L. f.) Presl 同贯众。

镰羽贯众 *Cyrtomium balansae* (Christ) C. Chr. 同贯众。

阔鳞毛蕨 *Dryopteris championi* (Benth.) C. Chr. ex Ching 全草入药，资源广布，可治疮溃疡。

水龙骨科 Polypoliaceae

槲蕨 *Drynaria fortunei* (Kze.) J. Smith 根茎入药名骨碎补，又名申姜、毛姜、猴姜。阴生阴岩上，主产龙观油莲山。补肾、壮骨、活血、止痛、祛风湿。

抱石莲（鱼鳞金星）*LePidogrammitis drymoglossoides* (Bak.) Ching 全草入药，附生阴岩上，分布龙观油莲山、人头山。清热解毒、祛风利湿。

瓦韦 *LePisorus thunbergianus* (Kaulf.) Ching 全草入药名七星草，生于溪沟边、屋瓦上，樟村乡有分布。清热凉血。

狭叶瓦韦 *LePisorus angustus* Ching 同瓦韦。

鳞瓦韦 *Lepisorus oligolepidus* (Bak.) Ching 同瓦韦。

江南星蕨 *Microsorium fortunei* (Moore) Ching 全草入药名七星剑，生于溪沟

泥壁，主产樟村崔岳、大嵩牛郎湾等地。清热利湿，凉血解毒。

金鸡脚 *Phymatopsis hastata* (Thunb.) Kitagawa ex H. Ito 全草入药，名
鸭脚草。生于水坑沿，分布樟村、赤水、天童、大嵩等乡。清热利湿、解毒。

水龙骨 *PolyPodium nipponicum* (Mett.) ching 根茎入药名青石蚕，附生阴
岩，阴坡，主产龙观油莲山。清热解毒，祛风活络。

石韦 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farw 全草入药，匀称“小叶石韦”，横溪，
龙观二地蕴藏量较大。利尿通淋，清热止血。

有柄石韦 *Pyrrosia petiolosa* (Christ) Ching 又名金背茶匙，分布功效同石韦。

* 贴生石韦 *P. adnascens* (Sw.) Ching. 全草入药，附生岩壁上，龙观乡下茶坞有
稀量分布。利尿。治腮腺炎，瘰疬，蛇伤。

盾蕨 *Neolepisorus ovatus* (Bedd.) Ching. 全草入药，生于山区溪沟内，主产
樟村乡大岳，崔岳，密岩岳。

石蕨 *Saxiglossum angustissimum* (Gies.) Ching 全草入药，分布龙观油莲山
等地。清热镇咳，利尿明目。

萍科 *Marsileaceae*

萍 *Marsilea quadrifolia* L. 又名田字草，全草入药，生于水田，池沼处，平原
粮区广布。清肿解毒，利尿消肿。

槐叶萍科 *Salvinaceae*

槐叶萍 *Salvinia natans* (L.) All. 全草入药。粮区广布，密集，清热解表，解毒
消肿，活血止痛。

满江红科 *Azollaceae*

满江红 *Azolla imbricata* (Roxb.) Nakai 全草入药，生于水田，池塘，水沟中，
资源多。疏风解表，透疹，利尿，解毒。

* 本次新普查到品种。

裸子植物

苏铁科 Cycadaceae

苏铁 *Cycas revoluta* Thunb. 庭园栽培，观赏，药用资源少。根：祛风活络，补肾，叶：收敛止血，解毒止痛，花：理气止痛，益肾固精，种子：平肝、降血压。

银杏科 Ginkgoaceae

银杏 *Ginkgo biloba* L. 全县另星广布，资源量急剧减少，樟材乡有分布。叶名银杏叶：活血止痛，种子名白果 银杏：有毒，定痰喘，止带浊。

紫杉科 Taxaceae

榧树 *Torreya grandis* Fort. ex Lindl. 种子入药名榧子，木榧，资源少，分佈横溪。驱虫 消积。

粗榧科 Gephalotaxaceae

三尖杉 *Cephalotaxus fortunei* Hook. f. 种子入药，分布县内山区。抗癌、润肺、消积、杀虫。

松科 Pinaceae

马尾松 *Pinus massoniana* Lamb. 鄱县优势树种，全县山区广布。花粉粒名松花粉：润肺、燥湿、止血；树脂名松香：有小毒，生肌止痛，燥湿杀虫；树节名松节：祛风燥湿；松针：祛风。

火炬松 *P. taeda* L. 新引种树种，功用同马尾松。

湿地松 *P. elliottii* Engelm. 新引种树种，同马尾松。

黑松 *P. thunbergii* Parl. 杜锡、金城的林场有栽培。功用同马尾松。

金钱松 *Pseudolarix kaempferi* Gord 根皮名土槿皮，分布杜锡、天童乡。杀虫疗癣。

杉科 Taxodiaceae

柳杉 *Cryptomeria fortunei* Hooibrenk ex Otto et Dietr. 我县主要树种，分布广。皮入药，解毒、疗癣、治烫伤。

杉木 *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook. 我县主要树种，分布梅岭、占歧、下水乡，根、树皮、叶、杉节、球果入药。

柏科 Cupressaceae

柏木 *Cupressus funebris* Endl. 我县主要树种，分布天童林场等地。球果入药，解表、和中、止血。

日本扁柏 *Chamuecg parz; Qbtusa (Sicbte zucc)* Endl. 分布金峨山林茶场，杖锡林场，天童乡勤勇村。功用同柏木。

刺柏 *JuniPerus formosana* Hayata. 分布樟村等地，根皮、枝、叶入药：清热解毒、杀虫。

侧柏 *Platycladus orientalis (L.) Franco* 叶名侧子叶，子名柏子仁，樟村乡花卉专业户有少量种植。叶：清热凉血，收敛止血，止咳化痰；种仁：养心安神，止汗润肠。

圆柏 *Sabiua chinensis (L.) Antoine* 分布樟村乡，枝叶入药。有小毒，祛风散寒。

被子植物——双叶子植物

三白草科 Saururaceae

蕺菜（鱼腥草） *Houttuynia cordata* Thunb. 全草入药，遍布全县，资源多。有小毒、清热解毒、利尿消肿。

三白草 *Saururus chinensis (Lonr.) Baill.* 全草入药，分布杖锡、赤水。清热利尿。

胡椒科 Piperaceae

细叶青蒌藤 *Piper kadsura (Choisy) Ohwi* 藤入药名海风藤。横溪有少量分布，祛风湿、通经络、解暑止痛。

山蒟 *Piper hancei Maxim.* 同上。

金粟兰科 Chloranthaceae

丝穗金粟兰 *Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms - Laub.* 根和全草入药，分布樟村乡等地。有毒，镇痛、活血散瘀。

草珊瑚 *Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai* 全草入药，分布樟村、云洲乡，祛风散热、活血、止痛。

杨柳科 Salicaceae

响叶杨 *Populus adenopoda* Maxim. 根皮、树皮、叶入药。分布较广。祛风活络，散瘀止痛。

垂柳 *Salix babylonica* L. 枝、芽及叶入药，平原四旁绿化树，分布广、祛风止痛、利湿解毒。

银叶柳 *Salix chienii* Cheng 根入药，茎枝有少量，清热解毒、祛风止痒。

杨梅科 Myricaceae

杨梅 *Myrica rubra* (Lour.) Sieb et Zucc. 主要分布东钱湖沿湖山坡，根、树皮：散瘀止血、理气止痛；果：生津止渴。

胡桃科 Juglandaceae

枫杨 *Pterocarya stenoptera* C. DC. 资源广布。树皮、枝、叶及果实入药。有小毒，祛风止痒、杀虫消肿。

桦木科 Betulaceae

华鹤耳枥 *Carpinus cordata* Bl. var. *chinensis* Franch. 分布天童森林公园，资源稀布，活血、散瘀。

山毛榉科 (壳斗科) Fagaceae

板栗 *Castanea mollissima* Bl. 资源广布，分布云州、天童、樟村乡。果实：益气健胃、补肾。果壳：清火、化痰散结。叶：祛风止痒、止咳。

锥栗 *Castanea henryi* (Skar.) Rehd. et Wils. 又名毛栗。分布功用同板栗。

茅栗 *Castanea sequinii* Dode 分布广，种仁、壳斗、根、树皮及叶入药。安神、健脾、解毒。

钩栗 *Castanopsis tibetana* Hance 分布东钱湖一带，可治痢疾。

白栎 *Quercus fabri* Hance 白栎皮及壳斗入药，是我县主要灌木树种，分布广，健胃消积、理气、清火、明目。

蒙古栎 *Q. mongolica* Fisch 又名橡子树，全县山地广布，功用同白栎。

榆科 Ulmaceae

朴树 *Celtis sinensis* Pers. 生于郊野、溪边河岸，分布樟村、韩岭、下水等地，根皮、树皮、叶入药，祛风透疹，健脾活血。

桑科 Moraceae

构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent 分布云洲乡，种子入药名楮实子。