

中西醫學叢書之二

中西
合纂
婦科
大全

上海大東書局發行



中華民國七年八月一日出版
中華民國十九年三月三日七版

此有著作權
必究

分發行所

漢口中山路
廣州雙門底
北平楊梅竹斜街
遼寧鼓樓北
長沙南陽街
梧州大中路
汕頭至平路

中西合纂婦科大全

○每部定價大洋一元二角

外埠酌加郵費滙費

編輯者 無錫顧鳴盛

校閱者 古越馬小琴

印刷所 上海大東書局

發行所 上海四馬路中市大東書局

大東書局



中西醫學叢書

第一種

中西
合纂
外科大全

全書特裝二厚冊
價洋一元二角

第二種

中西
合纂
婦科大全

全書特裝二厚冊
價洋一元二角

第三種

中西
合纂
幼科大全

全書特裝二厚冊
價洋一元二角

第四種

中西
合纂
內科大全

全書特裝二厚冊
印刷中

上海大東書局發行



雜證門下

霍亂

無錫顧鳴盛輯

【中醫學說】嘔吐而利者名霍亂也。原疾之由皆因腸胃虛冷，飲食過度，觸冒風寒，使陰陽不和，清濁相干，致令揮霍變亂也。或先心痛而吐者，或先腹痛而利者，或吐利俱作者，或頭痛，身體壯熱而脈浮洪者，或陽氣暴絕而手足逆冷，脈息微絕者，治之當分陰陽，察其虛實，辨其冷熱，觀其脈息，熱者涼之，冷者溫之，以平為期。百問云：凡霍亂吐利，熱多而渴者，五苓散，寒多不飲水者，理中丸。吐利已汗出而厥，四肢拘急不解，脈微欲絕者，通脈四逆加豬膽汁湯。夏月間中暑霍亂，大煩渴，四肢逆冷，汗出，腳轉筋者，藿香散，濃煎，沉冷服，即效。凡霍亂之脈得浮洪者，易治，微遲者，並短氣者，難治。薛立齋曰：賈元良先生云：暑者相火行令也。夏月人感之，自口齒而入，傷心胞絡之經，其證頭痛，口乾，面垢自汗，倦怠少氣，或背寒惡熱，甚者迷悶不省，或霍亂吐利，嘔痰腹痛，或下血發黃，生癍等症，治法清心火，利小便為主。若自汗熱甚，用

白虎湯。若頭痛惡熱，用十味香薷散。泄瀉煩渴，飲水吐熱，用五苓散。熱甚煩渴，用益元散。清之。若表解裏熱甚者，用黃連解毒湯。脈微下利，作渴喜溫，或厥冷，不省人事，宜竹葉石膏湯。加熟附半枚，冷飲次以來復丹。五苓散治之。故東垣云：脾胃虛弱，遇夏月淫雨，身重短氣，甚則四肢痿軟，腳軟眼黑，當滋肺氣以補水之源。是以五月常服五味子人參麥門冬之劑，為熱傷元氣，故爾。丹溪所謂夏月伏陰在內也。蓋人之腹屬地，已月六陽盡出於地之上矣。是人之陽氣亦浮於肌表，散於皮毛，而腹中之陽虛矣。又加以涼臺水館，大扇風車，寒泉水果冰涼之物，自內及外，不用溫熱，病所由生。陳無擇云：凡中暈切不得用冷藥，惟用溫養得冷，即死。道途無湯，即以熱土熨臍中，溺以熱尿，即甦。緊可見矣。內經曰：脈虛身熱，得之傷暑。難經曰：傷暑得之為正邪火自病也。當惡臭，其病身熱而煩心痛，其脈浮大，而散，傷寒論曰：太陽中暈者，身熱頭痛，而脈微弱，或發熱惡寒，而脈弦細，芤遲，大抵寒傷形，熱傷氣，傷氣而不傷形，則氣消而脈虛弱。故先哲立法，夏月宜補，良有以也。前證若內有所積，外有所感，用二陳湯加減治之，或蘿蔔子搗碎服而吐。

之若飲米湯即死云。同前論。若轉筋不任。男子以手挽陰。女子以手牽乳。近兩邊。此千金妙法也。乾霍亂不得升降。死在須臾。當以鹽湯吐之。後以二陳湯加川芎。蒼朮。防風。白芷。薑。前服。若登圓而不通。加枳殼。若食瓜果飲冷。乘風霍亂。用六和湯。倍加藿香。大凡中暑而亡者。皆因元氣虛弱。暑熱乘之。以致泄瀉。陽氣暴脫。實為陰寒之證。宜急補其陽。庶得保全。緩則不救。其他執為暑熱。投以寒藥。鮮不誤事。故以回陽固本之方。斷之於後。古稱靜而得之。為中暑。動而得之。為中熱。暑陰而熱。陽也不思暑字。以日為首。正言熱氣之襲人耳。夏日烈烈。為太陽之亢氣。人觸之則生暑病。至於靜而得之者。乃納涼於深堂水閣。大扇風車。嗜食瓜果。致生寒病。或頭痛身痛。發熱惡寒者。外感於寒也。或嘔吐腹痛。四肢厥冷者。直中於寒也。與暑症有何干涉。大抵暑症辨法。以自汗口渴煩心。溺赤身熱。脈虛為的。然有傷暑中暑閉暑之不同。傷暑者。感之輕者也。其症煩熱口渴。蓋元散主之中暑者。感之重者也。其症汗大泄。昏悶不醒。或煩心喘喝。妄言也。昏悶之際。以消暑丸灌之。立醒。既醒。則驗其暑氣之輕重而清之。輕者蓋元散。重者白虎湯。閉

暑者。內伏暑氣。而外為風寒閉之也。其頭痛身痛發熱惡寒者。風寒也。口渴煩心者。暑也。四味香薷飲加荊芥。秦艽。主之。又有暑天受濕。嘔吐瀉利。發為霍亂。此停食伏飲所致。宜分寒熱治之。熱者口必渴。黃連香薷飲主之。寒者口不渴。藿香正氣散主之。更有乾霍亂症。欲吐不得吐。欲瀉不得瀉。攪腸大痛。變狂須臾。古方以燒鹽和陰陽水引而吐之。或以陳皮同前吐之。或用多年陳香圓煎湯更佳。俗名攪腸痧。烏痧。脹皆此之類。此係穢氣閉塞。經隧氣滯。血凝脾土壅滿。不能轉輸。失天地運行之常。則脹閉而危矣。是以治法宜速。切戒飲粥湯食諸物。入口即敗。慎之慎之。【西醫學說】西名虎列刺。乃急性吐瀉之症也。多發於春末秋初之交。夏日最多。如胸腹受寒。飲食惡濁。食物不慎。皆足為病源也。病之發現。每在中夜夢中驚醒。忽然心胸苦悶。惡心嘔吐。腹中雷鳴。繞臍作痛。遂至下瀉。瀉出之物。始為軟便。繼乃為水。水色帶綠。又若米泔。瀉尚未止。吐又續來。吐瀉交作。力遂不支。四肢厥冷。下腿拘攣。口中煩渴。眼眶深凹。鼻梁高聳。病勢重者。每一小時發至數次。壯年患之。約一日或一週時。可望停止。又二三日可以全愈。若患最劇之

霍亂則真不可救矣此病豫防之法當霍亂流行之際務各自加意衛生夜卧慎弗受寒水非煮滾萬弗遽飲食物亦然瓜果生冷嚴禁入口患病地點停止往來蠅能傳病亦須豫防且豫服防病藥水在患病人家一切衣服器具概應十分消毒廢止一切常食但食肉湯雞蛋為宜消化器雖有障害而不甚者速用阿片小粉灌湯為設伏截擊之法或先服甘汞等下劑繼投阿片提神藥腹部行溫卷法或用湯婆子手足諸部則用熱水布揩拭渴甚可飲濃茶藕粉等嘔吐不止可飲濃咖啡或含碎水塊有虛脫之兆者用種種提神藥

【中國醫方】加減理中丸 主霍亂臨時方亦可治男子

人參 白朮 乾薑 甘草 各一 右為細末煉

蜜為丸每兩作五丸取湯和一丸服之日三服

吐多利少者取枳實三枚炙去蘗四破水三升煮

取一升和一丸服之吐少利多者加乾薑一塊吐

利乾嘔者取半夏半兩泡洗去滑水二升煮取一

升和一丸服若體疼痛不堪者取棗三枚水二升

煮一升和一丸服吐利太極轉筋者以韭汁洗

腹腎從胸至足蹠勿逆即止若體冷微汗腹中

寒取附子一枚炮去皮四破以水二升煮取一升和一丸服吐利悉止脈不出體猶冷者可服諸湯補之

四順湯 治霍亂吐利腹痛手足逆冷脈微欲絕

附子八枚破 乾薑三兩 人參 甘草各一 右

咬咀水煎服

四逆加猪膽汁湯 治吐已下斷汗出而厥四肢拘

急不解脈微欲絕者

甘草二兩 乾薑三兩 附子一枚 猪膽汁合 石五

味咬咀每服五錢水三盞煮至一盞去滓內猪膽

汁分二次溫服其脈即來

香薷散 治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生

冷過度或起居不節或露卧溼地或當風取涼而

風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消

化水穀致令真邪相干腸胃虛弱因飲食變亂於

腸胃之間便至吐利心腹疼痛霍亂氣逆有先心

痛而吐者或先腹痛而利者有吐利俱發者有發

熱頭痛體疼而後吐利虛煩者或但吐利心腹刺

痛者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或

四肢逆冷脈微欲絕者或煩悶昏塞欲死者姓婦

霍亂吐利此藥能主之

香薷葉 四兩

白扁豆

厚朴 各二

右咬咀每

服半兩。水一大盞。酒一分。慢火濃煎。至六分。去滓。

井中浸令水冷。頓服。無時。連進二三服。立見神效。

訶子散 治老幼霍亂吐利一服取效。又治九種心

痛及心脾冷痛不可忍。

訶子皮

甘草

厚朴

乾薑

草果仁

陳皮

良薑

荈荻

神麴

麥冬 各等

右為細末。每

服三錢。候發刺痛不可忍。用水一盞。煎七分。入鹽

服急則鹽點。

胡椒湯

治霍亂吐利甚妙。

胡椒 四兩

茶豆 十九粒

右為細末。每服二錢。

木瓜煎湯調下。

四味香薷飲

治風寒閉暑之症。頭痛發熱。煩心口

渴。或嘔吐泄瀉。發為霍亂。或兩足轉筋。

香薷

扁豆

厚朴 一錢

薑 十錢

各

甘草 五分

右

水煎服

若兼風寒。本方加荊芥。秦艽。蔓荊子。

若兼霍亂吐瀉。煩心口渴。本方加黃連。若兩足

轉筋。本方加木瓜。荻荻。木瓜。治轉筋之神劑。若

風暑相搏。而發搖擗者。本方加羌活。鉤藤。若暑

濕相搏。名曰濕濕。誤汗則名重暈。多難治。宜用蒼

朮。白虎湯。時醫不論暑濕。概行發散。傷生匪淺。

藿香正氣散 治暑月貪涼。飲冷發為霍亂。腹痛吐

瀉。憎寒壯熱。

藿香

砂仁

厚朴

茯苓

紫蘇

陳皮

各一

甘草 各一

白朮 土炒

半夏

桔梗

白芷 各一

右生薑三片。水煎服。

清暑益氣湯

豫服此藥。以防暑風。

黃芪 五錢

白朮 一錢

人參

當歸

陳皮

各七

麥冬 去心

炙甘草 各五

扁豆 二錢

升麻

柴胡

北五味 各三

神麴 四分

黃柏

澤瀉 各二

右水煎服。

香薷散

治暑熱霍亂吐瀉腹痛。

香薷 一兩

白扁豆 五錢

厚朴

陳皮

茯苓

各一

黃連 一錢

甘草 五分

右七味同為末。

開水送服。

六和湯

治風寒暑濕霍亂。

香薷

厚朴

茯苓

藿香 各四

半夏

縮砂

各一

右水煎服。

甘草

人參 各一

右水煎服。

紅圓子

治傷食腹痛霍亂吐瀉。

紅圓子

治傷食腹痛霍亂吐瀉。

紅圓子

治傷食腹痛霍亂吐瀉。

紅圓子

治傷食腹痛霍亂吐瀉。

紅圓子

治傷食腹痛霍亂吐瀉。

紅圓子

青皮 陳皮 乾薑 三棱 義朮 香附子 各

錢二 山椒 錢二 右研細末水糊丸服

不換金正氣散 一切傷寒瘟疫寒熱往來霍亂吐

瀉諸症並皆治之

蒼朮 厚朴 藿香 陳皮 半夏 各二 甘草

分五 右加薑棗煎服

小品人參湯 治霍亂卒吐下不禁脉暴數者

人參 茯苓 葛根 橘皮 麥冬 甘草 各二

右水煎一方有白朮一兩

良薑散 治霍亂神效

良薑 藿香 陳皮 各一 甘草 分三 右水煎服

乾薑茱萸湯 治霍亂乾嘔

乾薑 茱萸 各一 右水煎手足逆冷加椒百粒

附子一枚

黃瓜湯 治霍亂上吐下利

吳茱萸 木瓜 食鹽 各半 右三味同炒焦水

煎每服隨意冷熱與服藥入喉即止

神效絞腸痧散

硃砂 雄黃 明礬 鎗硝 各三 麝香 冰片

各二 草撥 三厘 右以金箔十二張為細末盛

磁餅內點晴明穴眼潭內男左女右愈

三味飲子 療濕霍亂吐痢

高良薑 桂心 各二 豆蔻子 各二

水四升煮取一升去滓細細啜之

【外國醫方】續草酒 芳香酒各五瓦 以脫精三

瓦 薄荷油半瓦 右為滴劑一日數次每次服

十滴至二十滴

稀鹽酸十瓦 右一日數次每次取數滴和開水服

之名豫防霍亂藥水極驗

甘汞一瓦 乳糖一瓦半 右研分五包每二十分

時服一包

芳香阿片酒 番木鱉酒 番椒酒 精製樟腦

薄荷油各十瓦 火酒二十瓦 右混和每時或

二三時取藥二三十滴和開水或酒中服之此即

十滴藥水也

阿片一瓦五分之一 次硝黃半瓦 白糖五瓦

右研分十包每一時服一包

麝香一瓦十分之三 薄荷油十滴 以脫十瓦

右調和每時服五滴至十五滴虛脫者用之

芥子精九十五瓦 杜松子油五瓦 右調和塗兩

下腿腓腸筋處治吊脚

阿片一瓦五分之一 樟腦一瓦十分之三 白糖

三瓦 右研和為散分作十包每時服一包於口

唇指甲現青紫時用之

阿片吐根散半瓦 甘汞一瓦 十分之一 白糖半

瓦 右為一包共製十包每三時服一包真霍亂

用之

翻胃吐食

【中醫學說】病機云吐有三曰氣積寒也皆指三焦言之上焦吐者從於氣氣者天之陽也其脈浮而洪食已暴吐渴欲飲水大便燥結氣上衝胸發痛其治法當降氣和中中焦吐者從於積有陰有陽食與氣相假為積而痛其脈浮而匿其證或先痛而後吐或吐而後作痛治法當以小毒藥去其積檳榔木香行其氣下焦吐者得於寒地之病也其脈沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清大便秘而不通治法當以毒藥通其秘塞溫其寒氣大便秘通復以中焦藥和之不令大便秘結而自愈也王太僕曰食不得入是有火也食入反出是無火也又發明曰噎者六腑之所主陽也氣也塞者五臟之所主陰也血也二

者皆由陰中伏火而作也劉宗厚先生曰若三焦轉化失常所致主於氣也若血虧胃脘乾稿所致因於血也塞猶填塞不通之義故發有明治幽門不通噎塞不便通幽湯例蓋陽無陰不能通化陰之失位而陽伏其中傳化不變而反上行矣故前證或由飲食起居七情虧損脾胃痰飲停滯中氣不運當以補中益氣湯為主若鬱結傷脾用歸脾湯加枳壳桔梗若恚怒傷肝用小柴胡湯加枳壳參朮脾氣虛弱用六君子加山梔枳殼氣血俱虛用八珍湯加山梔半夏若用行氣之藥胸膈痞悶用六君芎歸之類若過用香燥之劑而大便秘結燥用四物參朮之類若飲食不能入用六君山梔吳茱萸製黃連若食入而反出用六君炮薑白芷菖黃連製吳茱萸若痰滯而食反出六君枳殼桔梗若飲食少思大便不實胸膈痞悶吞酸噯腐食反不化是為脾胃虛寒用東垣補真丸或八味丸若發熱煩熱身惡風寒腹畏熱食或手足俱冷胸滿腹脹是內真寒外假熱用神效附子丸或八味丸大凡嘔吐善食喜飲冷水是為有火嘔吐少食喜飲熱湯是無為火當審其因而治之

中國醫方

白礬散

治婦人翻胃吐食千金翼

云不特治婦人男子亦可服一斤以上為妙

白礬土以米醋一升煨土令赤入醋內浸冷 乾薑炒半 右為細末每服錢米飲調下甚者二錢

白芷散 治婦人翻胃吐食 右用白芷一兩切作片瓦上炒令黃為細末用猪

血二十文切片以沸湯泡七次將血蘸藥吃七片

如刺藥末留後次用

太倉丸 治脾胃虛弱不進飲食反胃嘔吐

白豆蔻 縮砂仁各二 丁香一兩 陳倉米赤去土炒末 右為細末薑汁糊丸桐子大每服

六七十粒食後淡薑湯下

青金丹 治嘔吐反胃等證

硫黃二錢 水銀一錢 右入鉢內慢火熬化以

木篦子撥砂成砂再入乳鉢研至不見星以薑汁

糊丸如菉豆大每服三十丸煎生薑陳皮湯吞下

補真丸

肉蓯蓉酒浸 胡盧巴炒 附子炮去 陽起石

煨酒浸 肉豆蔻煨 兔絲子淨洗酒 鹿茸酒浸

川烏皮去 沉香 五味子錢各五 鹿茸酒浸

巴戟去心 鍾乳粉各一 右為細末用羊腰子

兩對治如食法葱椒酒煮搗爛入酒糊丸如桐子

大每服七十丸空心米飲鹽湯任下

神效附子丸 治脾胃虛寒嘔吐或反胃膈噎

黑附子重一兩四五錢端正底平尖圓一枚底大

炮皮裂入生薑自然汁內浸潤晒乾仍炮再入汁

浸潤仍晒再炮用盡薑汁半碗為度却去皮臍末

之以人參膏和丸如黍米大每服數丸津唾嚥下

胃氣稍復飲食稍進投以溫浦之劑

反食方 治胃虛反食下喉便吐

人參一兩 澤瀉 甘草 桂心各二 橘皮

乾薑各三 茯苓四兩 大黃六兩 竹茹五兩

右九味咬咀以水八升煮取三升一服七合日三

夜一已利者去大黃

又方 治胃反吐逆不消食吐不止

人參 澤瀉 桂心各二 橘皮 甘草 黃芪

各三 大黃半兩 生薑八兩 茯苓四兩 半

夏一升 麥冬三升 右十一味咬咀以水一斗

二升煮取三升二合一服八合日三夜一贏人六

合已利去大黃

又方 治反胃大驗

又方 治反胃大驗

又方 治反胃大驗

又方 治反胃大驗



前胡 生薑各四兩 阿膠一兩 大麻仁五合 橘

皮三兩 桂心三寸 甘草五寸 大棗十枚

吳茱萸四合 右九味 咀以水三升 酒二升 煮

取一升 七合 分二服

單方 吐逆不止 紫背鉛二兩 燒鉛與鹽鹵汁五

兩 燂盡 與石亭脂二兩 同炒 焰起 挑水於上 焰止 研

勻 蒸餅丸 桐子大 每服二十丸 煎石蓮乾柿湯下

反胃吐食 水不能停 黑鉛水銀各一錢半 結砂舶硫

黃五錢 官桂一錢 為末 每服六錢 一半米湯 一半自

然薑汁 調作一處服 飲食入口即吐 困弱無力 垂

死者 上黨人參三大兩 拍破 水一大升 煮取四合 熱服

日二 兼以人參汁 入粟米雞子白 薤白 煮粥與噉 反

胃吐食 用甘蔗汁七升 生薑汁一升 和勻 日日細呷之

血膈

【中醫學說】薛立齋云 婦人血膈者 氣逆而血滯

用流氣飲 若恚怒而血逆 用小柴胡湯 加山梔丹皮

血虛 用四物湯 參朮柴胡 山梔丹皮 若鬱結而血傷

用加味歸脾 即歸脾加山梔丹皮 兼加味逍遙 脾虛

不能生血 用六君子加歸芎 胃虛不能生血 用補中

益氣湯 若肝虛而不能藏血 用補肝散 如不應 兼以

六味丸 若因脾肺虛 用補中益氣湯 如不應 用赤

子加歸芎

【中國醫方】牡丹煎 治婦人血膈

牡丹皮 苦參 貝母法 延胡索 白芍藥各

分 右為細末 煉蜜丸 桐子大 每服十五丸 至二十

丸 米飲吞下 無時

鼻衄

【中醫學說】擲而衄不止 蘇合香丸一圓 或以小

烏沉湯一錢 白湯調下 或煎濃蘇湯 獨調小烏沉湯

或添入黑神散一錢 鹽湯調下 亦得 仍驀然以水噴

其面 使載驚 則止 小烏沈濃蘇湯調 非特擲而衄 五

竅出血 皆治 不因擲而衄者 亦治 諸竅血 皆可以水

沃 噴驚 則血止 曾病衄 愈後血因舊路 一月或三四

衄 又有洗面而衄 日以為常 此即水不通 借路之意

並宜止血散 茅花煎湯調下 或四物湯加石菖蒲 阿

膠蒲黃各半錢 煎熟 調火煨石膏末一匙 頭許 兼進

養正丹 前諸證服不效 大衄不止者 養正丹多服 仍

佐之以蘇子降氣湯 便血隨氣下 衄後頭運 四物湯

或芎歸湯 十全大補湯 伏暑而衄者 茅花湯調 五苓

息無寐。病狀不一。漸成勞憊。當於虛損諸證詳之。有頭風繞發。則自衄不止。宜芎附飲。間進一字散。有因虛致衄。此為上虛下盛。不宜過用涼劑。宜養正丹及紫霞丹。仍佐以四物湯。多加芎歸。磨沈香服。傷濕而衄。腎著湯。加川芎。名除濕湯。傷胃致衄。名酒食衄。擲撲致衄。名折傷衄。此意外喜怒憂思諸氣。皆能動血致衄。名五臟衄。上膈極熱而衄者。金沸草散。去麻黃。半夏。加茅花。或荊芥穗。或用黃芩。芍藥湯。加茅花。一撮。虛極者。茯苓補心湯。飲酒過多及食熱物而衄。先用茅花湯。衄愈甚。則理中湯。加乾薑。川芎。各半錢。或止川芎。不必乾葛。或於理中湯。去乾薑。用乾葛。或止依本方。並芎不必加。或止用乾薑。甘草二味。外感四時。邪傳經絡。誤汗下。以致邪逼經血妄行。風證色青。多鼻衄者。金沸草散。去麻黃。加桔梗。枇杷葉。桑白皮。或參蘇飲。加黃芩。寒證色黯。鼻衄點滴者。九味羌活湯。麻黃升麻湯。暑熱逼血。色紅甚則黑者。茅花煎。湯調五苓散。婦人鼻衄者。由傷動血氣所致也。凡血氣調和。則循環表裏經絡。澀則不散。若勞傷損動。因而生熱。氣逆流溢入於鼻者。則成鼻衄也。只有產後見衄者不可治。凡鼻衄雖多。因熱而得此疾。亦

有因怒氣而得之者。當先用蘇合香丸四粒。次用五苓散。濃煎白茅花湯。調服即止。次用芎歸湯。調理薛立齋曰。前證若熱鬱於胃經。用犀角地黃湯。若伏暑於內。用黃連香需飲。若大怒血蓄於上。用小柴胡湯。若脾損不攝。血歸源。用歸脾湯。大凡雜證見血。多因陰分鬱熱。或內有所傷。皆屬五志所動。經曰。諸見血身熱脈大者難治。是火邪勝也。身涼脈靜者易治。是正氣復也。仍與後證同用。

【西醫學說】

鼻孔出血曰衄血。又曰衄血。雖毫無

疾病。亦能偶然而起。間有先頭痛頭重耳鳴而後出血者。婦人則多因月經閉止。或在麻疹痘瘡等熱病之經過中而發者。月經閉止之時。或頭部充血之際。因而患此者。必無何等障害。且轉得治頭痛。代月經。惟在血反病。及貧血者。重病恢復時。與衰老之人。如果患止。均宜速行治療。其時須速即安卧。高舉頭部。額間及兩太陽穴。俱以水或冰袋冷之。並以潔淨之棉花等塞住鼻孔。壯年人頭部充血者。須調勻大便。禁飽食暴飲。時散步山麓田野間。

【中國醫方】

刺薊散 治婦人鼻衄血流不止

刺薊二兩

桑耳

亂髮灰

艾葉

各一兩

生地

黃二兩 蒲黃一兩
右為細末每服二錢粥飲

調下無時

伏龍肝散 治男子婦人五臟結熱吐血衄血並皆

治之

伏龍肝 生地黃各一 竹茹一升 芍藥 黃

芩 當歸 川芎 桂心 甘草各二 右咬咀

以水一斗三升煮竹茹減三升納藥煮取三升分

為三服千金方無桂心

人參飲子 治衄血

人參 當歸各三 麥冬二分 黃芪 芍藥

甘草各一 五味子五枚 右水煎服

三奇散 治鼻血不止

亂髮灰一錢 人中白五分 麝香少許 右為

末吹入鼻孔效

龍骨散 鼻血不止眩冒欲死

龍骨半兩 亂髮燒為灰子大 右研為粉以少許

吹鼻中立止

涼榮湯 治吐血諸血

知母 黃柏 芍藥 麥冬 蒲黃 甘草 生

地 當歸 側柏葉各一分炒 右水煎服

麝香散 治鼻衄不止

白礬^{另研過} 白龍骨^{粘古者另研各半兩} 麝香^{另研末}

右三味杵和勻每用一茶匙先將冷水洗淨鼻內

後吹入

生地黄湯 治鼻衄

生地黄八兩 阿膠 甘草各一

兩一 右水煎服

又方 治衄血

生地黄 茅根 柏葉各三 川芎 山梔子 阿膠

黃芩 桔梗 蒲黃 白芍藥 牡丹皮

錢各一 甘草三分 右水煎服

茜梅丸 治衄血無時

茜草根 艾葉各一 烏梅肉五錢 右蜜丸

生地芩連湯 治鼻或衄流及一切去血失神

犀角 生地 黃芩 連翹 梔子 芍藥 芍

藥 柴胡 桔梗 甘草 右水煎服

單方 茅花湯以白茅花濃煎飲之立止或擣生

白茅根取汁一合飲之立止又方取生蔥心塞鼻

中即定若因刺著併刀斧所傷血不止者並用之立

定又方取釜底墨細研入鼻中又方取亂髮灰



細研。以竹管吹入鼻中立止。又方取龍骨為末吹入鼻中立止。又方少入枯礬於醋以綿或揉軟之紙浸之塞於鼻孔。又方以五倍子末吹入鼻孔。

〔外國醫方〕明礬末 護謨末各等分 右調和吹少許鼻孔內。良。

枯礬四瓦 阿仙藥兩瓦 右用水少許煉和以綿或紙為桿狀粘藥尖端塞入鼻孔。

明礬四瓦 右以水二合溶化洗滌鼻孔。

過格魯兒鐵液四瓦 水三百二十瓦 右以軟紙或布或綿球濕此藥水塞鼻孔內。

芒硝二瓦至六瓦 右為一包每一二時溶水中服之。皓礬一瓦 粗製明礬兩瓦 蒸銹水五十瓦 右調和嗅入料。

五倍子酒 阿仙藥酒各五瓦 右塗鼻孔內。吐血

〔中醫學說〕經云怒則氣逆甚則嘔血故氣上矣。又云陽氣者大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥。此皆怒則傷肝氣而嘔血。川黃連香附青黛柴胡甘草平其肝自愈矣。宜服赤茯苓瀉心湯。成益無聲者曰吐成碗有聲者曰嘔。上盛下虛血隨氣上法。

當順氣。氣降則血歸經矣。蘇子降氣湯。脈來微軟。精神困倦。是氣虛不能攝血。人參飲子。或獨參湯。脈洪有力。精神不倦。胸中滿痛。或吐血塊。用生地黃赤芍藥當歸丹皮丹參桃仁大黃之屬。從大便導之。無以出為逆。下出為順。苟非大虛泄瀉者。皆當行之。以轉逆為順。此釜底抽薪之妙法。若吐血已多。困倦虛乏者。不可行也。吐多而急欲止之。生地黃當歸丹皮赤芍藥煎湯。入藕汁童便各一鍾。血餘炭二錢。墨灰五分。調勻。熱服。怒氣傷肝者。丹皮芍藥木香之屬。勞心者。蓮子糯米柏仁遠志棗仁茯神之屬。酒傷者。乾葛茅花側柏荊芥穗之屬。飲食傷胃者。白朮陳皮甘草穀蘖砂仁之屬。吐血色黯。脈遲而寒者。理中湯。勞力者。蘇子降氣湯。加阿膠。或以猪肺煮熟。蘸白芨末食之。凡火不盛。氣不逆。而血動不止者。乃其元陰受損。營氣失守。病在根本。而然經曰。起居不節。用力過度。則絡脈傷。陽絡傷則血外溢。血外溢則吐血。陰絡傷則血內溢。血內溢則後血。此二言者。最得損傷失血之源。故凡治損傷。無火無氣而血不止者。最不宜妄用寒涼。以伐生氣。又不宜妄用辛燥。以動陽氣。蓋此二者。大非真陰虧損所宜者。而治此之法。但宜

純甘至靜之品。培之養之。以完固損傷。則營氣自將甯謐。不待治血而自安矣。且今人以勞傷而病者。多屬此證。不救根本。終必敗亡。婦人吐血者。皆由臟腑傷損所致。夫血者。外行於經絡。內榮於臟腑。若傷損氣血經絡。則血虛行。失於常理。氣逆者吐血。又怒則氣逆。甚則嘔血。然憂思驚恐。內傷氣逆上者。皆吐血也。薛立齋云。前證若脾經鬱熱。用犀角地黄湯。脾胃伏暑。用黃連香薷飲。心脾鬱熱。用生地黃湯。心氣耗損。用茯苓補心湯。肺氣勞傷。用雞蘇散。思慮傷脾。用歸脾湯。暴怒肝火。用加味小柴胡湯。久怒肝傷。用六味地黃丸。脾肺虛熱。用麥門冬飲。肝腎虛熱。用六味地黃丸。氣血俱虛。用十全大補湯。經云。肺朝百脈之氣。肝統諸經之血。必用甘溫之劑。補其陽氣。使血各歸其經。如大吐血病。每論其脈急。用獨參湯救之。若潮熱咳嗽而脈數者。元氣虛而假熱之脈也。皆由脾胃先損。須用人參之類。本草云。人參治脾胃不足。補中溫中。瀉脾肺中火。東垣先生云。脾胃虛者。心火亢甚。肺氣受邪。用黃芪最多。人參甘草次之。脾胃一虛。肺氣先絕。故用黃芪以益皮毛。而閉腠理。嘗治氣血虛弱。用十全大補最善。若用寒涼止血。胃氣反

傷。無不致禍。暴吐血。以祛瘀為主。而兼降火。久吐血。以養陰為主。而兼理脾。古方四生丸。十灰散。花蕊石散。祛瘀降火之法也。古方六味湯。四物湯。四君子湯。養陰補脾之法也。然血症有外感內傷之不同。假如咳而喘息有音。甚則吐血者。此風寒也。加味香蘇散散之。務農赤日。行旅長途。口渴自汗。而吐血者。此傷暑也。益元散清之。夏令大炎。更乘秋燥。發為乾咳。脈數大而吐血者。此燥火焚金也。三黃解毒湯降之。此外感之治法也。又如陰虛吐血者。初用四生丸。十灰散。以化之。兼用生地黃湯以清之。吐止。則用地黃丸。補之。陽虛大吐血。成升斗者。初用花蕊石散。以化之。隨用獨參湯以補之。繼則用四君八珍等。以調之。臟寒吐血。如天寒地凍。水凝成冰也。用理中湯以溫之。其或七情氣結。怒動肝火者。則用加味逍遙散。以疏達之。傷力吐血者。則用澤蘭湯以行之。此內傷之治法也。夫血以下行為順。上行為逆。暴吐之時。氣血未衰。飲食如常。大便結實。法當導之下行。病勢既久。氣血衰微。飲食漸減。大便不實。法當養陰血。兼補脾氣。大凡吐血。咯血。須用四君子之類。以收功。蓋陰血生於陽氣。脾土旺則能生血耳。治者念之。

〔西醫學說〕

西醫家於胃出血曰吐血。肺出血則

曰咯血。其區別至清晰也。當人之胃無出血者。必患
生胃潰瘍。胃癌。胃粘膜鬱血。或月經閉止等。然後有
之。發時必覺胃部壓重。且痞滿作痛。嘔吐繼之。物盡
則血至。血色暗黑。中尚雜食物之餘渣。大便之中亦
復混有血液。其鑑別之法有七。一血隨嘔吐而出。二
吐血前必噦惡。兼覺上腹壓迫。三必兼有肝胃病。四
血色暗紫。幾帶黑色。凝結成塊。五有酸性之反應。六
多雜有食物。七吐血輒發於俄頃。其時極短。吐血後
所下之糞便。其色必亦暗黑。此證除留意原病外。宜
立守安靜。仰卧勿動。停止飲食一晝夜。乃可進煮沸
之冷牛乳數食匙。又數日。更進其他流動性滋養物。
兼飲水。或吞碎冰塊。外則行冰罈法於胃部。頗有
效。其不能飲食者。則行滋養灌腸。

〔中國醫方〕

雞蘇散 治婦人吐血心煩昏悶

雞蘇葉

阿膠

刺薊

生地黃

黃芪

羚羊角屑

葛根

甘草

麥門冬

黃芩

當歸

伏龍肝

石為粗末

每服四錢

水一

盞薑三片

竹茹半雞子大

煎至六分

去滓

溫服

又方 治婦人虛損氣逆吐血不止

雞蘇葉

黃芩

當歸

赤芍藥

伏

龍肝

阿膠

右為粗末

每服四錢

水一

盞

煎六分去滓溫服

治婦人熱毒上攻吐血不止

生藕汁

刺薊汁

生地黃汁

生薑汁

白蜜一合

右和煎三兩沸以小盞調炒麵一錢

服無時

吐血神驗方

地黃汁

生大黃末

雨調大黃末令勻分為三服

柔脾湯

治虛勞吐血衄血下白汗出方

甘草

白芍藥

黃芪

為末每服四錢

水酒各一盞以上煎至七分去滓

取清汁六分溫服食前

四生丸

療吐血凡吐血衄血陽乘於虛血熱妄行

宜服此藥

生荷葉

生艾葉

生柏葉

生地黃

右

爛研

圓如雞子大

每服一丸

水三盞

煎至一盞去

滓溫服無時

又方

生地黃 切三升 阿膠 炒二兩 蒲黃 六合 石以水

五升煮取三升分三服

犀角地黃湯 治內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑

芍藥 半斤 生地黃 半斤 牡丹皮 去心淨 犀

角 一兩 升麻 如無以 右咬咀每服五錢水煎服有

熱如狂者加黃芩二兩

乾薑甘草湯 若陰乘於陽心肺經寒而嘔血者宜

服 甘草 乾薑 各半 右咬咀水煮頓服

雞蘇散 治勞傷肺經唾中有血咽喉不利

雞蘇葉 黃芪 炒 生地黃 阿膠 炒 貝母

白茅根 各一 桔梗 炒 麥門冬 去心 蒲黃 炒

甘草 五分 右薑水煎服

生地黃散 治鬱熱衄血咯血吐血陰虛而不能愈者

枸杞子 柴胡 黃連 炒 地骨皮 天門冬 去心

白芍藥 甘草 炒 黃芩 炒 黃芪 炒 生地

黃熟地黃 各 右水煎服下血加地榆

茯苓補心湯 治面色黃悴五心煩熱咳嗽吐血

半夏 前胡 紫蘇 茯苓 人參 枳殼 無炒

桔梗 炒 甘草 炒 乾葛 各五 當歸 川芎

陳皮 白芍藥 各一 熟地黃 自製一錢半 右薑棗

水煎服

麥門冬飲子 治氣虛吐血或氣虛不能攝血

五味子 十 麥門冬 去心 黃芪 炒 當歸

身 人參 生地黃 各半 右水煎服

十灰散 祛瘀生新止血之利劑

大薊 小薊 茅根 茜根 老絲 山梔

蒲黃 荷葉 大黃 亂髮 右燒灰存性每服

二三錢藕湯調下

聖中湯 治虛勞內傷嘔逆吐血

糖 三斤 芍藥 半夏 生薑 甘草 各二 桂

心 二兩 大棗 五十 右七味咬咀水二斗煮取

七升分七服日五夜二

又方 治吐血內崩上氣面色如土

乾薑 阿膠 柏葉 各二 艾 一把 右四味咬

咀以水五升煮取一升內馬通汁一升煮取一升

頓服仲景名柏葉湯不用阿膠

治血散 治一切吐血

茜根 四兩 大豆 黃藥子 甘草 各二 右為末每服二錢新汲水調下