

未41
141

喉科紫珍集



嘉慶甲子重訂

盛德堂刻

喉症全科紫珍集

京江尊仁堂藏板



前序

嘗謂吾人氣機呼吸在喉瞬息存亡之介亦在於喉
係於人蓋甚重矣胡可令受病哉顧病之由起於不
生者也或因熱毒蘊積胸膈口腹多嗜煎炒或膏粱厚味
飲酒過度不辭勞苦貪啖炙煖熱毒之物受鬱結之氣感
月風雨濕熱內積疫火上蒸辛苦越格種種根源皆病之
所由以侵于喉其症有七十二種種不同且如喉痺之
害有陰有陽而陰陽之狀不可不察紅腫外見者陽也悞
服辛熱之劑謂之以陽攻陽毒氣愈勝以其為出生入死



之路欲奏速效此必不可得之數也如舌生黃黑飲食阻
碍吞吐不利疼痛難忍不見紅腫陰也驟服寒涼尅伐反
致生痰作燥謂之以陰尅陰其憂愈甚致之於膏盲雖有
明驗百無一二矣此為醫者施治之大畧也且人之關鍵
惟咽喉乃出入之門其帝丁為主庸醫悞犯刀針人之受
死者多矣嘗聞每有不吐不利等症誤認帝丁以作病根
或以刀針屢傷其命不知其症不識其形而以執刀為戲
若是之愚也喉症殊形異類治法多端當察其表裏虛實
起病日數表者散之裏者利之虛者益之實者瀉之須觀

其人之壯弱氣血盛衰天之四季究其根由對症用藥有
醫百中于斯道也思過半矣懼後學者不得其門而入爰
詳載症之所自起上列一圖下陳一論前列諸方後之人
思得其旨從而月以繼月日以繼日沉潛反覆按圖審症
揀方求治何患命之登于天歟而醫生不幾于再生哉若
夫不審虛實擅用刀針概用涼劑不惟不效而反害之是
自蠹其生理也擅專門者慎之慎之



治喉十要歌

一針手足兩少陽鮮血迸流命不傷若是些須黃白水
知旦夕見危亡。

二從耳下頸腮中

把麻絲細刮紅方用眉刀患處割血

鮮多者不爲凶。

三針舌下兩青筋血出鮮紅病體輕黑塊成条終是死胸

中結熱把痰清

四般惡症曰懸癰腫腭纏喉並鎖風熱積風痰胸膈結三

黃行下自疎通。



五內虛邪火上行欲教分散必須針。少商曲池頰車穴男
左女右辨分明。

六用追風散去痰痰如清水不多援。連吹本秘寬胸結京
膈追風及早嗽。

七從頭尾可行針切忌中間根上行鮮血多來休慮遠黑
而少者不長生。

八力割患要深知麻藥先從患處吹撐口中間鈎搭住連
施刀法莫狐疑。

九行烙銑要除根炭火桐油一處焚只待燒紅須細烙連

將秘藥上安寧

十全灸法灸風池五壯原來甚得宜。再把頰車加幾

商灸後曲池隨。

海痰壅。追風散常用。三黃原隔散。



河南中醫藥大學圖書館版權所有

降火之功。二陳劑防湯。有節痰驅風之力。貴關必資內

收成全賴生肌。祿藥用之於未針之前。秘藥用之于針

之後。吹散如干葉碧雪。與本秘均藥同功。煎方如雙和

陰。與膈胃涼湯並效。祿藥敷之紅腫散。水藥即同服後

痰行。洗藥可以去舊生新。燠藥可以伐邪存正。清咽丸

善後之妙法。紫瓊膏有益氣之神功。本秘吹之于痛時。

五內虛邪火上行欲散分發必須外生而曲流順清
左支右辨分明。

六用追風散去痰痰如清水不多換過少不粒定用
隔追風及早吸。

七從頭尾可行針切忌中間橫上行無血交者
而少者不長。

南炎曲曲曲曲

如麻藥先從患處吸去其毒而後針之

十全大補丸風此正無風來甚好宜再睡臥車吹幾時

除痰藥土安寧
除根炭火桐油一處放只待燒紅須知



治喉秘法

夫咽喉之症。用藥須知緩急。行針貴識頭尾。如牙關緊急。通關散可吹。風毒痰壅。追風散當用。三黃涼膈散。有消毒

降火之功。二陳荆防湯。有豁痰驅風之力。潰爛必資內托。

收成全賴生肌。麻藥用之於未針之前。秘藥用之于既針

之後。吹散如十葉碧雪。與本秘均藥同功。煎方如雙和濟。

陰。與膈胃涼湯並效。箍藥敷之紅腫散。水藥即闔服後鬱

痰行。洗藥可以去舊生新。燠藥可以伐邪存正。清咽丸爲

善後之妙法。紫瓊膏有益氣之神功。本秘吹之于痛時。刀

針用之于腫起雙蛾單蛾。生在咽門而圓小無膿則吹。行針有膿則挑破自愈。可服涼膈等湯。喉疔花疔。形似釘而差長。先麻而鈎住刀割。卽烙而吹秘止痛。預嘗肉托等劑。雙喉癰單喉癰。平大而圓。耳下腮邊腫起。治同蛾子。藥亦無殊。而癰憑內托左雀舌右雀舌。形小而尖。喉舌癰有痰。割類喉疔。方亦不異。但雀舌用三黃。鉗舌蓮花。靠牙邊而起五峯中不可針。針宜旁穴。纏舌喉風。硬舌根而爛兩邊。藥不可煖。煖則難痊。死乳蛾核。活乳蛾核。日久長大。作痛無時。用刀細割一層。擦爛藥于其中。休吞及吐。吹秘。

藥一月。方可見功。用烙烙之三黃可服。走馬疳牙疳喉疳。
口疳。瘡毒。牙齦紫腫。臭穢不堪。必吹本秘生肌。午後年干。
漱口。臉腫頭搖。咽乾音啞。身熱唇穿。落齒無血。俱爲不治。
土茯苓末。自有奇能。喉單似蛾尖而長。宛若牛乳之狀。氣
單似梅核而小。須行四十九針。回食單卽旬氣生。帝丁之
旁。紅起當中卽名梅核。吞之不下。吐之不出。因氣而生。梅
核用針。而旬氣用刀刺。三黃十八俱皆用。二陳四七見收。
功重舌一名鉅舌。可刺金津玉液。丁腫號曰懸丁。點秘服。
藥清咽。死舌瘡名木舌。堅硬不能展側。匝舌瘡在兩邊。能

令舌短難說。刮苔吹用追風瘡頭必須刀剔。初用三黃等劑。久將內托投之。白苔紫色猶堪治。黑刺生來魂魄離。紅白能言易治。黑腫短突難醫。兜腮瘡生腮下。外用金箍散。內服十八方。膿生火針刺。肉爛秘生肌。膿從口出者易治。膿出腮者難痊。喉舌有心而爛。珍珠滿口流涎。俱用三黃涼膈。間吹本秘宜然。飛瘍立時而起。喉痺傾刻而生。治此必先探吐。本秘刀刺何傷。鎖喉風牙關緊急。手足登開。先針四穴。以辨死生。次浴手足。以開脾胃。或刀或針。血去腫消。爲上策。纏喉風眼白而紫。項腫難言。角弓反張。命在須臾。

史而難保。探痰刺血病根除。喉毬相牽似線。可服益氣疎
風。再用麝香調服。兼吹本秘追風。骨槽風如口噤。治之先
吐風痰。垂下五分灸七。清陽散火療之。舌下有泡。須用刺
青筋。膠涎隨即出。或如鷄清。加味二陳湯。清熱如聖散。用
之皆效。喉中有息肉壅塞相層疊。枸橘湯雄黃末。飲搽最
妙。出汗生瘡。腫黑生瘡。左右陰瘡。三般無異。金箍散十八
方。敷服相當。氣瘡喉痺。酒毒喉痺。二者同途。金鎖匙。三黃
湯。吹飲即愈。大凡吹藥先吹本。下了刀針用秘吹。餘腫不
消。用均末。刀口難完。上生肌。喉中氣穢。和中曰。追取風痰。



金鎖匙。水藥時噙口。冰梅頻咽津。抑火三黃涼膈散。消腫
須知十八方。內托千金散。化痰二陳湯。虛火血分從四物。
陽虛氣弱四君當。惡寒當解表。便秘必疎通。斯是喉症要
訣。學者必定精工。

臨症二十法

凡咽喉無病。其色淡紅而白。不高不腫。一有害起。其色必紅。若腫者。或是癰。或是痺。或是蛾。認病不真。只須吹本藥。及十葉散。于紅腫處。下針刀。吹秘藥。碧雪無有不效。如不腫。直是紅且痛。乃風熱太甚。謂之白鎖喉風。與喉痺。不須下針刀。止吹本秘。十葉碧雪。服後十八味神藥。一帝丁。在人咽喉中。爲之主宰。下刀動針。不宜犯之。若犯刀針。寔難醫治。

一腫腭。乃是人之上腭。腫至舌。風熱過盛。治之早者。猶或

可生。治之遲者。湯藥難進。

一懸丁。卽是帝丁。腫起紅而下垂。懸喉中。刀針難施。

一人蘊積熱毒。咽喉中。有大小諸瘡者。謂之珍珠毒。令人

常作口乾。常起稠痰。若是辛苦。亦或作痛。吞吐不利。當吹

本秘。或十葉碧雪。以針密密挑破出血。服學士湯。及解疫

清金。清咽。雙和等劑。全愈後。加服抑火丸。以杜後患。

一用針之法。先用捺舌。捺倒舌根方。以針靠捺舌輕輕一

挑。卽出。切不可遲慢。恐患者低頭吐痰。血暈事。若遠遠刺

去。須防帝丁。