

醫統正脈全書

十九



脈經卷五

張仲景論脈第一

扁鵲陰陽脈法第二

扁鵲脈法第三

扁鵲華佗察聲色要訣第四

扁鵲診諸反逆死脈要訣第五

張仲景論脈第一

問曰脈有三部陰陽相乘榮衛氣血在人體躬千金作

躬呼吸出入上下於中因息游布津液流通隨時動作

厥系 卷三
倣象形容春弦秋浮冬沈夏洪察色觀脈大小不同一時之間變無經常尺寸參差或短或長上下乖錯或存或亡病輒改易進退低昂心迷意惑動失紀綱願爲縷陳令得分明

師曰子之所問道之根源脈有三部尺寸及關榮衛流行不失衡銓腎沈心洪肺浮肝弦此自經常不失銖分出入升降漏刻周旋水下二刻脈一周身旋復寸口虛實見焉變化相乘陰陽相干風則浮虛寒則緊弦沈潛水瀉支飲急弦動弦爲痛數洪熱煩設有不應知變所

緣三部不同病各異端太過可怪不及亦然邪不空見
中必有奸審察表裏三焦別分知邪所舍消息診看料
度腑藏獨見若神爲子條記傳與聖人

扁鵲陰陽脈法第二

脈平旦曰太陽日中曰陽明晡時曰少陽黃昏曰少陰
夜半曰太陰鷄鳴曰厥陰是三陰三陽時也

少陽之脈乍小乍大乍長乍短動搖六分王十一月甲
子夜半正月二月甲子王

太陽之脈洪大以長其來浮於筋上動搖九分三月四



月甲子王

陽明之脈浮大以短動搖三分大前小後狀如科斗其
至跳五月六月甲子王

少陰之脈緊細動搖六分王五月甲子日中七月八月
甲子王

太陰之脈緊細以長乘於筋上動搖九分九月十月甲
子王

厥陰之脈沈短以緊動搖三分十一月十二月甲子王
厥陰之脈急弦動搖至六分以上病遲脈寒少腹痛引



腰形喘者死脈緩者可治刺足厥陰入五分

袁校云遲脈二字疑

衍

少陽之脈乍短乍長乍小乍大動搖至六分以上病頭

痛脇下滿嘔可治擾即死

一作偃可治偃即死

刺兩季肋端足少

陽也入七分

陽明之脈洪大以浮其來滑而跳大前細後狀如科斗

動搖至三分以與病眩頭痛腹滿痛嘔可治擾即死刺

臍上四寸臍下三寸各六分

從二月至八月陽脈在表從八月至正月陽脈在裏附

陽脈強附陰脈弱至卽驚實則痢癰細而沈

案泰定不本作流

痢癰卽泄泄卽煩煩卽渴渴卽腹滿滿卽擾擾卽腸澼

澼卽脈代乍至乍不至大而沈卽欬欬卽上氣上氣甚

則肩息肩息甚則口舌血出血出甚卽鼻血出

變出寸口陰陽表裏以互相乘如風有道陰脈乘陽也

寸口中前後溢者行

案泰定袁夜本作勞

風寸口中外實內不滿

者三風四溫寸口者勞風勞風者大病亦發駛行汗出

亦發與風者上下微微扶骨是其診也表緩腹內急者

與風也猥雷實夾者飄風從陰趨陽者風邪一來調一

來速鬼邪也陰緩陽急者表有風來入藏也陰急者風
風抱陽入腹上遂遂下宛宛不能至陽流飲也上下血
微陰強者爲漏癖陽強者酒癖也偃偷不過微反陽澹
漿也陰扶骨絕者從寸口前頓趨於陰汗水也來調四
布者欲病水也陰脈不偷陽脈傷復少津寸口中後大
前兌至陽而實者癖食小過陽一分者七日癖二分者
十日癖三分者十五日癖四分者二十日癖四分中伏
不過者半歲癖敦敦不至胃陰一分飲舖餌癖也外勾
者久案居敬本作反癖也內卷者十日以還外強內弱者裏居案

敬本 大核也并浮而弦者汁核并浮緊而數如沈病暑

作裏 食粥一作微有內緊而伏麥飯若餅寸口脈倚陽緊細以

案居敬 微瓜菜皮也若倚如緊薺藏菜也蹟蹟無數生

本作似 肉癖也附陽者炙肉癖也小倚生浮大如故生麥豆也

案癖泰定居 敬本俱作僻

扁鵲脈法第三

扁鵲曰人一息脈二至謂平脈體形無苦人一息脈三

至謂病脈一息四至謂痺者脫脈氣其眼睛青者死人

一息脈五至以上死不可治也都一作聲息病脈來動取



極五至病有六七至也

袁桡云疑有闕文

扁鵲曰平和之氣不緩不急不滑不濇不存不亡不短

不長不俛不仰不縱不橫此謂平脈腎一作緊受如此一作

剛身無苦也

後八字疑衍

扁鵲曰脈氣弦急病在肝少食多厭裏急多言頭眩目

痛腹滿筋攣癰疾上氣少腹積堅時時唾血咽喉中乾

相疾之法視色聽聲觀病之所在候脈要訣豈不微乎

脈浮如數無熱者風也若浮如數而有熱者氣也脈洪

大者又兩乳房胡案居敬本作動脈復數加有寒熱此傷寒病



也若羸長病如脈浮濫寸口復有微熱此疰氣病也如復欬又多熱乍劇乍瘥難治也又療無劇者易瘥不欬者易治也

袁校云疑有闕文

扁鵲華佗察聲色要訣第四

病人五藏已奪神明不守聲嘶者死

病人循衣縫譫言者不可治

病人陰陽俱絕掣衣撥空妄言者死

病人妄言錯亂及不能語者不治熱病者可治

病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死



病人兩目皆有黃色起者其病方愈

病人面黃目青者不死青如草滋死

病人面黃目赤者不死赤如衄血死

病人面黃目白者不死白如枯骨死

病人面黃目黑者不死黑如炲死

病人面目俱等者不死

病人面黑目青者不死

病人面青目白者死

病人面黑目白者不死

病入面赤目青者六日死

病人面黃目青者九日必死是謂亂經飲酒當風邪入胃經膽氣妄泄目則爲青雖有天救不可復生

病人面赤目白者十日死憂患思慮心氣內索面色反好急求棺槨

病人面白目黑者死此謂榮華已去血脈空索

病人面黑目白者八日死腎氣內傷病因留積

病人面青目黃者五日死

病人着牀心痛短氣脾竭內傷百日復愈能起徬徨因

坐於地其立倚牀能治此者可謂神良

病人面無精光若土色不受飲食者四日死

病人目無精光及牙齒黑色者不治

病人耳目鼻口有黑色起入於口者必死

病人耳目及顴頰赤者死在五日中

病人黑色出於額上髮際下直鼻脊兩顴上者亦死在

五日中

病人黑氣出天中下至年上顴上者死

千金翼云天中當鼻直上至髮

際年上在鼻上兩目間

病人及健人黑色若白色起入目及鼻口死在三日中

病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者死

病人面黑目直視惡風者死

病人面黑脣青者死

病人面青脣黑者死

病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死

病人目

案居敬本目下有回回二字

直視肩息者一日死

病人頭目久痛卒視無所見者死

病人陰結陽絕目精脫恍惚者死

病人陰陽絕竭目眊陷者死

病人目系傾者七日死

病人口如魚口不能復閉而氣出多不反者死

病人口張者三日死

病人脣青人中反者三日死

病人脣反人中滿者死

病人脣口忽乾者不治

病人爪甲青者死

病人爪甲白者不治

病人手足爪甲下肉黑者八日死

病人榮衛竭絕面浮腫者死

病人卒腫其面蒼黑者死

病人手掌腫無文者死

病人臍腫反出者死

病人陰囊莖俱腫者死

病人脈絕口張足腫者五日死

病人脣腫齒焦者死

病人陰陽俱竭其齒如熟小豆其脈駛者死

千金方
駛作躁

