



丹溪心法附餘卷之二十二

小兒門

小兒諸病九十九

丹溪心法

○乳下小兒常多溼熱食積痰熱傷乳為病大槩肝與脾病多 小兒易怒肝病最多大人亦然肝只是有餘腎只是不足

○小兒初生未經食乳急取甘草一寸火上炙熟細切置地上出火毒一時許用水一小盞熬去三分之一去滓用新綿蘸滴兒口中令嚙盡須臾吐痰及瘀血方與乳食年長知睿無病

○小兒急慢驚風發熱口禁手心伏熱痰熱咳嗽痰喘此類證並用湧法吐之重劑瓜蒂散輕劑用苦參赤小豆末須臾薑汁調服之後用通聖散為末蜜丸服間以桑樹上牛兒陰乾焙末調服以平其氣

驚有二證 一者熱痰主急驚當吐瀉之 一者脾虛乃為慢驚所以多死當養脾 急驚只用降火化痰養血 慢驚者先寔脾吐後散風邪只用硃砂安神丸更於血藥中求之

○小兒驚然無故大叫作發者必死是火大發則虛其氣故也

入方黑龍丸 治小兒急慢驚風

牛膽南星

雨一青礞石 煅硝等分 煨一兩

天竺黃

兩半

青黛

兩半

蘆薈

二錢

辰砂

三錢

右為末甘草煎膏丸如雞頭大每服一二丸急驚煎薑蜜薄荷湯下慢驚煎桔梗白木湯下

治驚而有熱者

人參

茯苓

白芍

酒炒

白木

右咬咀薑煎夏月加黃連生甘草竹葉

通聖散

見痘疹類

朱砂安神丸

見驚悸類

瓜蒂散

見痘類

疳病或肚大筋青

胡黃連丸

治疳病腹大

胡黃連

半錢

阿魏

一錢

神麴

二錢

麝香

四粒

炒黃連

二錢

去熱積

右為末豬膽汁丸如黍米大每服二三丸白木湯送下

又云胡黃連丸十二粒白木湯下

五積丸 治小兒諸般疳積 丑頭末一兩黃連半兩陳皮一兩青皮半兩山查半兩

右炒焦黑色為末每用已豆霜半錢前藥末半錢宿蒸餅丸麻子大小兒二歲十丸五更薑湯下至天明大便泄為度溫粥補之未利再服三五丸

烏犀丸 丑頭末三兩青皮兩三史君子肉半錢白蘊莖半錢鶴虱錢五蘆薈錢一錢燒紅苦練根皮錢五

右炒令焦黑色為末麴丸麻子大每三五十丸米飲送下食前量小兒大小加減

黃龍丸 三稜三兩黑角莪術三兩青皮半兩山查肉半錢乾薑半錢

右用麴丸麻子大日曬乾食後薑湯下量兒大小加減 ○烏犀黃龍間服食前服烏犀食後服黃龍

肥兒丸 治小兒疳積 蘆薈研胡黃連錢三炒麴錢四黃連白朮山查兩半燕莖錢二

右為末蘆薈和勻猪膽汁如粟米大每六十丸食前米飲下

疳黃積食 白朮黃連苦參山查右為末麴丸麻子大食後白湯下十五丸

食傷胃熱重蒸 白朮一兩半夏黃連半兩平胃散右用粥丸食後白湯下二十丸

○心法附錄曰小兒疳病者小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆因乳食不調甘肥無節而作也或嬰幼缺乳粥飯太早耗傷神氣則疳之根生延及歲月五疳病成甚者胸陷喘噦乳食直瀉腫滿不利腹脇脹疼皮發紫瘡肌肉光紫與夫疳勞渴瀉面槁色夭骨露莖張腹硬不食者皆危篤矣凡此等類盧扁復生難施其巧

○子熱 炒芍藥 香附 滑石一兩甘草三錢黃連二錢 右作四服水一盞半生薑三片煎乳母服

○風痰 南星一兩切用白礬末半兩水白附子二兩

右為末飛白麴糊丸如芡實大每服一二十丸薑蜜薄荷湯化下

白附丸 牛膽南星一兩須用黃牯牛胆臘月粉南星親手修大陳半夏半兩粉白南星一兩切作片用臘月乾

合風乾隔一年用牛胆須入二三次者佳 右為末宿蒸餅丸如梧子大用薑汁蜜湯送下有熱加薄荷葉

枯白礬二錢

右為末宿蒸餅丸如梧子大用薑汁蜜湯送下有熱加薄荷葉



紫金丸 治小兒哮喘不止端午日修合 黑椒四十九粒浸透去 人言錢一鵝管石錢

右為末丸如黍米大朱砂為衣每一丸或二丸量兒大小空心冷茶清下當日忌生冷葷腥熱物服藥病止後更服白附丸三五貼

○小兒腹痛多是飲食所傷 宜白朮上 陳皮中 青皮中 山查中 神麴炒 砂仁下 麥蘖 甘草 受寒痛者加藿香吳茱萸 有熱加黃芩水煎服

○小兒腹脹 蘿蔔子蒸 紫蘇 乾葛 陳皮等分 甘草減半 食減者加白朮煎服

小兒好喫糗成腹脹疼用白酒麴末同黃連末為丸服之愈

又方 治小兒腹脹 茯苓皮 陳皮 赤小豆 蘿蔔子炒 木通各半 木香二 甘草 右咬咀薑一片煎服

○小兒吐瀉黃疸 三稜中 莪朮中 青皮中 陳皮上 神麴炒 茯苓上 麥蘖下 黃連下 甘草下 白朮上

右為末調服 傷乳食吐瀉加山查 時氣吐瀉加滑石 發熱加薄荷

○夏月小兒吐瀉用益元散錢氏五補五瀉之藥俱可用吐瀉腹痛吐乳調脾以平胃散入熟蜜加蘇合香

丸名萬安膏用米湯化下 ○夏月熱病六一散最妙

○小兒痢疾 黃連下 黃芩下 陳皮上 甘草中 右以水煎服 赤痢加紅花桃仁 白痢加滑石末

又方 治小兒食積痢 炒神麴中 蒼朮中 滑石中 白芍上 黃芩中 白朮上 甘草炙 陳皮下

右咬咀水煎下保和丸 一方加茯苓 ○小兒赤痢壯熱用藍青搗汁每服半錢與之妙

○小兒黑斑紅斑瘡痒癰疹並宜用防風通聖散為末調服

○小兒口瘡 戴云謂滿口生瘡者便是 江茶 粉草 右為末敷之 一方用黃丹一錢炒過傳之

又方 苦參 黃丹各錢二 五倍子錢二 青黛錢一 右等分為末敷之

又方 青黛錢二 芒硝錢一 右為末敷口中吐酸俱宜

又方 黃柏錢二 細辛錢三 青鹽分五 右等分為末噙之吐出涎不過三日愈亦治大人

治胎毒口瘡五倍子黃丹甘草江茶芒硝等分為末敷之

龜胸

蒼朮

中

酒柏

中

酒芍藥

上

陳皮

上

防風

中

威靈仙

下

山查

中

當歸

上

痢後加生

中

水煎服

○小兒夜啼此是邪熱乘心

黃連

薑汁炒

甘草

一錢半

右用竹葉二十片煎服

又方 加人參二錢半作二服入薑一片煎

又法夜啼不止潛取捕雞窠草一握置小兒身下

○小兒脫肛 戴云脫肛者大腸脫下之說

脫囊即外腎腫大

戴云脫囊者陰囊腫大墜下不收

上之說 或云潰爛陰丸脫出

入方 木通 甘草 黃連 炒當歸 黃芩 右以水煎服

又方 治脫肛 用東北方陳壁土泡湯先熏後洗

又方 治脫囊 紫蘇葉莖為末如爛乾傳如未傳用香油調鵝翎刷 又用青荷葉包上

○小兒木舌 戴云木舌者舌腫硬不和軟也又重舌者亦是此類二者皆是熱病

入方 百草霜 芒硝 滑石 右為末酒調傳之 重舌用好膽礬研細傳之

○咯血 戴云咯紅者即唾內有血非吐血與咳血同 又方 黑豆 甘草 陳皮 右水煎食後服

○小兒尿血 甘草湯調益元散加升麻煎服尤妙

○小兒喫泥冒氣熱故也 入方 軟石膏 黃芩 陳皮 茯苓 白朮 甘草 右用水煎服

又方 膩粉一錢砂糖和丸如麻子大米飲下一丸瀉出土立瘥

○小兒解顱乃是母氣虛熱多耳 戴云即小兒初生小兒頭二骨未合而開者

入方 四君子與四物子母皆可服 有熱加酒炒黃芩黃連生甘草煎服外用帛束緊用白飲末傳之

○小兒吐蛭蟲 以苦練根為君佐以二陳湯煎服

小兒冬月吐蛭多是胃寒胃虛所致錢氏白朮散加丁香二粒

錢氏白朮散 藿香 白朮 木香 白茯苓 甘草 人參 各一乾葛 錢 右為末每一錢至二錢水煎服

○小兒口噤 治法用搐鼻 鬱金 藜蘆 瓜蒂 右為末水調搐

○小兒禿頭 用白炭燒紅碎長流水令熱洗之內又服酒製通聖散除大黃而用酒炒入研為末再用酒拌

乾每服一錢水煎頻服 外又用胡荽子伏龍肝懸龍尾即梁上灰塵黃連白礬為末油調傳

又方 松樹厚皮燒反黃丹水飛二兩寒水石細研白礬枯黃連 大黃各半白膠香熟飛輕粉四錢或二兩

右為末熬熱油調傳瘡上須先洗了瘡加傳之佳

又方 治小兒癩頭并身癩等証 松皮燒白膠香 枯礬 大黃 黃柏 右為末用熱油調敷

○小兒頭瘡 臘猪油半生雄黃 水銀等分 右研和勻洗淨傳瘡上

又方 川芎 酒片苓 酒芍藥 陳皮兩半 酒白朮 酒當歸一兩 酒天麻 蒼朮 蒼耳半 酒柏

酒粉草錢四 防風錢三 右為末水盪起煎服日四五次服後睡片時

又方 單治頭瘡 松樹皮厚者燒白膠香熟沸傾石 黃丹一兩白礬火飛黃芩 黃連 大黃各二蛇床子

寒水石錢三白芷 無名異炒少木香痛者用輕粉 右為末樟腦燭油搽七日如櫻桃膿窠者去椒搽之

又小兒瘡 猪牙皂角皮去胡椒 枯礬 輕粉 右為末樟腦燭油搽七日如櫻桃膿窠者去椒搽之

○小兒臍腫汁出 用枯白礬末傳或黃柏為末傳之

又小兒臍不乾 伏龍肝塗 或用枯礬煨過白龍骨等分為末傳之

○小兒天火丹臍腹起者赤溜不妨 蚯蚓泥炒調傳

○小兒赤溜 主熱傷血 用生草木通荆芥苦藥帶表之類外以芭蕉油塗患處芒硝濃煎汁洗之

又方 雞子清調伏龍肝傳之

○小兒耳後月蝕瘡 黃連 枯白礬 右為末傳之

○小兒鼻赤 雄黃 黃丹 右同為末無根水調傳之 又蒼耳葉酒蒸焙乾為末調服最解食毒

又鼻下一道赤者名曰蠱以黃連末傳之

辛夷膏 專治小兒鼻流清涕不止 辛夷葉一兩洗淨焙乾 細辛 木通 白芷各半兩 杏仁一兩去皮研如泥 木香半兩

右為細末次用杏仁泥羊骨髓猪脂各一兩同諸藥和勻於瓦石器中熬成膏赤黃色為度於地上放冷入腦麝各一錢拌勻塗顙門上每用少許塗鼻中

○小兒變蒸是胎毒散也

○乳兒瘡疾痞塊 川芎錢二 生芩 白芍半錢 陳皮 半夏 炒芩錢一 甘草分二

右作一服薑三片熟煎下甲末半錢 ○胎熱胎寒 新增

附諸方

釀乳方 楊氏方 解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便不通不能進乳食

澤瀉半兩 猪苓 赤茯苓 天花粉 茵陳 甘草各一兩 生地黃二兩

右咬咀每服二錢水一盞煎至半盞食後令乳母捏去宿乳却服

生地黃湯 楊氏方 治小兒生下遍體皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之候

皆因母受熱而得於胎也凡有此證乳母宜服此藥并略與些兒服

生乾地黃 當歸 赤芍藥 川芎 天花粉各等分 右咬咀每服五錢水一盞煎服

當歸散 楊氏方 治小兒胎中受寒生下再感外風面色青白四肢厥冷大便青黑及腹疼盤腸內疳病並皆治之

當歸剉微炒 黃耆蜜炙 細辛 黃芩 龍骨細研 桂心 赤芍藥各半兩

右為末每服以乳汁調下一字日三服看兒大小加減

鉤藤膏 楊氏方 治內吊腹疼 沒藥 乳香各三錢 木香 薑黃各四錢 木鱉十一箇

右先將後三味為細末同煎二味拌和煉蜜成劑收沙罐內量兒大小加減煎鉤藤湯化下次服魏香散

魏香散 錢氏方 蓬莪木半兩 真阿魏一錢

右先用溫水化阿魏浸蓬莪木一晝夜焙乾為末每服一字煎紫蘇米飲空心調下



胎寒傷氣痛 楊氏方

方用沒藥乳香各少許研細用木香一塊於乳鉢內磨水一盞調乳香沒藥末煎數沸服之立効

茴香散 宣明方治小兒盤腸氣痛 茴香 炒木香 黑附子 金鈴子 去核 羅蔔子 炒 檳榔 破故紙 炒

白豆蔻 煨各 右吹咀每服二錢水盞半入鹽煎服

木香散 經濟方治小兒盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼叫尿如米泔

川練子 二箇去皮拔用已豆十五粒 木香 黃史君子肉 延胡索 茴香 各一錢

右同為末清米飲空心調下量兒大小服之

勻氣散 治氣滯不勻宿食不消心腹刺痛嘔吐惡心調脾胃進飲食

丁香 檀香 木香 白豆蔻砂仁 各四錢 藿香 甘草 各八分 沈香 三錢 陳皮 四錢

右為末研細用鹽湯調不拘時候 ○臍風撮口 新增

附諸方 宣風散 治初生小兒臍風撮口多啼不乳口出白沫 全蠍 二十一箇頭尾全者去 麝香 一字

右同和為細末用半字金銀煎湯調下

辰砂殭蠶散 治小兒臍風撮口 辰砂 白殭蠶 直者去絲 蛇蛻皮 一錢 麝香 半分

右為細末少許用蜜調傳唇口

治撮口 張氏方治小兒斷臍為風溼所乘或尿在抱裙之內遂成臍風面赤喘急啼聲不出名曰撮口並皆治

之 赤脚金頭蜈蚣 一枚 蝎稍 四尾 殭蠶 七箇 麝香 半分

右為末先將鵝毛管吹藥入鼻內使嚏噴啼哭為可醫後用薄荷湯調服之

定命散 陳氏方治因剪臍傷於風溼致令唇青撮口 赤脚蜈蚣 酒炙 半條 川烏頭 生 一箇 麝香 少許

右為末和勻每服半字金錢薄荷湯調下

治撮口 楊氏方 用白殭蠶為末蜜調塗口唇內即瘥 白殭蠶要自死者

治撮口 聖惠方 用牛黃一錢研竹瀝一合調勻滴入口中

一方 取活蝎尾一箇 江南名壁虎 裝內硃砂細末不拘多少亦入瓶內封口食砂月餘取出其身赤色陰乾為細

末每服一二分酒下大效

一方 用川山甲尾上甲三片羊油炙黃色蝎稍七箇共為極細末用人乳汁調塗乳上令兒吮之用厚衣

裹須臾小兒冷汗出愈

一方 小兒落胎之時視其臍軟者無臍風即不須治臍硬直者定有臍風速用簪尖於臍根傍刺破一二處

入麝香末少許矣三炷後無臍風

又方 同前 珍珠 四十九粒研極細 白礬 飛過 蛤粉 黃丹 血竭 各五分 棗貓兒 飛盡青灰色棗子大頭上有兩角

右六味為細末凡人家新生小兒綿裹臍帶離肚五六寸處先用軟線繒住却於線外將臍咬斷片時去線

待血流盡用鵝翎管送藥一二分入臍大孔內 近肚處臍有三孔一孔大 以手指輕輕揉散艾炙臍頭三炷結作臍搭軟帛

腰裹切不可常時揭看待臍落去自無風矣此方萬不失一又云臍硬直者宜用此法臍軟者不必用此法

一方 兒初生七日若有臍風必須發出青筋一道行至肚却生兩岔待行至心不治必死知者常視其青筋

初發速照青筋頭上灸三炷或行至生兩岔處亦照兩岔頭上截灸六炷青筋自消兒必活矣

一方 小兒初生七日急患臍風撮口百無一活父母坐視其死而無救良可憫哉一秘法極有神驗世罕知

之凡兒患此者齒齬之上有小泡子如粟米狀急以溫水蘸青熟綿裹手指輕輕擦破即開口便安不用服

藥 ○鵝口瘡 新增

附諸方

保命散 治小兒鵝口 白礬 一錢 馬牙硝 五錢 朱砂 一錢 右為細末每用一字取白鷄糞以水攪取汁調塗

舌上額頰內未用藥時先以手指纏亂頭髮揩舌上拭舌上垢然後用藥傳之

一捻金散 治小兒鵝口口瘡

雄黃三錢 鵝砂一錢 龍腦少許 甘草五分

右為末乾摻患處或用蜜調搽

一方 小兒白屑滿舌狀如鵝口 葛氏方

用髮纏指頭蘸井花水拭口上如下脫膿煮粟米汁以綿纏筋頭拭之却用煨過黃丹摻之

一方 小兒初生舌下有膜如石榴子合於舌根令兒言語不發

可摘斷之微有血無害如不止燒髮灰摻之 葛氏方

瀉心湯 錢氏方 治小兒口瘡

用黃蓮去蘆為末蜜水調服 洗心散尤妙 方見犬類

硃礬散 和劑方 治口瘡鵝口不能乳者

用硃砂細研白礬等分為末使亂髮纏指梢舌上令淨以藥敷之

一方 治小兒口瘡

枯過白礬一兩 黃丹一錢半 乳香

右件煉蜜為丸如兒子大臨卧嚙化小兒用筋頭點

一方 治小兒心有客熱滿口生瘡 楊氏方

用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱萸末末醋調塗亦可

又方 用巴豆一粒去殼搗爛黃丹少許和捏餅外用紙覆貼眉心立止

真黃散 治小兒走馬疳

雞腔腫黃皮不拘多少油燈上燒存性研細末入黃柏枯礬麝香一字用米泔水攪口內貼

立効散 同前青黛 黃柏末 白礬煨 五倍子末 各一 右為細末用米泔水攪口內貼



牙疳散 珍珠七 銅青分一 白礬錢三 千里沉石灰錢半 右為細末用米泔水攪口貼

一方 治小兒牙疳 用白礬裝於五倍子內合燒過為末貼之 ○重舌木舌新增

附諸方

青液散 治嬰孩小兒鵝口重舌及口瘡 青黛一錢 龍腦一字 朴硝一錢 右為細末用蜜調鵝翎少許傳

一方 治小兒舌下生舌名曰重舌 楊氏方 用針刺去惡血即愈

治小兒重舌千金方 用竹瀝清黃蘗無時點舌上亦有用真蒲黃塗亦可

一方 治小兒舌腫塞口欲滿者 用紫雪一分竹瀝半合細研和勻頻置口中以盡為度

○胎驚夜啼新增

附諸方

一方 治小兒在胎中受驚故生未滿月而發驚湯氏方

用朱砂研細同牛黃少許取豬乳汁調稀抹入口中入麝香當門子尤妙

治胎癰驚風湯氏方

用全蝎頭尾全者以生薄荷葉裹之以綿扎定火上炙燥研為末入麝香朱砂少許麥門冬湯下

真珠散湯氏方 治小兒客忤驚風痰熱心煩恍惚睡卧驚跳時或咬牙啼叫不已小便赤澀或吐黃沫

真珠末 海螵蛸 滑石錢各一 茯苓 人參 白附子錢各二 甘草 全蝎錢各半 朱砂錢一 腦子 麝香錢各半

右為末每服半錢燈心麥門冬煎湯入蜜少許調下入金銀箔五片

金箔鎮心丹 治嬰孩小兒鎮心解熱退驚安神除煩躁止啼

金蝎七箇用薄荷包 天麻煨 防風去蘆 羌活去蘆 牛黃 赤茯苓去皮 犀角 甘草錢各一 射香 辰砂水飛

治小兒夜啼 用蟬蛻二七枚全者翅足為末入硃砂一字蜜調為丸使吮之



燈花散 三因方 治邪熱在心內燒夜啼 用燈花 三兩 研為末燈心煎湯調抹口中以乳汁送下日三服

龍齒散 潛齋方 治小兒夜啼不住 蟬蛻 去翅足洗泥土 鈞藤 有鈞者 龍齒 去皮 茯苓 去皮 人參 各等分

右為末每服一錢水半鍾煎服

乳頭散 湯氏方 治夜啼不止腹中疼痛 黃芪 當歸 甘草 炙 赤芍藥 木香 各等分

右為末每挑少許着乳頭上使吮乳就服之 ○變蒸發熱新増

附諸方

惺惺散 湯氏方 治小兒變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞聲重相似傷寒者此藥宜服

人參 去蘆半兩 白茯苓 甘草 白朮 白芍藥 天花粉 桔梗 去蘆各半兩 細辛 二錢半去葉只用根

右為末每服二錢水半盞薑三片薄荷一葉煎服

神仙黑散之 陳氏方 治小兒變蒸與傷寒相似者當詳其症若上唇中心有白點子者為變蒸宜服此藥

麻黃 大黃 杏仁 和皮各一錢 右燒灰存性為末每服一字水半盞煎服抱男於溫暖處連進之有微汗

身涼即瘥

生犀散 骨蒸肌熱瘦悴煩赤口乾日脫潮熱夜有盜汗心煩熱

生犀 剉末一錢 地骨皮 赤芍藥 柴胡 乾葛 各一兩 甘草 炙二兩

右每服三錢水一鍾煎半鍾食遠溫服 ○丹毒蘊熱新増

附諸方

四順青涼飲子 和劑方 治一切丹毒積熱壅滯咽喉腫閉 方見火門

牛黃散 和劑方 治五種丹毒 鬱金 桔梗 去蘆 天花粉 甘草 葛粉 各等分

右為末每服一錢薄荷湯入蜜調下

白玉散 錢氏方 治赤遊丹腫 白芷 兩 寒水石 兩 右為末米醋調傅患處或腫至外腎有破處只用水調



生料四物湯湯氏方治血熱生瘡遍身腫痒 生乾地黄 赤芍藥 川芎 當歸去蘆此本方防黃芩減

右咬咀每服三錢水一盞煎服

防已散湯氏方治小兒伏熱毒之氣通身赤腫入腹入腎切防其殺人

漢防已兩半朴硝 犀角 黃芩 黃耆 川升麻各二錢半 右咬咀每服三錢水一鍾加竹葉同煎半鍾溫服

漏蘆散湯氏方治五腫丹毒并諸瘡癰

漏蘆 麻黃去根節 連翹 川升麻 川芒硝 黃芩各二錢 白欬七錢半 甘草二錢半 川大黃兩

右咬咀每服二錢水一盞煎服不拘時

一方 治丹毒發作恐其入腹一時無藥 急以針於紅點處刺出惡血使毒於此而散

一方 治走馬火丹 用景天一名慎火草一名仙指甲不拘多少搗爛取汁塗之即効

土黃散 治赤流丹毒 先用小針刀子刺去流頭赤暈惡血毒汁次用 土硝 一兩 大黃 末一兩

右二件相合新汲水調拌勻用雞翎蘸藥時時塗掃

伏龍肝散經驗方治赤腫丹毒大毒走注 伏龍肝不拘多少用雞子清調敷赤腫處大効

升麻飲經驗方治小兒一切丹毒遍身壯熱煩渴 升麻 黃芩 大黃各一錢 麥門冬去心 葛根 朴硝

右為末和勻熟水調下半錢或咬咀作一服白水煎服

五福化毒丹和劑方治小兒蘊積熱毒驚惕狂躁煩亦咽乾口舌生瘡夜卧不寧譫語煩渴頭面身體多生瘡

癖 玄參水洗 桔梗各二錢 白茯苓二錢 人參去蘆 牙硝各一錢 甘草炙 麝香二錢 青黛一錢

右為末煉蜜丸如雞頭大金銀箔為衣薄荷湯化下一丸

消毒犀角飲和劑方治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核腫癰毒聚遍身風疹瘡

毒赤癰及瘡癰已出未出不能快透並皆治療小兒疹痘欲出已出熱尚未解急進此藥三四服快透消毒

應手神効 鼠粘子四錢 荆芥 甘草各一錢 防風去蘆 一方加黃芩一錢 犀角錢五分 如無以升麻代之

右用水一鍾煎至半鍾服

牛黃丸 聖惠方 治小兒心經積熱兩頰紅如塗胭脂手足常熱口乾燥

○上焦熱壅 牛黃錢一 天竺黃錢二 鬱金錢三 大梔子錢四

右除牛黃天竺黃二味另研外再同四味研極

細煉蜜為丸一周兒黃米大服三十丸乳下三歲兒菜豆大服三十丸薄荷湯下

導小赤散 錢氏方 治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩躁悶亂傳流下部小便赤澀淋閉臍下滿痛

生地黃 木通 甘草 各一 一方加黃芩錢二 右用水一鍾竹葉十片煎至半鍾溫服

大連翹飲 活幼方 治小兒心經邪熱心與小腸受感乃水竇之處常宜通利壅則結滑則脫熱則澀感則淋平

涼心火三焦自順不待疾作而解證成而療者疎急有之矣一十五味加湯使用纔覺溫熱客熱寒邪風邪

冒入肺經心將受之心不受觸傳于小腸或閉或澀或赤或白淋瀝不通榮衛不順壅之作疾其發多端以

至膈熱眼目腫赤唇口白瘡津液不生涕唾稠或須在表裏俱得其宜驚風悉能散之痰熱亦自消除連翹

之功可謂大矣 連翹 瞿麥穗 滑石 車前子 牛蒡子 赤芍藥 各八 山梔子 木通 川當歸

防風 各四 黃芩 二分 柴胡 甘草 各一 錢 荆芥穗 二分 蟬退 錢半

右用水一鍾半竹葉十片燈心十莖煎至一鍾無時服

天一丸 韓飛霞方 治小兒百病 燈心 用十斤以米粉漿洗晒乾研末入水澄之浮者為茯苓 去皮兼用茯

滑石 水飛過 猪苓 去皮 澤瀉 去鬚 人參 一斤去蘆切片煮濃湯去渣澆

一方人參 六兩 白朮 六兩 甘草 四兩 同熬膏亦妙

右燈心等五味各足分兩為細末以人參膏和成丸如圓眼大硃砂為衣貼金箔任病換引大段小兒生理

本天一生水之妙凡治病以水道通利為捷徑也

○廣按小兒陰不能配陽血不能配氣故凡疾作皆屬火韓先生定此方清心而利小便正所以散火也凡

小兒龜熱丹毒驚風痰熱變蒸發熱之證用此最當而吐瀉痢諸症無不治也

人參生犀散 解時氣寒癰咳嗽痰喘心忪驚悸臟腑或秘或瀉及一切風熱

藥胡錢七杏仁去皮尖桔梗錢各二人參錢三甘草錢二

右每服三錢水一鍾煎半鍾食後溫服

天竺黃散 涼膈退潮熱 天竺黃錢六大黃 蟬蛻各三白殭蠶分二川羌活 全蝎去毒甘草各五

右為細末每服一錢麥門冬煎湯調下

辰砂湯 退虛熱和胃進飲食去心驚邪熱 白芍藥 人參 甘草

錢各一錢 茯苓一錢 硃砂五分 石蓮肉錢五

右為末次入硃砂研勻每服五分薄荷湯調服

甘露飲 解五毒治煩熱 寒水石 石膏各一兩甘草半兩

右為末如諸解毒氣用生薑自然汁調服傷寒時氣作熱發狂新汲水滴薑汁調服

瀉青丸錢氏方 治小兒肝經風熱目赤腫痛

當歸 龍膽草 川芎 山梔子 大黃酒紙羌活 防風各二錢半

右為末煉蜜如雞頭大竹葉砂糖湯化下一丸

三黃丸全嬰方 治小兒諸熱兼治身黃黃疸衄血便血 黃連去鬚黃芩 大黃各一錢半

右為末滴水為丸茶清下三五十丸

地膚子湯千金方 治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通欲便則澀痛不出出少瘀血須臾復出

地膚子 瞿麥 知母 黃芩 枳實 升麻 葵子 猪苓各六分海藻 橘皮 通草各三分大黃八錢

右用水一盞煎至半盞去渣溫服

石葦散活幼方 治小兒熱淋沙淋石淋 石葦 海金沙 木通 滑石各一錢

右用水一盞煎至半盞去滓不拘時溫服

八正散 治小兒心經蘊熱臟腑秘結小便淋澀方見火類

梔子仁散湯氏方 治小便不通心神煩熱 梔子仁五枚茅根 冬葵花各半甘草錢半 右為末每服二錢煎服



勻氣散 御藥院方 治小兒脾肺氣逆喘嗽面浮胸膈痞悶小便不利

桑白皮 二兩 陳皮 去白 一兩 桔梗 炒 一兩 甘草 炙 一兩 藿香 葉 兩 木通 兩 赤茯苓 去皮 兩

右吹咀每服三錢水一盞薑一片煎半盞溫服

○中惡天吊 新增

附諸方

蘇合香丸 和劑方 治小兒卒中惡毒心腹刺痛 方見氣滯

辟邪膏 楊氏方 治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死凡腹大而滿診其脈緊細而微者緊大而浮則死急服

蘇合香丸再以皂角末搗鼻次服沉香降氣湯加人參茯苓不愈進以辟邪膏無不効者客忤亦可服

降真香 白膠香 沉香 虎頭骨 鬼白 龍膽草 人參 茯苓 各半

右為末入雄黃半兩麝香一錢煉蜜為丸乳香湯化下及令兒帶燒卧內尤妙

沈香降氣湯 方見氣滯

九龍控涎散 楊氏方 治小兒溫熱痰塞經絡頭目仰視名為天吊

滴乳香 一錢 別研 天竺黃 半錢 雄黃 二錢 臘茶 二錢 白礬 一錢 甘草 二錢 荊芥穗 一錢 萊豆 一百粒 半

赤脚蜈蚣 一條 酒 浸 右為末每服半錢至一錢煎人參薄荷湯下

釣藤散 湯氏方 治小兒天吊潮熱 釣藤 人參 蘆犀角 屑 各半 全蝎 二錢 甘草 一錢 一分 天麻 二錢

右為末每服一錢煎至半盞溫服

牛黃膏 治小兒風癇迷悶抽搐逆朝

牛膽南星 依前製 全蝎 炒 去毒 蟬蛻 去足 各 蠶蠶 去絲 白附子 防風 天麻 煨 各一錢 半

右為細末蒸棗去皮核取肉研為丸如小豆大用荊芥生薑同煎湯研化食後遠服

斷癇丹 楊氏方 治癇即愈而復作者

黃耆 蜜塗 灸 釣藤 鈎子 細辛 去苗 甘草 炙 各 兩 兩 蛇 退 酒 炙 蟬 殼 去 土 牛 黃 別 研

足本丹溪心法附餘

卷二十一 小兒門

八 龍江海左書局印行

右為末棗肉為丸如麻子大煎人參湯下一歲十凡大小加減用

細辛大黃湯湯氏方治風癰熱癰 細辛去苗大黃泡防風去蘆各甘草錢半

右咬咀每服二錢水半盞加犀角屑少許煎服

竹瀝膏湯氏方治小兒諸癰

白朮蜜炒二錢半大附子去皮犀角一錢厚朴甘草水煮焙全蝎上箇每一箇用大葉薄荷藥湯

右為末取竹瀝為膏丸黑豆大每服用金錢薄荷湯化下一丸隨兒大小加減

至寶丹錢氏方治諸癰急驚卒中客忤並宜服之

安息香一兩半為末無灰酒飛過濾去沙石琥珀研硃砂研雄黃各一兩銀箔五十片龍腦麝香各二錢半

牛黃半兩生烏犀角生玳瑁屑各一金箔五十片

右生犀玳瑁搗羅為細末入餘藥令勻將安息香膏以重湯煮凝成搜和為劑如乾即入少熟蜜丸如梧桐

子大二歲服二丸人參湯化下大小量意加減

一方醫方集成治小兒癰癰及婦人心風諸疾 用甘遂末一錢猪心一箇取三管頭血三條和甘遂末將猪

心批作兩片以藥入在內用綿縛定以皮紙包裹水溼入文武火內煨熟不可過度除紙以藥細研辰砂末

一錢和勻分作四丸每服一丸猪心煎湯化下再服別取猪心煎湯此方神効

龍腦地黃膏宣明方治小兒急慢驚風痰涎上潮心胸天吊驚纏喉風小兒胸膈不利一切熱毒大有神効如

病不愈與分肢散一二服吐利得快常服此藥

川大黃別搗甘草各半兩雄黃水蜜者一錢麝香別研生腦子

右五味各製了再入乳鉢內研細煉蜜為膏油單裹如有前病煎薄荷湯下旋凡如兒子大化下如小兒大

人睡驚及心神恍惚煎金銀湯下一丸常服新汲水下大解暑毒如孕婦人常服永生男女永無疾病如有

大人陽毒傷寒加輕粉二厘龍腦少許水化下一丸杏核大小兒看年紀大小加減服立効