

未1

643

(3)

外科真詮
上



代指

代指生於手指甲身內由經脈血熱凝結而成初起腫痛用醋搗烏梅內敷卽消或用醋搗茶菇末敷亦可若內膿已透者可用針刺之擠去黃白膿漿用膏蓋之避風水數日自愈

蜣螂蛀

蜣螂蛀生於手指骨節由濕痰寒氣凝帶而成體虛之人多患之初起不紅不熱不痛漸次腫堅形如蟬肚屈伸艱難日久方知木痛初腫時宜先服六君子湯益氣除濕化痰外以醋磨南星塗之徐用益氣養營湯調理或可消散若失於調治腫處漸

漸腐爛膿如清水淋瀝不已腫仍不消多成瘡癩不治

六君子湯

黨參 白朮 茯苓 廣皮 半夏 甘草

煨姜 棗子

益氣養營湯 見上瘰癧

癰瘡

癰瘡生於指掌之中形如茱萸兩手相對而生亦有成攢者起黃白膿皰痒痛無時破流黃汁由風濕客於膚奏而成宜用菴

蘆膏擦之

藜蘆膏

藜蘆 一兩
芒參 一兩

用猪油八兩將二味煎枯去渣入松香一兩溶化離火
再加枯礬末一兩雄黃末一兩攪勻候冷塗之

鵞掌風 掌心風

鵞掌風生於掌心中生楊梅瘡餘毒未盡又兼血燥復受風毒
凝滯而成初起紫色斑點疊起白皮堅硬且厚干古燥裂延及



偏手外用楓樹子煎濃汁洗之內服搜風解毒湯加生地二錢
若年久成癰者難愈又有不因楊梅毒無故掌心燥痒起皮甚
則枯裂微痛者名掌心風由脾胃有熱血燥生風不能榮養皮
膚而成宜用祛風地黃丸治之即愈

搜風解毒湯

即上結毒方

祛風地黃丸

生地

四兩

熟地

四兩

白七厘

三兩

川芎

三兩

知母

二兩

黃柏

二兩

枸杞

二兩

羌活

二兩

獨活

一兩

研末蜜丸每服三錢酒送下夏月鹽湯下



腋疽

腋疽一名米疽生於肘腋窩正中初起之時其形如核漸次腫大堅硬皮色如常按之疼痛由肝脾二經氣滯血凝而成宜內用胡巴三錢木瓜一錢酒煎服二三劑外用蜜調石決三奈末敷即可消散若日久內膿已成者宜內服托裏散使其速潰爲貴若初起紅腫焮痛寒熱往來者宜內服加減活命飲外用烏龍膏敷日後仍宜托裏收功

肋疽

肋疽生於肋条骨間初如梅李漸大如盃色紫嫩痛連及肩
患左痛牽右肋患右痛牽左肋由肝經火毒鬱怒結聚而成
內服柴胡清肝湯外敷烏龍膏若內膿已成者宜用托裏散
之潰後外用浮海散蓋膏

柴胡清肝湯

見上天論

淵疽

淵疽生於腋下三寸肋骨上初起堅硬腫而不紅按之則痛由

憂患太過肝胆兩傷而成可照助疽治法但此毒日久方貴
稠白膿者順如豆漿水者險瘡口有聲似乎兒啼此屬內膿透
也即於陽陵泉穴灸之其聲即止內服護膜散陽陵泉穴在膝
臍骨外廉下一寸陷中蹲坐取之即得 凡助胸脇腰腹空軟
之毒當將潰未潰之際多服護膜散可免透膜之患

護膜散

白蜡 白芨

等分研末每服二三錢黃酒調服米湯亦可

內發丹毒

內發丹毒生於肋骨延及腰膀色赤如霞遊走如雲痛如火燎
由肝脾二經熱極生風所致初起急向赤腫週圍疔出紫黑以
瘦牛肉片貼之羊肉片亦可如無牛羊肉片即用鴨蛋清調青
黛冰片末刷內服防風升麻湯投方應病者順若嘔噦昏憤胸
腹脹脹遍身青紫者則爲毒氣內攻屬逆

防風升麻湯

卽上丹毒方

脇瘡

脇瘡生於肋骨下軟肉處初如梅李漸長如盃如盂由肝膽熱火凝結而成多生於體虛之人初起內服逍遙散去白朮加銀花二錢半珠一片二三服徐用加味四妙湯治之不可輕投攻擊之劑倘攻擊成膿腫如鼓脹破出敗漿腥臭者屬逆

逍遙散

見上 螻蛄串

加味四妙湯

見上

上中下發背

上中下發背俱屬督脉經上發背生天柱骨下其形橫廣如肚

中發背生於背心一名對心發其形中濶兩頭有尖下發背生
於腰中一名對臍發其形平漫如龜初起皆形如粟米焮痛麻
痒周身拘急寒熱往來因循數日突然大腫總由陰虛火盛或
醇酒厚味或鬱怒房勞或丹石熱毒所致宜按陰陽虛實治之
陽毒初起外用洪寶膏刷內服加減消毒散潰後外用烏雲散
蓋膏腐重者點白降些微於上仍用烏雲散蓋之內服托裡散
收功陰症初起外用玉龍膏刷內服陽和湯潰後外用浮海散
蓋膏內服托裏散收功蓋此三症無論老少總以高腫紅活焮
痛者爲順漫腫塌陷焦枯紫黑者爲逆

上搭手

上搭手生於兩肩骨之動處屬太陽膀胱經肺俞穴生在左者屬肝生在右者屬肺可叅發背治法

中搭手

中搭手生於脊骨第四節傍開三寸屬太陽膀胱經脊盲穴宜照發背治法



下搭手

下搭手生於腰窩傍開三寸屬膀胱經盲門穴由房勞過度有傷腎水水竭不能制火以致營衛不和逆於肉裏而生也可照發背治法若初起腰痛如折不能俯仰者險色紫塌陷腐爛孔深透膜者逆

蓮子發 蜂窩發

蓮子發生於脊背及兩脇瘡頭數多瘡口各含黃膿如蓮子樣蜂窩發生肩後及脊傍形似蜂房俱可照發背治法

陰陽二氣疽

陰陽二氣疽生於脊背之傍乍腫乍消時軟時硬由七情火毒
營衛不和而生也初發令人寒熱往來若大渴神清高腫脉洪
二七濃成潰破者順若不渴神昏漫腫脉細應時無膿飲食不
思者逆初起宜內服加減活命散飲外敷烏龍膏潰後內服五
裡散外用浮海散蓋膏

串疽



中疽生於背脇之間初發一處徐後挨次發出二三處形雖不同而色仍同潰後多相串通故又名鼠鑽瘡因積憤鬱火而成初宜服逍遙散去白朮加銀花甲珠服二三劑徐用托裏散治之潰後宜用浮海散蓋膏

連珠發

連珠發生於背不論左右連腫三五塊形若貫珠皮色淡紅發時少腹脹滿少水閉瀉陰囊作腫骨節疼痛初起宜內服加減活命飲加車前仁二錢外敷烏龍膏次服陽和湯或托裏散此

症多因酒色過度而來一切苦寒攻擊之藥不可輕投

酒毒發

酒毒發生於脊背皮色不變纍纍如彈如拳堅硬如石時麻時木痛徹五內二便瀉滯週身拘急數日後頭面手足虛腫泄瀉似痢總由過飲藥酒更兼厚味積毒所致初起宜內服連翹消毒飲徐用內托黃芪散治之外用烏龍膏刷潰後用浮海散

連翹消毒飲

連召

梔子

桔梗

赤芍

當歸

元參

射干

黃芩

紅花

葛根

元參

射干

黃芩

紅花

葛根



南京中醫藥大學圖書館版權所有

陳皮 六分 花粉 一錢 大黃 一錢 甘草 五分

內托黃耆散

黃耆 二錢 當歸 二錢 白芍 二錢 川芎 一錢 陳皮 六分
山甲 一片 皂刺 七分 檳榔 三分 玉桂 五分 甘草 三分

丹毒發

丹毒發生於背形如湯火所傷細痛無數赤暈延開發時其渴非常由素服丹石剛劑所致初宜內服黃連解毒飲徐用六味



南京中醫藥大學圖書館版權所有