

病機沙篆

卷上

增補病機沙篆目次

增補病機沙篆目次

震間李中梓士材父著述

原本

吳門尤乘生洲增較新鐫

上卷

中風類中

中寒

中暑中熱

中氣中食

虛勞

欬嗽吐血

傳尸瘵症

瘦喘

噎膈反胃

呃逆

嘔吐噦

脹滿

瘡

泄瀉

下卷

頭痛

心病

腰痛

瘦癯

霍亂

水腫

痢

厥逆

眩暈

腹痛

顛狂

怔忡驚悸恐

痿 不得食 健忘

遺精

痿痺

不得食

不得寐

自汗盜汗

肩背臂膊痛

諸病

脇痛

脚氣

遺精

赤白濁

赤白濁

前陰諸

消渴

赤白帶

疝

癰瘡

癰瘡

積聚痞

積聚痞癖

淋瘕

前陰諸疾

後陰諸疾

中

風

病機沙篆卷上

也

中風

雲間李中梓士材父著述

吳門尤 乘生洲父增補

風之為言中也肥人氣居於表、中氣必虛、土不生金、金氣漸薄、肝無所畏、風木乃淫、復來乘土、中氣益敗、乘其中虛、外邪襲之、則真為中、西北方風高往、有之、若但因中虛、不犯外邪、則為類中、東南方柔弱往、有之、

內經曰風者百病之長、又曰風者善行而數變、故客於脈、

數

從

則為厲風客於藏府之俞則為偏風風氣循風府而上則
為腦風自腦戶而合於太陽則為目風飲酒見風汗出則
為漏風入房汗出當風則為內風入於腸胃則為腸風外
客腠理則為泄風

正風邪風各不相同經云正風者從一方來即合時之正
者也其中人也淺合而自去邪風者從後來者也謂虛
邪賊風其中人也深不能自去

經曰暴病卒死皆屬於火東垣以卒然昏仆責之氣虛蓋
火即氣即火同物而異名者也當卒仆之時以竹瀝姜

汁灌蘇合香丸或三生飲加人參竹瀝姜汁灌之如扶口
不開進且緩以細辛皂角為末吹鼻取嚏即甦無嚏者藥
不治

痲涎壅盛者宜與吐之用牙皂四枚明礬一兩各為細末
和勻輕者五分重者三字溫水調灌此名稀涎散服之不
大嘔吐但微微令涎自口角流出即醒或橘紅一斤煎湯
數碗多灌取吐口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿腎
絕聲如鼾者肺絕此虛極而陽脫也五症不全見者速以
大劑參耑耑木附并急灸臍下關元氣海可救十中之一

髮直吐沫搖頭上攔面赤如粧汗出如珠皆死症矣

經曰虛邪偏客於身半其

~~入~~

深營衛稍衰則真氣去邪氣

獨留發為偏枯又曰身不

^偏

用為痛言不變志不亂

者

分腠之間蓋其不足損其有餘乃可復也即中府症名曰

痺之為病也身無痛處但四肢不收志亂不甚其言微知

可治甚則不能言不可治也即中藏症外有六經形症則

以小續命湯加減及疎風湯治之小續命亦麻黃桂枝之

變麻桂二湯施於溫熱之症必致殺人不可

~~用~~

執也後列

太陽經魚汗惡寒者麻黃方風杏仁甘草有汗惡風者桂

枝防風芍藥甘草湯以經魚汗身熱不惡寒者白芷石膏
知母甘草有汗身熱不惡風者葛根桂枝芍藥甘草如在
太陰經則魚汗身涼乾姜附子麻黃防風少陰經則有汗
無熱桂枝附子甘草麻黃杏仁防風若無此四經之症或
在少陽厥陰此以防風羌活甘草連翹如上症真中者分
表裏施治而在裏者則便溺阻隔宜三化湯枳實厚朴羌
活大黃若表裏俱見者先與解表而後攻裏若外邪已解
內邪已除而誤言蹇澀半身不遂未能即愈以六君子湯
加羌活歸地芍藥秦艽久服之營衛自和即古所謂六
太

官

行中

藥是也再加麻黃卽一旬之微汗加大黃卽一旬之微利
如望春大寒之後加平夏人柴枳木迎而奪陽之陽
氣也如望夏穀雨之後加石膏知母黃芩迎而奪陽明之
氣也如季夏溫土主令加防風已白朮菝葜勝脾土之濕也
如望秋大暑之後加厚朴霍香官桂迎而奪太陰之氣也
望冬霜降之後加桂附者勝少陰之寒也
治風之法不過解表攻裏行中道三法盡矣然川氣不齊
稟賦各別七情異起六氣殊傷活法處治不可膠執也

關奪門之將原為中藏之閉症設也牛蒡入肝治肉身
入腎治骨水片入肝治筋此惟邪氣深入者乃為出矣若
施之於中府氣虛脫絕之症反掌殺人如人既入井而又
下石安得不立斃乎

類中之症其卒倒偏枯語言蹇澀痰涎壅盛皆與真中風
相類故曰類中但無六經形症為異耳此惟中氣虛備故
虛風內煽所致東垣主虛誠為合論河間主火丹溪主痰
其言各殊而不知惟其虛也故無根之火發焉惟其虛也
故逆上之痰生焉東垣舉其本河間丹溪道其標似異而東

實同也。心火涼膈散、肝火小柴胡湯、水虛火灸、六味地黃湯、類中之卒倒偏枯症類，雖有多種，總由真氣不周、充血液因而逆涵也。參耆君之，地佐之，更以秦艽、茯神、竹瀝、人乳、姜汁、梨汁，最為穩當。

凡治中風，須分陰陽。陰中者，其色青或黑，或白，痰喘昏迷，眩冒多汗，甚者手足厥冷。陽者，中面赤唇焦，牙齒緊急，上視強直，掉眩煩渴。

凡人大指次指麻木不仁，三年之內，必患中風，須預防之。宜慎起居，節飲食，遠房帷，調性情，更以十全大補湯加羌

活久之服之經歲不輟則潛移默奪弭災却疾矣若用古
法天麻丸愈風丹開其玄府漏其真液適足以招風取中
耳預防云乎哉

口禁不開足陽明頷頰之脉偏急則口禁不能開肝風乘
胃故也皂角乳末芡薯防風並湯薰之須大湯液如蒸如
霧乃得力耳再以南星冰片為細末擦其牙根或藜蘆鬱
金為末搐鼻或以礬一兩飛鹽五斤研勻擦牙又可將不
許綿裹安牙盡處又法甘草五寸截作五段麻油浸透火
灸扶口令咬之約行十里許又換一截從此灌藥為便

口眼喎邪耳鼻常靜故風息焉口鼻目常動故風生焉風
搖則血液衰耗無以榮筋故筋脈拘急口目為僻腎急不能
牽視人多黃耆當歸白芍升麻秦艽葛根防風釣藤紅白
桂木水煎和酒服外用桂枝三兩酒煎濃汁以故布浸之
乘熱左歪右搦右歪搦左再以乳香、兩皂角、兩挫拌
勻燒烟薰之

語言蹇澀強曰足太陰之脈貫舌本散舌下病則舌強又
足少陰之正直者係舌本又曰內奪而厥則為瘖痺又腎
脈之氣不上循喉嚨挾舌本則不能言用地黃飲子地黃

巴戟從蓉茱萸同桂枝附子落荷麥冬五味茯苓當歸遠
志石斛脾土不足腹泄壅盛言蹇澀者六君子湯加南星
木香乾葛枳實遠志竹茹挾熱者山楂連翹芍藥粉落荷
四肢不舉其脈緩大有力者土太過也平胃五苓散主之
其脈細小無力者土不及也補中益氣湯主之隨症加減
身體疼痛挾溫熱者當歸拈痛湯羌活加葛知母羌活
茵陳及苦參人考二朮當歸并湯各拈病有奇動挾寒者鐵彈
丸乳沒各一兩烏頭泡去皮靈脂酒淘淨加射薄荷宜挾
虛者十全大補湯加秦艽身重氣虛也補中八味治之周

身盡痛者蠲痺湯歸芍薑黃與羌活甘草黃耆薑朮煎。

身重之症時師止知燥濕而不知補虛按素問示從容論篇歷言肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩冤是以身重乃虛症也不止於濕可盡耳

痰涎壅塞星香二陳為主蓋治痰以順氣為先挾虛者加參耆竹瀝挾寒者桂附薑汁養正丹鎮安元氣下墜痰涎實者星香湯送下虛者六君子湯送下

遺尿不禁脾虛下陷者補中益氣湯加益智腎虛不能收攝

善飢多食風木太過凌虛中州脾土受攻求助於食法當
瀉肝安脾則復其常矣青皮芍藥柴胡山枝人參白术甘
草茯苓更當隨時審症而為之變通也

神氣昏冒疫逆衝上於心主被障故昏不知人此係中
藏而非中府閉症而非脫症宜牛黃丸清心肺等治之人
參麥冬茯神胆星山藥白术甘草羚羊角犀角雄黃硃砂
牛黃水射金箔大棗打膏加蜜為丸或至聖保命丹管仲
一兩生地七錢大黃五錢青黛板藍根各三錢朱砂雄黃
川鬱金薄荷各一錢五分珠珀^珍冰片各一錢五分射一錢煉