

證謨

癩狂痴欬 癰閉 秘結 詐病 癘風 諸蟲
諸毒 附蠱毒 諸氣 死生

全書 天



景岳全書卷三十四天集

雜證謨

會稽 張介賓 會卿等

會稽 魯 超 謙菴訂

癲狂痺瘖

經義

宣明五氣篇曰邪入於陽則狂邪入於陰則痺搏陽則癲疾搏

陰則爲瘖

生氣通天論曰陰不勝其陽則脉流薄疾并乃狂○陽不勝其



陰則五臟氣爭九竅不通

調經論曰血并於陰氣并於陽故爲驚狂

通天篇曰太陽之人多陽而少陰必謹調之無脫其陰而瀉其陽陽重脫者易狂陰陽皆脫者暴死不知人也

本神篇曰肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精○肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人

脉解篇曰太陽所謂甚則狂癲疾者陽盡在上而陰氣從下下虛上實故狂癲疾也○陽明所謂病至則欲乘高而歌棄衣而走者陰陽復爭而外并於陽故棄衣而走也



陽明脉解篇帝曰足陽明之脉病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上之處皆非其素所能也病反能者何也岐伯曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高也熱盛於身故棄衣欲走也陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食故妄走也

病能論帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰生於陽也陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥帝曰何以知之岐伯曰陽明者常動巨陽少陽不動不動而動大疾此其候也帝曰治之奈何曰奪其食即已夫食入於陰長氣於陽故奪其

食即已使之服以生鐵洛爲飲夫生鐵洛者下氣疾也

通評虛實論帝曰癰疾何如岐伯曰脉搏大滑久自已脉小

急死不治帝曰癰疾之脉虛實何如岐伯曰虛則可治實則

死

大奇論曰心脉滿大癰瘰筋攣○肝脉小急癰瘰筋攣○二陰

急爲癰厥

邪氣臟腑病形篇曰心脉緩甚爲狂笑微瀼爲癰疾○肺脉急

甚爲癰疾○腎脉急甚爲骨癰疾

奇病論帝曰人生而有病癰疾者病名曰何安所得之岐伯曰



病名爲胎病此得之在母腹中時其母有所大驚氣上而不
下精氣并居故令子發爲癲疾也

寒熱病篇曰暴攣癰眩足不任身取天柱

癲狂篇曰癲疾始生先不樂頭重痛視舉目赤甚作極已而煩

心候之於顏取手太陽陽明太陰血變而止○癲疾始作先

反僵因而脊痛候之足太陽陽明太陰手太陽血變而止○

癲疾始作而引口啼呼喘悸者候之手陽明太陽左强者攻

其右右强者攻其左血變而止○治癲疾者常與之居察其

所當取之處病至視之有過者瀉之置其血於瓠壺之中至



其發時血獨動矣不動灸窮骨二十壯窮骨者骹骨也○膏
癰疾者顙齒諸腠分肉皆滿而骨居汗出煩惋嘔多沃沫氣
下泄不治○筋癰疾者身倦攣急大刺項大經之大杼脉
多沃沫氣下泄者不治○脉癰疾者暴仆四肢之脉皆脹而
縱脉滿盡刺之出血不滿灸之挾項太陽灸帶脉於腰相去
三寸諸分肉本輪嘔多沃沫氣下泄者不治○癰疾者疾發
如狂者死不治○以上俱言癰疾

狂始生先自悲也喜忘苦怒善恐者得之憂饑治之取手太
陰陽明血變而止及取足太陰陽明○狂始生少臥不饑自

高賢也自辯智也自尊貴也善罵詈日夜不休治之取手陽
明太陽太陰舌下少陰視之盛者皆取之不盛釋之也○狂
言驚善笑好歌樂妄行不休者得之大恐治之取手陽明大
陽太陰○狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之所生也治之取
手太陽太陰陽明足太陰頭兩顙○狂者多食善見鬼神善
笑而不發於外者得之有所大害治之取足太陰太陽陽明
後取手太陰太陽陽明○狂而新發未應如此者先取曲泉
左右動脈及盛者見血有頃已不已以法取之灸骨骹二十
壯○以上俱言狂證



長刺節論曰病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂刺
之虛脉視分盡熱病已止病初發歲一發不治月一發不治
月四五發名曰癲病刺諸分諸脉其無寒者以鍼調之病已
止

二十難曰重陽者狂重陰者癲脫陽者見鬼脫陰者目盲

五十九難曰狂癲之病何以別之然狂疾之始發少臥而不饑

自高賢也自辯智也自倨貴也妄笑好歌樂妄行不休是也

○癲疾始發意不樂僵仆直視其脉三部俱盛是也

論證

共二條

癲狂之病、病本不同、狂病之來、狂妄以漸、而經久難已、癲病之
至、忽然僵仆、而時作時止、狂病常醒、多怒而暴、癲病常昏、多
倦而靜、由此觀之、則其陰陽寒熱、自有冰炭之異、故難經曰、
重陽者狂、重陰者癲、義可知也、後世諸家有謂癲狂之病、大
概是熱、此則未必然也、此其形氣脉氣、自亦有據、不可不辨、
察陰陽分而治之、

一癲卽癇也、觀內經所言癲證甚詳、而癇則無辨、卽此可知、後
世有癲癇風癇風癲等名、所指不一、則徒滋惑亂、不必然也、
又如別錄所載五癇曰、馬癇、牛癇、猪癇、羊癇、雞癇者、卽今人

之謂羊癲猪癲也。此不過因其聲之相似，遂立此名，可見癲
癇無二。而諸家於癲證之外，又有癇證，誠屬牽強無足憑也。
又千金方有風癇、驚癇、食癇及陰癇、陽癇之說，皆所當辨。
列後條。

論治 共五條

凡狂病多因於火，此或以謀爲失志，或以思慮鬱結，屈無所伸，
怒無所洩，以致肝胆氣逆，木火合邪，是誠東方實證也。此其
邪乘於心，則爲神魂不守；邪乘於胃，則爲梟橫剛強。故治此
者，當以治火爲先，而或燄或氣，察其甚而兼治之。○若止因

火邪而無脹閉熱結者、但當清火、宜抽薪飲、黃連解毒湯、三
補丸之類主之。○若水不制火、而兼心腎微虛者、宜硃砂
神丸、或服蠻煎、二陰煎主之。○若陽明火盛者、宜白虎湯、
泉散之類主之。○若心脾受熱、叫罵失常、而微兼閉結者、宜
清心湯、涼膈散、三黃丸、當歸龍薈丸之類主之。○若因火致
痰者、宜清膈飲、抱龍丸、生鐵落飲主之。甚者宜滾痰丸。○若
三焦邪實熱甚者、宜大承氣湯下之。○若痰飲壅閉、氣道不
通者、必須先用吐法、并當清其飲食、此治狂之要也。
一癲病多由痰氣、凡氣有所逆、痰有所滯、皆能壅閉經絡、格塞

心竅故發則旋暈僵仆口眼相引目睛上視手足搐搦腰脊
強直食頃乃甦此其倏病倏已者正由氣之倏逆倏順
治此者當察痰察氣因其甚者而先之至若火之有無
審其脈證而兼爲之治也○氣滯者宜排氣飲大和中飲四
磨飲或牛黃丸蘓合丸集成潤下丸之類主之○痰盛者宜
清膈飲六安煎二陳湯橘皮半夏湯或抱龍丸硃砂滾涎丸
之類主之○兼痰兼火者宜清膈飲硃砂安神丸丹溪潤下
丸之類主之○痰逆氣滯之甚者必用吐法吐後隨證調理
之



一癰癩證無火者多、若無火邪、不得妄用涼藥、恐傷脾氣、以致
變生他證、且復有陰盛陽衰、及氣血暴脫、而絕無痰火、氣逆
等病者、則凡四君四物八珍十全大補等湯、或乾薑桂附之
類、皆所必用、不得謂癰癩盡屬實邪、而概禁補劑也、若真陰
大損、氣不歸根、而時作時止、昏沉難愈者、必用紫河車丸、方
可奏效、○其有虛中挾實、微兼痰火不清、而病久不愈者、集
驗龍腦安神丸、最得其宜、隨證增減、可爲法也、

一痴鼓證、凡平素無痰、而或以鬱結、或以不遂、或以思慮、或以
疑貳、或以驚恐而漸致痴鼓、言辭顛倒、舉動不經、或多汗、或

善愁其證則千奇萬怪無所不至脉必或弦或數或大或小變易不常此其逆氣在心或肝胆二經氣有不清而然但察其形體強壯飲食不減別無虛脫等證則悉宜服蠻煎治之最穩最妙然此證有可愈者有不可愈者亦在乎胃氣元氣之強弱待時而復非可急也○凡此諸證若以大驚猝恐一時偶傷心胆而致失神昏亂者此當以速扶正氣爲主宜七福飲或大補元煎主之

一小兒無狂證惟病癲者常有之凡小兒之病有從胎氣而得者有從生後受驚而得者蓋小兒神氣尙弱驚則肝胆奪氣

而神不守舍、舍空則正氣不能主、而痰邪足以亂之、故凡治小兒之驚癇、必須先審正氣、然後察其病邪、酌宜治之、諸法俱載小兒門、所當詳究、

述古

共四條

千金方云小兒之癇有三、風癇、驚癇、食癇也。○風癇、緣衣煖汗出、風因入也、初時先屈指如數乃作。○驚癇、起於驚悸、大啼乃作。○食癇、其先不哺乳而變熱後發、或先寒後熱者、皆食癇也。○又云、病先身熱掣縱、驚啼叫喚而後發、癇脉浮者爲陽癇、病在六腑、外在肌肉、猶易治也。○病先身冷、不驚掣、不

啼呼而病發時脉沉者爲陰癰病在五臟內在骨髓難治也
陳無擇云夫癰癰病皆由驚動使臟氣不平鬱而生涎閉塞諸
經厥而乃成或在母胎中受驚或幼小感風寒暑濕或飲食
不節逆於臟氣而成蓋忤氣得之外驚恐得之內飲食屬不
內外三因不同忤氣則一

愚謂此二家之說雖若切當然風寒外感自有表證飲食內
傷是有裏證俱未必亂神若此而癰癰爲病則忽爾昏厥此
其病則專在心經以及肝胆二臟又非風寒飲食所能頓病
若此者且風癰之義本以木邪所屬爲言亦非外感之謂卽