

寅 9

8<2



新編分類藥物學講義 卷之二

太倉景芸芳編述

第六類 補氣助陽系

黃耆 附黃耆 耆

產地

出杭州綿上者佳。

形色

生于山地。莖臥地。成蔓狀。多羽狀複葉。有毛。夏日

開淡黃花。如蝶形。結實莢如赤小豆。根肥大。莖

叶皆可入藥。

性味

甘微溫。

選用

健脾用蜜炙。

補腎入崩帶鹽水炒。

生用治癰

疽。護衛氣用炭皮。亦治水腫。



本經又云能治五癰

癰疾

主治

本經主癰疽久敗排膿止痛治大風補虛

五癰

功用

生用固表托毒久用補中益氣溫三焦托裏排膿

壯一 生一粒大而脣痛

北一 多水葡萄狀

腸一 大便時有血水

脈一 生於臍腸便時

則脫

用量

二錢至五錢

血一 勞醉則發癰赤

處方

配生熟地黃柏黃芩黃連當歸酸棗仁治陰虛盜

而痛

癰疾

汗之正法配桂枝白芍防風炙甘草治表虛自汗配

白芷白芩甘草金銀花皂角刺排膿止痛配防已

防風茯苓猪苓治水腫

禁忌

本品極滯胸悶者忌之有表邪者勿用

按著名方劑有當歸補血湯玉屏風散黃芪健中湯

初起水泡作癰成瘡破流脂水或
出血久則成片延及遍身好浴熱
湯因氣血虛弱不能滋潤皮膚
所致若作風濕癢治必難奏效
用黃芪補氣是則
血亦足



經脈無閉塞之虞皮膚無乾枯之患佐以他藥自能全愈

便讀云得防風補而不津行而不泄其功與大同當歸則和營連衛

補氣中氣湯

此藥亦陳升以參桂

去而補血湯

當以黃耆

補中益氣湯皆以黃耆為君也其效已証諸實驗。張錫純研究黃耆鮮曰黃耆性溫味微甘能補氣。善治胸中大氣本經謂其主大風者以其與發表藥同用則能祛外風與羌活清血藥同用更能熄內風也。謂治癰疽久敗者以其補益之力能生肌肉其膿自排出也。表虛自汗亦可用以固表氣之虛小便不利而腫脹者與利水同用使衛氣和而水濕去矣。婦人氣虛下陷而崩帶者於四物湯中重加以固之。蓋血脫益氣故當歸補血重湯用之也。黃耆補氣之力最優確為補藥之長。故名之曰耆。

也。

(甲) 主治

(乙) 改徵

日本東原喜益氏之論黃耆。

主治肌表之水。故能治黃汗。盜汗。皮水。又旁治身
體重或不仁也。

(一) 耆芍桂枝苦酒湯。証曰。身腫發熱。汗出口渴。又

曰。汗沾衣色正黃。此黃耆藥汁。此方即此證。

(二) 防已黃耆湯。証曰。身重汗出惡風。此防本州

(三) 防已茯苓湯。証曰。肢腫水氣在皮膚中。此防桂本州

(四) 黃耆桂枝五物湯。証曰。身重不仁。此耆桂美本

(五) 桂枝加黃耆湯。証曰。身常羸。暮盜汗出。又曰從。此耆桂美本



(丙)互改

改

腰以上必汗出。下無汗。腰寬弛痛。如有物在皮膚中狀。

右歷觀諸方。黃耆主治肌表之水。故能治黃汗。皮水。又能治身體腫。或不仁。亦皆肌表之水也。

黃芪桂枝苦酒湯。桂枝加黃芪湯。同治黃汗。而耆

耆桂枝苦酒湯証。汗沾衣。是汗甚多也。桂枝加黃

耆湯証。腰以上必汗出。下無汗。是甚少也。汗牙之

多少。即用黃芪多少。則其功用的。然可知矣。

防己黃芪湯。防己赤苓湯。同治皮膚水腫。而黃耆

有多少。防己黃耆証曰。身重汗出。防己赤苓湯曰。



証曰。水氣在皮中。此隨水氣多少而黃芪亦有少。則黃芪治肌之^表水明矣。黃芪桂枝五物湯証曰。身重不仁。仲景之治不仁。雖隨其所在。處方不同。而歷觀其^用皆治水也。然則不仁是水病也。故少腹不仁。小便不利者。用^有八味丸^{加芪}以利小便。則不仁自除。此不仁亦固于水也。

附黃耆
莖

白朮

產地

又名山薑 附野於朮
山柝類產浙江於潛者佳。名於朮。

止渴消腫治筋掌瘰癧瘰癧。



衛氣不固。玄府空
疏。自汗淋漓。佐以參
芪。功能固表。
又濕熱症。濕熱而溫
則汗出。熱不退。自求功
能。吸收脾濕。加入辛劑。
苦降。兼中俾濕解熱。
除汗自止矣。

形態

莖。高二三尺。叶有毛。对生。花有紫碧紅數色。根
細如指。大者如拳。色微褐。肉白。

性味

甘溫而苦。

選用

肥大者優。條細者力薄。

是風寒乘虛

主治

本經主風寒濕痺。死肌。瘡。通止汗除熱。消食。

脾虛濕泄

功用

有吸收脾濕之功。有消痰利水之能。製熟則能和

中益氣。止渴生津。且為安胎之要藥。痰飲多吐白

沫者。此品不可一缺也。

用量

二錢至五錢。

處方

得參苓。與大補中氣。得枳橘。健運飲食。得桔。及



痰飲能化得澤澤車前等利水獨長

禁忌 腎虛者勿用

附野於朮

功後勝惟价昂近世罕見

素向長刺篇曰病大風
胃節重鬚眉之疾亦即
屬風也

按本經主風寒濕痺。凡肌痊疽者。正以風寒濕三氣
合而成痺。者拘攣而痛也。痊者風寒乘寒。客于
肝脾腎所致也。疽者脾胃虛而濕熱。痰滯也。以上
諸証莫不由風寒濕而成。白朮有此三者之功。故
能祛其所致之疾也。止汗除濕消食者。濕甚則
自汗。濕邪多則發黃。濕去則脾胃燥。則食自消
汗自止。熱自除矣。又主大風在身。威眩頭痛。消痰

腸風

時便血色鮮而清多附於裏
症由腸胃濕熱榮積

痔漏

即肛門生瘡若分五痔見毒瘡
病尿盛者多

脫肛

肛門似有物墜出正虛者
居多如久泄後往有之

方物卷二

中國醫藥學院

水逐皮膚間風水結腫除心下結滿及霍亂吐下
不止仲景有五苓散桂枝白朮猪苓茯苓澤瀉
治水濕內停脾不散津之湯瀉難此藉桂枝通陽
之力使濕化津行之意也蓋白朮為脾胃之君藥
脾旺則清氣升精微上濁氣化而糟粕輸矣保胎
集用白朮枳殼麩炒等分為末飯丸梧子大每日
服一粒功能束胎並可易產普濟方治腸風痔漏
脫肛積年不瘡者用土炒白朮末乾地黄少許飯
上蒸熟搗和為丸梧子大每日服數粒頗效集
簡方治骨痛用炒白朮山藥為末成丸參湯送下



生者清火解毒
炙者和中補脾
叶稍治茎中痛
叶節治癰疽疔毒

甘叶

產地

山叶類，產川陝等省。

形態

多年生叶，叶為奇數，如披針形而尖，互生，初及開
淡紅花，冠如蝶形，簇聚成穗，根梢節均可療疾。

性味

甘平

選用

大而結實者良。

炮製

生用 蜜炙

六效簡便方治溫濕暑濕用白朮車前子炒為末
白湯送下二三錢六頗效白朮之功用至廣而難
盡述以上數方以供一試。

圖考

附甘叶節

甘叶稍

五治

本經主五藏六腑寒並邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力愈瘡腫解表久服輕身延年。

功用

生用瀉火清並解毒。灸用溫補元氣。入于峻利則緩正氣。入于和利功能補益。入于汗利力能解肌。入于涼利用以逐火。入于潤利使之養血。故凡補中解毒和胃及外科等無不用之。以和生小兒用甘草鉤藤煎湯與飲。功能清並解毒。

用量

幾分至兩許。

處方

甘草相沿為百藥之長。無論何種藥品。如寒並溫涼汗吐下和均可与之配伍。



禁忌

中滿者忌之。嘔家酒家勿用。

按鄒澍曰。傷寒論金匱要畧兩書中凡方二百數十。

用甘者至百二十方。非甘之至病多。乃諸方。

必合甘。甘始能曲。曲當病情也。凡藥之散者。外而不內。麻黃桂枝青龍柴胡葛根等湯。攻者下而不上。

調胃承氣。枳仁承氣。大黃甘草等湯。溫者燥而不

濡。四逆。桑葉。蔓等湯。清者利而不和。白朮。竹葉。石

羔等湯。若無甘。甘調劑其間。遂其往而不返。以為

行險僥倖之計。不異于破斧沉舟。可勝而不可勝。

詎誠之道耶。

麻黃湯——桂枝杏枝

桂枝湯——桂芍甘姜苓

小青龍——姜桂麻芍甘細夏五味

小柴胡——夏參枳冬姜苓

葛根湯——即桂枝湯加葛麻黃

調胃承氣——硝黃枳

桃仁承氣——大黃蒲桃仁枳

大黃湯——大黃甘草

四逆湯——枳姜附

理中湯——枳參朮姜

白虎湯——石膏肥知母枳粳米

竹葉石膏——竹葉半夏石膏人參枳

粳米麥冬



南京中醫藥大學圖書館版權所有

炙甘草湯即湯脈湯

炙甘草 人參 生薑 桂枝 生地

蛤粉炒阿膠 炙冬 麻仁 大棗

緩而時止為結三而有力者為積聚

無力者為正氣衰弱

二〇六

藥物學 二

又甘草之用生用炙確有不同。乃兩書百二十方。

傷寒論用生甘草者不及十分之一。金匱要畧用

炙甘草者。亦不及十分之一。甚有同一方在傷寒

論用炙。在金匱要畧則用生者。是知古書傳訛者

多矣。以本經別錄主治。大率除邪氣治金瘡解毒

皆宜生用。緩中止渴補虛宜炙用。消息意會之可

矣。炙甘草之任。莫重于復脈湯。其用在通經脈利

血氣可無論矣。而金匱要畧附千金翼方治虛勞

不足汗出則悶脈結悸行動如常。非所謂煩滿短

氣乎。又附外台方治肺痿吐涎沫。心中溫。液

中國醫學史



數而時止為促。主邪氣內陷。
代者止有常數。不能自還。久則
腹動。主元虧。中焦病。或女子懷孕。

者。非所謂傷藏咳嗽乎。按脈之動而止。不能自
還。因而復動者。有三。曰代。曰結。曰促。解之者。曰脈
數而止。謂之促。緩而止。謂之結。有定時。謂之代。乃
矣。甘枳湯。但治結。而不治代。促。其意何居。曰。此非
甘枳不治代。促。乃非治代。促之湯也。觀論中桂枝
去芍藥湯。証脈促。葛根黃芩黃連湯。証脈促。皆不
忌甘枳。即可知其旨。不在甘枳矣。外科精要治一
切癰疽毒發。及丹發火毒。民間治療。毛虫螫。啮。馬
肉中毒。諸药中毒。皆以甘枳。多量。濃煎。與服。按中
毒療治。不外吐下二法。甘枳之所以能奏解毒之

○舌腫又名重舌心脾之熱上攻也
 可用清熱飲治之黃蓮生地
 木通生升連芥蓮子
 ○懸癰上齧腫起如牙尖盛水狀
 此症見於初生兒者居多因胎
 毒上攻需以長針刺破五以独
 味甘湯與飲
 ○撮口者口撮如囊是吮乳不得
 舌強唇青面色黃赤乃心脾
 之熱與胎毒相并是謂危
 候

效者。殆以其且有通下之作用歟。
 甘竹在西藥中為和緩藥。為矯味藥。為賦形藥。無
 单独用之者。中國則不然。傷寒論治脈結代用吳
 甘竹湯。名甘竹。以之為君也。此用甘竹為君藥
 也。金匱要錄之治舌腫塞口。傷寒類要之治傷寒
 心悸。脈結。金鑑之治惡瘡。直指方之治痘瘡煩渴。
 金匱玉函之治小兒撮口。皆以一味甘竹為妙用。
 此單用而成單方者也。然單用者究竟少。而用為
 佐藥者多。人以見甘竹之用於佐藥。而不知甘竹
 亦堪作君藥也。近世對於甘竹之平論。約有二論。說。



