

脈經卷七

病不可發汗證第一

病可發汗證第二

病發汗以後證第三

病不可吐證第四

病可吐證第五

病不可下證第六

病可下證第七

病發汗吐下以後證第八

病可溫證第九

病不可灸證第十



脈經卷七

病不可發汗證第一

病可發汗證第二

病發汗以後證第三

病不可吐證第四

病可吐證第五

病不可下證第六

病可下證第七

病發汗吐下以後證第八

病可溫證第九

病不可灸證第十



病可灸證第十一

病不可刺證第十二

病可刺證第十三

病不可水證第十四

病可水證第十五

病不可火證第十六

病可火證第十七

熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證第十

八

重實重虛陰陽相附生死證第十九

熱病生死期日證第二十



北京中醫藥大學圖書館版權所有

熱病十逆死日證第二十一

熱病五藏氣絕死日證第二十二

熱病至脈死日證第二十三

熱病損脈死日證第二十四

○病不可發汗證第一

少陰病脈細沈數病爲在裏不可發其汗

脈浮而緊法當身體疼痛當以汗解假令尺中脈遲者

不可發其汗何以故然此爲榮氣不足血微少故也

少陰病脈微

一作濡而微弱

不可發其汗無陽故也

脈濡而弱弱反在關濡反在顛微反在上澀反在下微

則陽氣不足澀則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩



澀則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠

動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水

動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端

動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼

目運惡寒食即反吐穀不得前

一云穀不消化

咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣微絕手足逆冷欲

得蹠臥不能自溫

諸脈數動微弱並不可發汗發汗則大便難腹中乾云

小便難胃燥而煩

脈濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦

爲陽運微爲陰寒上實下虛意欲得溫微弦爲虛不可  
發汗發汗則寒慄不能自還欬者則劇數吐涎沫咽中  
必乾小便不利心中飢煩晬時而發其形似瘧有寒無  
熱虛而寒慄欬而發汗踈而苦滿

滿一作心痛

腹中復堅

厥不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌痿穀不得前諸逆發  
汗微者難愈劇者言亂睛眩者死命將難全

太陽病得之八九日如瘧狀發熱而惡寒熱多寒少其

人不嘔清便續

案續居敬本同泰定本袁校本作綽

自下

案泰定本居敬本作可

一

日再三發其脈微而惡寒此爲陰陽俱虛不可復發汗  
也

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱則無陽也不可復

發其汗

咽乾燥者不可發汗

亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振

衄家不可攻其表汗出必額陷脈上促急而緊直視而

不能眴不得眠

汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰疼可與禹餘糧

丸

淋家不可發汗發其汗必便血

瘡家雖有身疼不可攻其表汗出自瘡

一作瘡下同

冬時發其汗必吐利口中爛生瘡

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

欬而小便利若失小便不可攻其表汗出則厥逆冷汗

出多堅

案堅泰定居  
敬本作極

發其汗亦堅

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥者後必熱厥  
深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發其汗必  
日傷爛赤

病人脈數數爲有熱當消穀引食反吐者醫發其汗陽  
微膈氣虛脈則爲數數爲客陽不能消穀胃中虛冷故  
令吐也

傷寒四五日其脈沈煩而喘滿脈沈者病爲在裏反發  
其汗津液越出大便爲難表虛裏實久則譫語

傷寒頭痛翕翕發熱形象中風常微汗出又自嘔者下

之益煩心懊懺如飢發汗則致瘥身強難以屈伸熏之則發黃不得小便久則發欬唾

太陽病發其汗因致瘥

傷寒脈弦細頭痛而反發熱此屬少陽少陽不可發其

汗

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞堅者不可發其汗

少陰病欬而下利譫語者此被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出者是爲下厥上竭爲難治

傷寒有五皆熱病之類也其形相象根本異源同病異名同脈異經病雖俱傷於風其人自有痼疾則不得同法其人素傷於風因復傷於熱風熱相薄則發風溫四肢不收頭痛身熱常汗出不解治在少陰厥陰不可發汗汗出譫語獨語內煩躁擾不得臥善驚目亂無精治之復發其汗如此者醫殺之也

傷寒濕溫其人常傷於濕因而中暍濕熱相薄則發濕溫病苦兩脛逆冷腹滿又胸頭目痛苦妄言治在足太陰不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暍如此者醫殺之也

右二首  
出醫律

○病可發汗證第二

大法春夏宜發汗

凡發汗欲令手足皆周至絜絜一時間益佳但不欲如水流離若病不解當重發汗汗多則亡陽陽虛不得重發汗也

凡服湯藥發汗中病便止不必盡劑也

凡云可發汗而無湯者九散亦可用要以汗出爲解然不如湯隨證良

太陽病外證未解其脈浮弱當以汗解宜桂枝湯

太陽病脈浮而數者可發其汗屬桂枝湯

陽明病脈遲汗出多微惡寒表爲未解可發其汗屬桂

枝湯

夫病脈浮大問病者言便堅耶設利者爲虛大逆堅爲實汗出而解何以故脈浮當以汗解

傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語弱者發熱脈浮者解之當汗出愈

病者煩熱汗出卽解復如瘧狀日晡所發熱此屬陽明脈浮虛者當發其汗屬桂枝湯

病常自汗出此爲榮氣和榮氣和而外不解此衛不和也榮行脈中爲陰主內衛行脈外爲陽主外復發其汗衛和則愈屬桂枝湯

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈此衛氣不和也先其時發汗則愈屬桂枝湯

脈浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血必自下下者即愈  
其外未解者尙未可攻當先解其外屬桂枝湯

太陽病下之微喘者表未解故也屬桂枝加厚樸杏子湯

傷寒病脈浮緊不發其汗因衄屬麻黃湯

陽明病脈浮無汗其人必喘發其汗則愈屬麻黃湯

太陽病脈浮者可發其汗屬桂枝湯

太陽病脈浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解表候續在此當發其汗服湯微除發煩目瞑劇者必衄衄

乃解所以然者陽氣重故也屬麻黃湯

脈浮者病在表可發其汗屬桂枝湯

一云麻黃湯

傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其大便反清

一作小便清

此為不在裏故在表也當發其汗頭痛者必衄

屬桂枝湯

下利後身體疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

太陽病頭痛發熱汗出惡風若惡寒屬桂枝湯

太陽中風陽浮而陰濡弱浮者熱自發濡弱者汗自出

嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔屬桂枝湯

太陽病發熱汗出此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風

屬桂枝湯

太陽病下之氣上撞可與桂枝湯不撞不可與之

太陽病初服桂枝湯而反煩不解者法當先刺風池風府卻與桂枝湯則愈

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發黃豚氣從少腹上撞心者灸其核上一壯與桂枝加桂湯

太陽病項背強几几反汗出惡風屬桂枝加葛根湯

太陽病項背強几几無汗惡風屬葛根湯

太陽與陽明合病而自利不嘔者屬葛根湯

太陽與陽明合病不下利但嘔屬葛根加半夏湯

太陽病桂枝證醫反下之遂利不止其脈促者表未解喘而汗出屬葛根黃芩黃連湯

太陽病頭痛發熱身體疼痛腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘屬麻黃湯

太陽與陽明合病喘而胸滿不可下也屬麻黃湯

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁頭痛屬大青龍湯脈微弱汗出惡風不可服之服之則厥筋惕肉瞤此爲逆也

傷寒脈浮緩其身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之

傷寒表不解心下水氣乾嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不利小腹滿或微喘屬小青龍湯

傷寒心下水氣欬而微喘發熱不渴服湯已而渴者

此寒去爲欲解屬小青龍湯

陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按

之氣不通

一作按之不痛

鼻乾不得汗嗜臥一身及目悉黃小

便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小瘡外不解病過

十日脈續浮與小柴胡湯但浮無餘證與麻黃湯不溺

腹滿加噦不治

太陽病十日以去脈浮細嗜臥此爲外解設胸滿脇痛

與小柴胡湯脈浮者屬麻黃湯

中風往來寒熱傷寒五六日以後胸脇苦滿嘿嘿不欲

飲食煩心喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇

下痞堅或心中悸小便不利或不渴外有微熱或欬者