

# 臨證指南

## 卷十



臨證指南醫案目

卷十

幼科要畧

痧疹

痘

疽

吐瀉

癰疽厥

虫

集方

此卷論幼科及看痘之法和平精切字字金玉可法可傳得  
古人之真銓而融化之不愧名家聞此老太翁爲幼科專門  
名聞遠近此老旣得家學淵源又於大方諸書採取經絡氣  
性之義而附益之所以其理益精其方益正不若前所刻之  
諸案尙多可議處也

臨證指南醫案卷十

十月 著溪漫士臨本

許關李大略翰

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲同校

邵銘新甫

# 幼科要畧

按襁褓小兒體屬純陽所患熱病最多世俗醫者固知謂  
六氣之邪皆從火化飲食停滯鬱蒸變熱熱鬱內迫五  
志動極皆陽奈今時治法初則驟散解肌以退表熱仍  
混入消導繼用清熱苦降或兼下奪再令病家禁絕乳

禁絕然大  
宜減少佐  
以米飯不  
令生痰也

食而致胃氣索然內風來乘雖曰霍亂告斃甚多附記  
世俗通套之方藥於左不可不知不足取法也

防風 荆芥 葛根 前胡 桔梗 木通

赤芍 荀子 葶利 陳皮 山查 麥芽

枳殼 神連 釣勝 夏佐香 藟冬 仁庶 廣香

兩三日熱不解

藥胡 前胡 黃連 黃芩 山柰 蓮翹

薄荷 葛根 木通 釣勝 厚朴 枳實

爪黃寶 丸劑必用大黃

四五日不解俱言食滯未盡表裏不和難以治小用



錄出諸品  
藥成人不  
可輕用及  
觀後幅所  
用之藥仍  
不出此諸  
味則前後  
相昔矣要  
知此等藥  
雖有用之  
得宜不對  
症則用之  
有害不必  
驚山重戒  
反成後人  
之疑也

胸若嘔逆煩渴用竹茹黃連半夏若痰多喘促即川芎  
蘇杏仁蘇子苟子胆星貝母甚者加牛黃此法所  
當戒也

屢清消不愈便無方法苟不變驚必日骨蒸孩兒所用  
藥餌不分氣血陰陽但知見症施治如早涼暮熱必用

地骨皮 丹皮 生地 元參 射干 北沙參

石斛 知母

有痰加

蘇子 杏仁 貝母 橘紅 胆星 桔槓

其鈎藤石斛茯苓穀芽之屬每劑必用總之取無故痰

藥待其自愈倘有變症希冀掩飾而已

愚按嬰兒肌肉柔脆不耐風寒六腑五臟氣弱乳汁難化  
內外二因之病自多然有非風寒竟致外感不停喘已  
屬內傷其故何歟嘗思人在氣交之中春夏地氣之升  
秋冬天令之降呼出吸入與時消息間有穢濁吸入即  
是三焦受邪過稟原直行中道必發熱煩躁倘幼醫但  
執前藥表散消導清火通便病輕或有倖成病重必然  
顛覆錢仲陽云藿腹不可近襁褓小兒余言非無據矣  
四十年來治效頗多畧述其槩云

夫春溫夏熱秋涼冬寒四時之序也春應溫而反大寒夏

應執而反大涼。秋應涼而反大熱。冬應寒而反大溫。皆  
不正之乎氣也。病自外感。治從陽分。若因口鼻受氣。未  
必恰在足太陽經矣。大凡吸入之邪。首先犯肺。發熱咳  
喘。口鼻均入之邪。先上繼中。咳喘必兼嘔逆。肺脹雖因  
外邪。亦是表中之裏。設宗世醫發散陽經。雖汪不解。功  
穉質薄。神快。日期多延。病變錯綜。茲以四氣常法列左。

### 伏氣

春溫一症。由冬令收藏未回。昔人以冬寒內伏。藏於少陰。  
入春發於少陽。以春木內應肝胆也。寒邪深伏。已經化  
熱。昔賢以黃芩湯為主方。苦寒直清。裏熱伏於陰。苦

味堅陰乃正治也。知溫邪是散，不與暴感門同法。若因外邪先受，引動在裏伏熱，必先辛涼以解新邪，繼進苦寒以清裏熱。況熱乃無形之氣，幼醫多用消滯攻治，有形胃汁先涸，陰液劫盡者多矣。

備用方

黃芩湯

葱鼓湯 新邪引動伏邪

涼膈散

清心涼膈散

風濕

風濕者，春月受風，其氣已溫。經謂春氣病在頭，治在上焦。

肺位最高，邪必先傷此手太陰氣分。先病失治，則入于厥陰心胞絡血分，亦傷蓋足經順傳如太陽傳陽明入

皆知之。肺病失治，逆傳心胞，終幼科多不知者。俗醫見身熱咳喘，不知肺病在上之旨，妄投荆防柴葛，加入枳、朴、杏、蘇、葛、子、查、麥、廣皮之屬，輒云解肌消食，有見於咳，便用大黃、礞石、浣痰丸，大便數行，上熱愈結，逆傳愈少，胃薄表裏苦辛，化燥胃汁已傷，復用大黃、大苦、大寒降丸，藥致脾胃陽印傷極，陡變驚風，莫救者多矣。

按此症風溫肺病治在上焦，大風溫春溫忌汗，初病投劑宜用辛涼，若雜入消導發散，不但與肺病無涉，劫盡

才須到症

胃汁，肺乏津液，上供頭目，清竅徒爲熱氣薰蒸，鼻乾如煤，目眵或上竅無淚，或熱深肢厥，狂躁溺瀉，胸高氣促。

皆是肺氣不宣化之徵。莊時若以肺藥少加一味清降，使藥力不致直趨陽中，而上連可開諸竅，自夾無如城市崩，醫愈云結胸，皆用連薤柴枳苦寒直降，我閉塞愈甚，告斃甚多。

按此症初因發熱喘嗽，首用辛涼清肅上焦，如薄荷連翹牛蒡象貝桑葉沙參梔皮薤皮花粉，若色蒼熱勝，煩渴用石膏竹葉辛寒清散疹痘，亦當宗此。若日數漸多，邪不得解，芩連涼膈亦可選用。至熱邪逆傳入膈中，神昏目瞋，鼻竅無涕淚，諸竅欲閉，其勢危急，必用至寶丹或牛黃清心丸，病減後餘熱只甘寒清養胃陰足矣。

常用方葉莖湯

清心涼膈散

涼膈散

瀉白散

葶藶大棗湯

白虎湯

至寶丹

清心牛黃丸

竹葉石膏湯

俞氏清燥救肺湯

夏熱

夏為熱病然夏至已前時令未為大熱經以先夏至病溫

後夏至病暑溫邪前已申明暑熱一症幼醫易眩夏暑

發自陽明古人以白虎湯為主方後賢劉河間創議迥

出諸家謂溫熱時邪當分三焦投藥以苦辛寒為主若

○並無分三焦者

拘六經分症仍是傷寒治法致悞多矣蓋傷寒外受之



此散乃  
治暑濕  
之方也  
得此類  
方

寒必先從汗解辛溫散邪是已口鼻吸入之寒即為中  
寒陰病治當溫裏分三陰見症施治若夫暑病端方甚  
暑病傳變之方亦不無多  
少皆因前人畧於暑詳於寒耳考古如金匱暑暍症之  
因而潔古以動靜分中暑中熱各具至理茲不樂述論  
痧科病暑熱夾雜別病有諸而時下不外發散特導加  
入香薷一味或六一散一服考本草香薷辛溫發汗能  
泄宿水夏熱氣閉無汗渴飲停水香薷必佐杏仁以杏  
仁苦降泄氣大順散取義若此長夏濕令暑必兼濕暑  
傷氣分濕亦傷氣汗則耗氣傷陽胃汁大受劫燥變病  
由此甚多發泄司令裏真自虛張鳳達云暑病首用辛

厥法

涼繼用甘寒再用酸泄酸飲不必用下可稱要言不煩  
矣然幼科因暑熱蔓延變生他病茲摘其槩

受熱厥逆

夏令受熱昏迷若驚此爲暑厥卽熱氣閉塞孔竅所致其  
邪入絡與中絡同法牛黃丸至寶丹芳香利竅可效神  
甦以後用清涼血分如連翹心竹葉心玄參細生地鮮  
生地二冬之屬此症初起大忌風藥初病暑熱傷氣竹  
葉石膏湯或清肺輕劑大凡熱深厥深四肢逆冷但看  
面垢苔燥二便不通或瀉不爽爲是大忌悞認傷寒也

疳



幼兒斷乳納食值夏月脾胃主氣易於肚膨泄瀉頭熱手足心熱形體口糜或煩渴善食漸成五疳積聚當審微之強弱病之新久有餘者當疏胃清熱食入糞色白或不化當健脾佐消導清熱若濕熱內鬱蟲積腹痛導滯驅蟲微下之緩調用肥兒丸之屬

### 口疳

夏季秋熱小兒泄瀉或初愈未愈滿口皆生疳蝕嘗有阻塞咽喉致危者此皆在裏濕盛生熱熱氣蒸灼津液不升濕熱偏傷氣分治在上焦或佐淡滲世俗常刮西瓜翠衣治疳取其輕揚滲利也

脹

夏季濕熱鬱蒸脾胃氣弱水穀之氣不運溫着內蘊爲熱  
漸至浮腫腹脹小水不利治之非法水濕久積逆行犯  
肺必生咳嗽喘促甚則坐不得臥俯不能仰危期速矣  
大凡喘必生脹脹必生喘方書以先喘後脹者治在肺  
先脹後喘者治在脾亦定論也金匱有風水皮水石水  
正水黃汗以分表裏之治河間有三焦分消子和有磨  
積逐水皆有奧義學者不可不潛心體認難以槩述閱  
近代世俗論水濕喘脹之症以內經開鬼門取汗爲表  
治分利小便潔淨府爲裏治經旨病能篇謂諸濕腫滿

皆屬於脾以健脾燥濕爲穩治治之不效技窮束手矣  
不知凡病皆本乎陰陽通表利小便乃宜經氣利腑氣  
是陽病治法暖水臟溫脾腎補方以驅水是陰病治法  
治肺痺以輕開上治脾必佐溫通若陰陽表裏乖違臟  
真日漓陰陽不運亦必作脹治以通陽乃可奏績如局  
方禹餘糧丸甚至三焦交阻必用分消腸胃室塞必用  
下奪然不得與傷寒實熱同例擅投硝黃枳朴擾動陰  
血若太陰脾臟飲濕阻氣溫之補之不應欲用下法少  
少大收  
少甘遂爲丸可也其治實症選用方法備採

備用方  
葶大棗湯

瀉白散

大順散