

午
9K6

溫燥 驗案

消補

化益

重訂廣溫雜論

署一寒居士



六 溫燥法

客寒色大
濕遏熱伏

夾水氣

溫熱爲伏火症。本不當用溫燥。然初起客寒包火。搏束過甚。致伏邪不能外達。不得不暫用溫散法。如劉氏蘇羌飲。局方芎蘇散之類。亦有濕遏熱伏。抑鬱太甚。致伏邪不能外出。不得不暫用辛燥法。如藿香正氣散。九味羌活湯之類。一經寒散。熱越濕開。熱透即當轉用他法。以速清其伏邪。此在表兼寒兼濕之。當用溫燥法也。更有初起夾水氣症。在表時不宜純用辛涼發散。若純用辛涼。則表必不解。而轉見沉困。有裏症不可遽用苦寒。若早用苦寒。則裏熱內陷。必轉加昏蒙。此水氣鬱遏。伏邪陽氣受困。宜於發表清裏藥中。加溫燥之品。以祛水氣。如藿香、厚樸、半夏、蒼朮、草果、豆蔻、廣

溫燥

夾冷食。

吐法
椒鹽湯、萝卜汁

皮赤苓等品皆可對症酌用。迨水氣去鬱遏開然後議攻議涼。則無不效者矣。又有夾冷食傷胃。往往有脈沉肢冷者。若胸膈痞滿舌胎白厚益爲食墳膈上之明證。卽當用溫化燥削如加味平胃散（戴北山驗方）沉香百消麵（道藏方）絳礬丸（張氏醫通方）之類。甚則用吐法以宣之。如椒鹽湯、生蘿蔔汁等使膈開而陽氣宣達。然後伏邪外潰或當解表或當清裏。自無誤治矣。此在裏夾水夾食之當用溫燥法也。此等兼症夾症。每用溫燥藥見功者。遂相訟。清熱瀉火之非歸咎於冰伏涼遏之弊。不知溫熱乃其本氣。兼夾乃其間氣也。豈可拘執兼症夾症之用溫燥法見功。遂併其溫熱本症之當用清涼而一概抹煞也耶。更有並無兼症夾症。

邪深入裡失

下

陽虛體

而邪深入裏，失於攻下。而熱深厥深，反欲擁被向火，凜凜惡寒。身冷肢厥，而二三處獨見火症，如目大小皆赤，舌胎黃黑，小便黃赤澀痛，大便稀黃極臭，或下利鮮血。此皆熱深陽鬱之象，當以溫燥通鬱爲主佐，以辛涼透熱。如新定達原飲加減，藿朴夏苓湯之類，使裏氣通而鬱陽發，反大熱而煩渴，卽轉機而用清用下，以收全功者甚多。至若本係溫熱伏邪，因其人平素陽虛，或年已衰老，醫用發表攻裏太過，至汗出不止，嘔利俱作，四肢微厥，脉微惡寒者，不得不暫用溫燥扶陽，如胃苓湯合半硫丸之溫運脾陽，尤附湯合半硫丸（皆吳氏溫病條辨方）之溫固命陽，但須知雖屬陽虛，却從熱症來，而陰必虧，半硫桂附亦不可過用。當佐以護陰藥。

濕溫
症端

爲妙。如歸芪建中湯。參附養榮湯之類。皆可酌用。總之此症溫補略緩。及溫補不到。必死或過。用溫補陽。雖回而陰竭。亦死。此處不可不斟酌至當也。又如濕溫濕熱。方伏於膜原。未經傳變之時。胸膈必多痰滯。有見其煩躁而過用知膏芩連者。有因其作渴而遽用生地麥冬者。有病者自認火症。而恣啖冷水西瓜梨薺。太早者。皆能抑鬱陽氣。壅閉伏火。火邊於中下二焦。停痰滯於上焦。每見惡寒胸痞。甚則煩躁昏譖。宜先以宣導痰滯爲主。如加味二陳湯。藿樸二陳湯。吳氏導痰湯。三子導痰湯之類。痰滯通。則伏火之症。發現。隨其傳變。以施涼解攻利之劑。乃有效也。以上溫補溫化二法。特救藥誤。食誤。非治溫熱正病耳。總之溫熱諸症中。惟濕溫一。

病後調理

症。其病情半陰半陽。其病原水火互結。其病狀反覆變遷。不可窮極。在上焦如傷寒。在下焦如內傷。在中焦或如外感。或如內傷。至其變症。則有濕痺、水氣咳嗽、痰飲、黃汗、黃疸、腫脹、瘡疾、痢疾、淋症、帶症、便血、癰氣痔瘻、癰膿等症。其間宜清涼芳烈者固多。宜溫化燥滲者亦不少。方法已詳溫熱即是伏火篇。若夫病後調理。凡屬濕溫濕熱。當以扶陽爲法。溫健胃陽。如香砂理中湯。六君子湯之類。溫升脾陽。如補中益氣湯。參胡三白湯之類。然亦有病後化燥。有當用甘涼濡潤者。或有用酸甘化陰者。全在臨症者活法機變也。謹述宜溫燥諸症條列於左。

病後化燥

頭痛身熱 惡寒無汗 甚或肩背腰痛 或膝胫痛 口雖

不渴。間有煩躁口苦。便溏不爽。小便黃熱。舌苔滑白。
或兩邊白中淡黃。以上溫熱兼寒。新涼外束之候。

凜凜惡寒。甚或足冷。頭目脹痛昏重。如裹如蒙。身痛
不能屈伸。身重不能轉側。肢節肌肉。疼而且煩。腿足
痛而且酸。沉困嗜睡。胸膈痞滿。渴不引飲。或竟不渴。
午後先寒後熱。狀若濕瘡。舌苔白膩。或白滑而厚。或
白胎帶灰兼黏膩浮滑。或白帶黑點而黏膩。或兼黑紋而
黏膩。甚或舌胎滿布。厚如積粉。板貼不鬆。以上溫熱、
兼濕濕遏熱。伏之候。

胸脘滿痛。按之則軟。略加揉按。漉漉有聲。甚則腸下

抽痛。乾嘔短氣。或腰重足腫。下利溺少。甚或沉困昏
憤。舌苔滑白。間有轉黃轉黑而胖滑。或滿舌黃黑。半
邊夾一二條白色。或舌尖舌本俱黃。中間夾一段白色。
以上溫熱夾水停積胸脘之候。

惡食吞酸。噯氣腹滿。欲吐不吐。嘔逆痞悶。甚或脉沉
肢冷。舌苔白厚。微兼淡黃。以上溫熱夾冷食填塞膈脘
之候。

氣少息促。聲顫無力。語不接續。喜向裏睡。汗出惡寒。
嘔利俱作。四肢微厥。甚或兩足冷甚。舌色淡紅圓厚。
或淡晦少神。或舌青胖嫩。以上溫熱夾虛涼瀉太過之候。

消化

頭目昏眩。胸膈痞悶。按之不痛。口吐涎沫。懊憹煩躁。
甚或神昏如迷。舌苔白滑黃滑不等。以上溫熱夾痰涼遏。
太過之候。

七 消化法

消者去其壅也。化者導其滯也。凡人氣血所以壅滯者必有所因。
先其所因而堅者削之。此卽消化之法也。雖然。凡用消化方藥。必
須按其部分而君臣佐使駕馭。有方使不得移。則病處當之。不致
誅伐。無過不明乎。此而妄用。尅削則病處未消。而元氣已傷。其害
不可勝言。允其所以積滯者。有食積、痰積、水積、瘀積、蟲積之不同。
種種見症。不一而足。務在明辨症候。按法而消化之。以余所驗。溫、

消食方

熱伏邪臨時每多夾食夾痰夾水夾瘀夾蟲之故必爲消化乃得其平。

消痰方

(甲) 消食諸方。如加味平胃散、沉香百消麵、絳礬丸之類皆可酌用。而以枳實導滯湯、枳實梔豉湯、加竹瀝蘿蔔汁二方奏功尤速。

(乙) 消痰諸方。如加味二陳湯、藿樸二陳湯、加減導痰湯、加味小陷胸湯、加減半夏瀉心湯、雪羹加生蘿蔔汁、星香導痰丸之類皆可選用。而以節齋化痰丸(淡天冬青子芩瓜蒌霜青海粉賴橘紅各一兩。苦桔梗製香附青連翹各五錢。上青黛風化硝各三錢研細加蜜丸、王節齋名醫雜著方)、麝製川貝二方效用最繁。若痰塞咽喉可用導痰開關散、雄黃解毒丸等吐之。痰壅胸膈則

以降痰奔馬湯。（雪梨汁一杯、生薑汁四滴、蜂蜜半杯、薄荷細末一錢、和勻器盛、重湯煮一時之久、任意與食、降痰如奔馬、善治痰氣壅塞、故名陳飛霞幼幼集成方）調下珍珠滾痰丸。（半夏五十粒、巴豆三十粒、去殼同半夏煮待半夏熟爛、取出巴豆、止用半夏烘乾爲細末、米糊爲丸、如菜子大、硃砂爲衣、晒乾、用蘿蔔汁吞服七丸、大人倍之、吳庚生按此方治痰極有效、癲癇瘧厥及喉閉之屬有痰者、均可用、趙恕軒串雅內編方）服之立效、痰迷清竅、當以昌陽瀉心湯、沈氏六神湯二方隨症加減、症輕加萬氏牛黃丸、及珠黃散等、症重加牛黃清心丸、新定牛黃清心丸、安宮牛黃丸、集成太極丸（天竺黃杜膽星各五錢、酒炒生錦紋二錢、直殼

蠶三錢、麝香梅冰各二分、蜜丸如芡實大、硃砂爲衣、小兒每服一丸、大人五丸、陳氏幼幼集成方等宣化之、痰積胃腸宜以五仁橘皮湯（光杏仁四錢、生苡仁括蔞仁各五錢、蔻仁八分拌搗郁李淨仁三錢、蜜炙賴橘紅錢半、廉臣驗方）加味小陷胸湯爲主。

酌加節齊化痰丸或集成金粟丹等（九製杜膽星明天麻明乳香各二兩炒竹節白附子淨全蝎代赭石直僵蠶各一兩赤金箔五十張、真麝香二分梅花冰片三分蜜丸皂角子大貼以金箔每用一丸薑湯化服此方比抱龍金液保命至寶定命等方功倍十百善治咳嗽上氣喘急不定嗽聲不轉眼翻手搖昏沉不醒等症一服卽全因九製膽星雖真牛黃莫能及此惟虛寒之痰無根之

氣絕脫之證不可用。陳氏幼幼集成方）消逐之症勢極重者必用張氏新加涼膈散合礞石滾痰丸。（青子芩酒蒸大黃各八兩火硝煅礞石一兩上沉香五錢水丸量大小用之王汝言養生主論方）消化而峻逐之痰滯經絡宜以竹瀝五汁飲（淡竹瀝一杯生薑汁一匙生蘿蔔汁鮮桑枝汁生雅梨汁各三羹瓢荆瀝陳酒各一瓢和勻重湯煮一時之久溫服廉臣驗方）爲主輕加指迷茯苓丸。（浙茯苓二兩半夏一兩生研澄粉炒枳殼半兩風化硝二錢半薑汁和丸如桐子大每服三十丸徐洄溪蘭臺軌範通治方）重加聖濟大活絡丹。白花蛇烏梢蛇威靈仙兩頭尖如無可用竹節白附子代之草烏煨天麻淨全蝎製首烏炙龜版麻

黃貫仲灸甘草羌活官桂藿香烏藥川連熟地酒蒸大黃廣木香
沉香以上各二兩細辛赤芍淨沒藥公丁香明乳香白殭蠶薑製
南星青皮骨碎補白豆蔻安息香酒熬黑附塊炒黃芩浙茯苓製
香附元參白朮以上各一兩防風二兩半葛根炙虎脰骨當歸各
一兩半血竭七錢炙地龍犀角麝香松脂各五錢牛黃片腦各一
錢半人參三兩共五十味爲末蜜丸如桂圓核大金箔爲衣陳酒
送下徐洄溪蘭臺軌範通治方云頑痰惡風熱毒瘀血入於經絡
非此方不能透達凡治肢體大症必備之藥也汪謝城方甲云近
人所製人參再造丸一名回生再造丸卽此方減去草烏貫仲黃
芩香附骨碎補麝香沒藥乳香八味加入黃耆琥珀白芷桑寄生

消疫方

消水方

川芎厚樸天竺黃草果紅花穿山甲薑黃草薢十二味治證並同
一宣化而消散之。

(丙) 消水諸方分消上焦之積水。蔞蘆橘皮湯葉氏加減蘆根飲。
葉氏新加梔豉湯三方酌用分消中焦之積水宜以茵陳胃苓湯
藿樸胃苓湯二方爲主或加三因控涎丹或加神芎導水丸隨其
輕重而選用之分消下焦之積水茵陳五苓散加味八珍散二方
爲主勢重者或用加味控涎丹或合大陷胸湯使積水從二便而
逐去之舟車神祐丸(炒黑丑四兩酒炒錦紋二兩煨甘遂煨大
戟醋炒芫花炒青皮廣橘紅各一兩廣木香五分輕粉一錢水法
丸劉河間方)尤能捷效。

舟車神祐丸
丑紋之遂戟
芫青陈木香
大戟
芫花
青皮
廣橘紅
廣木香
輕粉

消瘀方

輕消瘀

重消瘀

(丁) 消瘀諸方。輕劑如沉香百消麵。香殼散。(醫通方)失笑散。

五體脂生蒲黃各一兩研末每服二錢至三錢。武氏濟陰綱目
方。七釐散。真血竭一兩粉口兒茶二錢四分明乳香淨沒藥。
杜紅花各錢半飛辰砂一錢二分冰麝各一分二厘研細每服
七釐。增廣新編驗方。九分散。明乳香淨沒藥各一兩麻黃燒
酒浸馬前子各五錢研細每服九分新編驗方。之類重劑如
飛馬金丹。無極丸。鬱金丸。(廣鬱金海南子明乳香淨沒藥。飛
雄黃硃砂巴霜各四錢合研極勻細米醋飛麵糊爲丸如菜豆
大。大人每服九十一丸。小兒五丸三丸孕婦忌服。服時宜先瀝
冷。瀝見所下既多而不止者。即飲一二杯止之。見沈樾亭驗方

消瘀方

傳信局方聚寶丹（廣木香。上沉香。春砂仁各三錢。麝香八分。

生薑末。陳酒。
童便。活蠭蟲。

羌防行癆湯
羌防威歸散
羌乳沒紅
桑根、

炒延胡。明乳香。淨沒藥。各三錢。血竭。錢半。共研細末。糯米粉糊丸。彈子大。硃砂爲衣。顧松園醫鏡方）之類。皆可隨症佐入。於清解劑中。屢投輒效。尤以童便。陳酒。生薑汁。活蠭蟲漿等四味。效用最多。隨症均可加入。確爲普通消瘀之良藥。至於專門消瘀。當分部位。消一身經絡之瘀。羌防行癆湯。（羌活。防風。各一錢。威靈仙。全當歸。各三錢。川斷。秦艽。各二錢。明乳香。淨沒藥。杜紅花。各五分。先用嫩桑枝三兩。青松針一兩。煎湯代水。頭痛加白菊花一錢。用芎六分。背痛加片薑黃八分。肩背痛加桔梗。錢半。腰膝脚痛加淮牛膝。川草薢。各三錢。筋絡拘攣。加絡石藤。煅