

馮氏錦囊秘錄雜症大小合參卷十三

男

乾元龍田

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

門人王崇志慎初全較

男

乾泰坦公

瘡疾大小總論合參

瘡者。內經謂疹瘡。雲。樞名歲露。有寒瘡。溫瘡。癰瘡。種種不同。經曰。疹瘡皆生於風。不過言其一端耳。然風寒暑濕邪自外來。飲食居處邪由內作。始發也。毫毛伸欠。身體拘急。寒慄鼓領。寒去未幾。內外皆熱。頭痛如破。渴欲飲冷。經所

謂陰陽相移也。有因夏傷於暑，熱氣盛藏於皮膚之內，舍於榮氣之中，因得秋氣，汗出遇風，暑熱既伏於榮，風寒又居於衛，遂閉其汗而不得出，然榮專在內，無自而發，衛行於外，二邪隨之以出入焉。衛氣晝行於陽，邪氣得而外出，此瘡之所以發也。夜行於陰，邪氣得而內入，此瘡之所以蓄也。凡陰陽不可相離，惟有病者，陽氣上行，陰氣下行，行極則返，則陰陽遇而相爭，故經曰：陰陽上下交爭，此也。瘡之始發，陽辟於陰，陰實則三陽虛，陽虛則外寒，陰實則內寒，故寒慄鼓領，中外皆寒，湯火不能溫骨，寒而痛，由是陰

氣逆極同辟於陽是以外之陽氣實而內之陰氣虛陽盛則外熱陰虛則內熱中外皆熱故發喘而渴急欲飲冷冰水不能寒然有間日而發者邪氣內薄於五臟橫連募原與衛氣其道遠其行遲衛氣每日獨發於外陰邪附着於內獨發者其行速內着者其發難是以間日一發耳自始作之後日晏一日而至後日早一日者邪初客於風府自項脊循膂下行日下一節風府者在於項上項骨有三椎下至尾骶骨共計二十四節凡衛一日一夜行五十度已畢次日則復出於足太陽經之睛明穴上至於頂轉行後

項大會於風府。瘧之始發也。邪在風府。衛至風府。邪隨衛出而病作。其後也。邪自風府日下一節。與風府相遠。不得與衛氣同作。衛氣行至邪舍。邪始得隨衛氣而發焉。是以日晏一日也。至二十五日。邪已下至尾骶骨而行畢。則入脊內。注於伏膂之脈。從腎上貫肝膈上。行缺盆之中。其氣日高能隨衛氣而出。故較之於前。而日早耳。有間數日。而發。或渴或不渴者。是邪氣深客於內。不得隨衛氣以出。故至間數日而發耳。其有渴或不渴者。陰弱於陽。則陽勝而熱甚。故渴。陽併於陰。則陰勝而熱不甚。故不渴也。有每日

依期而至忽乃錯亂無定或早或晏者是正氣稍復邪無  
容地而瘧將好也然經曰夏傷於暑秋必痳瘧又曰此應  
四時者也冬日爲瘧者冬氣嚴冽陽氣伏藏不與寒爭故  
寒必不甘秋時病瘧者清氣已涼陽氣下降然藏肌膚熟  
極則寒故其寒也必甚春日病瘧者春氣溫和陽氣外洩  
腠裏開發故必惡風夏日病瘧者暑熱熏蒸津液外泄故  
必多汗有先寒後熱者因先傷於寒後傷於風寒氣屬陰  
風氣屬陽先感陰氣而後感陽故先寒後熱以寒爲病機  
故經名寒瘧先熱後寒者因先傷於風後感於寒先感陽

而後感陰故先熱後寒以風爲病機故名溫瘡但熱而不寒者是陽氣盛而獨發故但熱不寒也此表裏俱熱令人消爍肌肉故經謂瘡瘍瘍瘍者因乘涼飲冷饑飽失時當風臥濕脾胃不和化而爲痰存積中脘遇感乃發故又名濕瘡牝瘡者寒多熱微或竟寒不熱瘡瘍者乍寒乍有乍無疫瘡者一歲之間長幼皆但是瘡者夢寐不詳多生恐怖本因脾虛感襲實非鬼疫致邪然世以符咒壓之而愈者蓋瘡因脾虛而脾主信符咒之佩身則心有所恃脾有所信中氣一壯外邪自解勞瘡者經年不瘥前後復

發結成癥癬。一名瘡母。此因治之失宜。督脈損邪伏肝經。膀胱有塊。此症當以補虛爲要。若徒以攻塊爲事。多致不救。虛瘡者。正氣虛極。邪乘虛襲。必先參术托住正氣。毋使下陷也。然經雖有五臟瘡。及膽胃膀胱瘡之分。總在半表半裏。屬少陽一經。而脾胃爲之主氣。虛者多發於晝。血虛者多發於夜。氣血俱虛者。晝夜並作也。治瘡大法。無汗者要有汗散。邪爲主。而帶補有汗者。要無汗扶正爲主。而帶散。若過汗之。則大耗津液。變生別病。故必察其邪之淺深。諳之陰陽。令其自陰而陽。自臟而腑。由娶而母。散而越。

之邪去則安。更有老瘧并夜發者。是邪客陰分。當用血分藥內加升提。引出陽分。方與散截爲宜。凡在陽分者易治。陰分者難療。有惡飲食者。必自飲食而得可。與消導爲妙。若胃傷惡食。脈虛無力者。又以溫補爲功。總有餘者瀉之。不足者補之。經曰。方其盛時。必毀。因其衰也。事必大昌。蓋以邪氣正盛。治而瀉之。則必毀傷真氣。不若因邪氣已衰。而補其經氣。則邪氣自退。故必大昌。丹溪所言三日一發者。受病一年二日一發者。受病半年一日一發者。受病一月亦不過。言受病之深淺耳。邪受淺者。病在三陽。邪隨衛。

氣出入而一日一作深者病在三陰不能隨衛氣並出或  
間日或三四日而一作作愈遲者病愈深也得之於暑月  
者十有七八蓋因時當中表氣虛水穀停聚爲痰飲於胸  
膈矣風暑入內血液稽留於經絡矣夏時毛竅疎通而不  
爲病秋氣收斂表邪不能發越故進退不已往來寒熱勢  
如委瘞人之狀所以名瘞人之榮衛晝行陽春與背也夜  
行陰胸與腹也行至病所而不通乃作寒戰中外如冰此  
寒氣發於內也寒已而內外皆熱此邪火盛於外也寒多  
熱少宜豁痰開鬱發散熱多寒少宜清熱補虛而兼發散

總以理脾保土爲主而青皮檳榔之類不可久用也。○  
發在夏至後處暑前者此三陽受病傷之淺者近而暴也。○  
發在處暑後冬至前者此三陰受病傷之重者遠而深也。○  
自子至巳屬陽自午至亥屬陰衛虛則先寒營虛則先熱○  
然瘧本暑邪法當解肌且有無痰不成瘧無食不成瘧之○  
語或當消導然更莫不由於中氣不足而得若元氣先虛○  
之人誤投破氣尅伐之藥則中氣虛而愈虛不但邪不得○  
解勢反內陷必使膿血多成腹脹駟至不救往往而是○  
世間似瘧非瘧者多奈何一見寒熱往來便以截瘧丹一

截不止則再截止而復發復截以致委頓甚或因而致斃。經曰陽虛則惡寒陰虛則惡熱陰氣上入於陽中則惡寒陽氣下陷於陰中則惡熱凡傷寒後大病後產後癆瘍等症俱有往來寒熱似瘧甚或一日二三度發者並作虛治但有陽虛陰虛之別陽虛者補陽如理中湯六君子湯補中益氣湯加薑桂甚則加附子諸方中必用升柴以提出陰中之陽水升火降而愈醫書中有論及者矣至於陰虛者其寒熱亦與正瘧無異而陰瘧中又有真陰真陽之分人所不知經曰晝見夜伏夜見晝止按時而發是無水也。

晝見夜伏夜見晝止條忽往來時作時止是無火也無水者壯水之主以鎮陽光六味湯主之無火者益火之原以消陰翳八味湯主之世人患久瘧而不愈者非瘧不可愈乃治之不如法也

風與暑陽邪也寒與水陰邪也然風爲陽中之涼氣暑爲熱中之寒邪合是四者而言無非皆屬乎寒故俗呼爲脾寒病謂寒邪客於肌肉之間而脾應肉也及瘧之將發必先手足厥冷以脾主四肢也經言暑者言時氣也寒者言病氣也雖邪氣自淺而深鬱寒成熱然終不免寒爲本熱

爲標耳久而不解縱實必虛非大補真氣大傷則早不得瘳也瘧發必有寒有熱蓋外邪伏於半表半裏正在少陽所主之界出與陽爭陰勝則寒入與陰爭陽勝則熱卽純熱無寒爲癰瘡溫瘡純寒無熱爲牝瘡要皆自少陽而造其極偏故補偏救弊亦必還返少陽之界使陰陽協和而後愈也謂少陽而兼他經則有之謂他經而不涉少陽則不成其爲瘧矣少陽乃東方甲木之象故其脉自首尾輕重總不離乎弦也瘧之不離少陽猶咳之不離於肺也然瘧有因水有因血者惟水飲所以作寒熱惟瘀血所以憎

寒熱故用常山能逐水也若是血症宜加當歸桃仁行血之品爲佐蓋瘧晝發屬氣夜發屬血保命集云瘧夜發者乃邪氣深遠而入血分爲陰經有邪宜加桃仁於桂麻湯中發散血中之風寒

李士材曰常山生用多用則吐與甘草同用亦吐若酒浸炒透但用錢許每見奇功未見其或吐也世人泥於老人久病忌服之說使良藥見疑沉疴難起抑何愚耶時珍曰常山蜀漆刲瘻截瘑須在發散表邪及提出陽分之後用之得宜其效如神然瘧藥每以黃昏煎好露一宿五更時

溫服者以瘧爲暑邪。凡暑得露則散也。

醫貫云：有渴甚者，發時飲湯不絕。以六味丸一料納肉桂一兩水煎探冷連進代茶。遂熱睡渴止而熱愈。又有惡寒惡熱如瘧無異。面赤如脂。口渴不甚。吐痰如湧。身以上熱如烙。膝以下自覺冷。此真陽泛上腎虛之極急。以附子八味地黃湯大劑冷飲而熱退。繼以人參建中湯調理。

截者堵截也。兵精糧足寇至方可堵截。壯盛之體三四十發後瘧勢少減可以截之。其虛弱之人始終不能截也。誤截因致腹脹別病不可不慎。卽服藥亦有避忌。瘧將來可服

藥咀其來將退可服藥追其去若瘧勢正盛服藥與之混戰徒自苦耳。至於多熱而久不解者其人必本陰虛法當益陰除熱非生鱉甲牛膝不能除也。多寒而久不解者其人必本陽虛非參芪白朮甚至桂附不能除也。凡久瘧不止乃屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則寒熱交作或吐涎不食泄瀉腹痛手足厥冷寒戰如慄若投以清脾截瘧二飲多致危殆惟人參煨薑各一兩煎湯於發前三時服或發日五更連進二劑無不愈者無力服參者氣虛以白朮代之血虛當歸

代之或人參常山各五錢同炒去常山以人參煎湯未發前服亦效故曰脈實症實攻邪以治標脈虛症虛補止脉治本瘧者風寒暑濕之邪爲外感三陽經病也奈嚴氏有無痰不作瘧之論夫痰本人身之津液隨邪之所在而成病之名若指痰爲瘧之本反以瘧爲痰之標則瘧將已也瘧既何所瘧將作也痰發何經痰胡爲而既已其病胡爲而復發其病可見痰之因於瘧非瘧之因於痰更非因痰以致瘧也明矣獨不觀諸經曰瘧者陰陽更勝也陰勝則寒陽勝則熱又曰陽盛則熱陽虛則寒瘧者虛也陰陽既