



藥用植物圖考卷五

東陽王適聲編

木犀科

茉莉

素馨屬栽培作盆景常綠灌木葉對生橢圓形全邊質



厚有短葉柄夏秋之際枝梢開單瓣白花清香襲人是與素馨同種性質亦似之冬月養於溫室否則易致凍死李時珍曰茉莉原出波斯移植於南海其性畏寒不宜中土

弱莖繁枝綠葉團大初夏開小白花重瓣無蓋秋盡乃止不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛

效用 花辛熱無毒時珍云蒸油取液作面脂頭澤長髮潤燥

作迷藥

香肌亦入茗湯。根熱有毒。汪機云。以酒磨一寸。服則昏迷一日。乃醒。二寸二日。三寸三日。凡跌傷骨節。脫臼接骨者。用此則不知痛也。

木犀

天竺桂

木犀屬。栽培於庭園。常綠喬木。高達十數尺。葉對



生。橢圓形而尖。秋月開花。花叢生於葉腋。合瓣花冠。四裂形小。黃赤色。雄蕊二枚。發特殊之芳香。通俗謂之丹桂。黃色桂稱金。白色桂稱銀者。此植物供觀賞之用。

效用。皮辛溫無毒。藏器主治腹

內諸冷。血氣脹痛。李珣云。天竺桂生南海山谷。功用似桂。其皮薄。不甚辛烈。破產後惡血治血痢。腸風。補暖腰脚。與桂心同方。

破產後惡  
血治血痢  
腸風

家少用

連翹

連翹屬栽培於庭園間落葉灌木其莖及枝之上部略



似蔓狀葉對生卵形有鋸齒或為三出之複葉早春先葉開花合瓣花冠呈筒狀四裂深淡黃色雄蕊比花冠裂片之數少雌蕊一枚果實作心臟形此植物供觀賞用

寒熱鼠瘻

瘰癧癰腫

效用

苦平無毒本草經治寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡癰溜結

熱蠱毒

莖葉時珍治心肺積熱翹根甘寒平有小毒本草

經主治下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身耐老

胡椒科

華荻

胡椒屬蘇頌曰今嶺南特有之多生竹林內正月發苗

作叢高三四尺其莖如筋葉有圓如蕺菜闊二三寸如桑面光

而厚三月開花白色在表七

月結子如小指大長約二寸

以來青黑色類椹子而長九

月采取曬乾用南人愛其辛

香或取葉生茹之復有舶上



來者更辛香

效用

味辛大溫無毒藏器主治溫中下氣補腰脚殺腥氣消

食除胃冷陰疝癖

藟醬

土藟屬李時珍曰藟子可以調食故謂之醬乃華荻之


類也孟詵食療本草謂之土華荻其蔓葉名扶留藤一作扶留

破痰積治  
欬逆止氣  
心腹蟲痛

一作浮留其苗謂之蔓葉其花實即鉤子也蘇恭曰鉤醬生巴



蜀中蔓生葉如王瓜而厚大光澤味辛香實似桑椹而皮黑肉白交州愛州人家多種之苗名浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也



效用 根葉子唐本草辛溫無毒主治下氣溫中破痰積李珣治欬逆上氣心腹蟲痛胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味孟詵云散結氣心痛冷痛消穀

野胡椒

樹高丈餘褐幹密葉幹上發小短莖大小葉排生如



心腸冷痛  
破滯氣

簇葉微似橘葉面綠背青灰色皆有細毛捫之滑軟附莖春開

白花結長柄小圓實如椒攢簇  
葉間青時氣已香釀

效用 土人研以治氣痛酒冲

服 唐本草味辛大熱無毒主

治心腹冷痛破滯氣俗用有效

# 胡椒

胡椒屬東印度原產蔓生植物長至一丈餘葉互生長


心臟形花小成長行穗果實球形

其初綠色熟呈紅色此紅色之果

實乾燥後則皮生皺變黑色稱為

黑胡椒又將此黑色果皮除去者

稱為白胡椒以上二者芳香有辛



下氣溫中  
去痰殺一  
切魚蟹毒

治淋疾  
癖

味故其教亦供香平料及藥用

效用

實辛大溫無毒唐本草主治下氣溫中去痰除臟腑中

風冷

大明本草調五臟壯腎氣治冷痢殺一切魚肉蠃蝨毒

華澄茄

胡椒屬原產於東印度等蔓生植物葉長卵形而尖



穗狀花序花後結成漿果如豌豆  
大呈黑褐色此半熟之果實乾燥  
之用治淋疾

效用 實辛溫無毒陳藏器治下

氣消食去皮膚風心腹間氣脹令

人能食療鬼氣能染髮及香身  
并霍亂吐瀉肚腹痛腎氣膀胱冷

大明本草治一切冷氣痰癖

# 胡桃科

藥用植物圖考 卷五



# 胡桃

胡桃屬與山胡桃同種結實熟則割之而現核核形圓



大薄殼者以手碎之取出其仁味甚美晒乾為食果李時珍曰胡桃樹高丈許春初生葉長四五寸微似大青葉兩兩相對頗作惡氣三月開花如栗花穗蒼黃色結實至秋如青桃狀熟時

溫爛皮肉取核為果人多以櫟柳接之

效用 開寶本草味甘平無毒食之令人肥健潤肌膚黑髮取瓤

燒令黑末斷烟和松脂研傳瘰癧瘡多食利小便去五痔搗和

胡粉拔白髮內孔中則生黑髮時珍主補氣養血潤燥化痰

益命門利三焦溫肺潤腸治虛寒咳嗽腰腳重痛心痛疝痛血

癰癰五痔  
補氣益血  
潤肺化痰

痢腸風散腫毒

化香樹

化香樹屬自生於山地落葉喬木莖高丈餘葉互生



羽狀複葉緣有鋸齒開單性花柔荑花序雌雄皆不下垂雄花無花蓋果實為球狀實可染黑色且有香氣燒之可以驅蚊

效用 本草拾遺味辛溫無

毒魚順氣化痰

毒主治鬼氣煮服之并燒為香殺蟲魚  
悉暴鯀海藥本草主治鬼疰心氣斷一切惡氣市醫以為順氣散痰之藥

山胡桃

胡桃屬多生於山野落葉喬木高至二三十尺葉為

藥用植物圖考 卷五

羽狀複葉，小葉九枚至十五枚，長橢圓形，有短柔毛，如星形，其



緣邊有鋸齒，花單性，雌雄同株，雄花  
成柔荑花序，常下垂，果實為核果，含  
一種子，此種子可供食用，又可榨油，  
其材木供器具及建築之用，其皮供  
染料，按嶺南表錄云：山胡桃底平如

檳榔，皮厚而堅，多肉少仁，內殼甚厚，須椎之方破。

效用 同胡桃

### 殼斗科

櫟

一名 櫟

櫟屬，產於山地，常綠喬木，高達三四丈，葉互生，披針  
形，或長橢圓形，有鋸齒，或無之，春夏開白花，單性，雄花排列成  
穗狀花序，雌花與雄花同株，果實為堅果，有碗狀之殼斗，木材甚

止洩痢破  
瘡血貼臍



堅為器具良材

效用 仁苦澀平無毒食之不飢令人  
健行止洩痢破惡血止渴藏皮藥煮  
汁飲藏器止產婦血 吳瑞云嫩葉貼  
臍瘡一日三換良效

櫟一名

櫟屬生於山野中落葉喬木

高達數丈樹皮灰褐色粗而厚縱裂  
甚深葉與栗葉相似披針形嫩枝之  
葉倒卵形長三寸至五寸有尖頭邊  
緣鋸齒尖而長自十至十三新葉表裏  
均有白毛老葉則無之初夏生單性

花於新葉間雌雄同株雄花成穗狀花序常下垂雌花結成堅果

治熱瀉痢  
腸風痔瘡

小而圓如拇指頭大在椀狀之殼斗內樹皮可鞣獸皮或供染料嫩葉及殼斗亦為染料種子供食其葉又可供野蠶之飼料效用實苦微溫無毒主治下痢厚腸胃肥健人糲斗殼澀溫無毒大明本草止腸風崩中帶下冷熱瀉痢并染鬚髮木皮根皮苦平無毒藏器治惡瘡因風犯露致腫者煎汁日洗令膿血盡乃止亦治痢

槲

槲屬山野甚多落葉喬木高至二三丈餘葉大互生長倒



卵形約四五寸緣邊有波狀之鋸齒下面有褐色之毛葉柄短春日隨新葉開花單性雌雄同株其雄花集成穗狀花序而下垂花後結成堅果圓形如拇指



除蓋止血  
治久痢

大有碗狀之殼斗，樹皮含澀質，供藥料及鞣皮料，種子供食用。

或糊用。效。用。仁。苦澀平，無毒。時珍云：蒸煮作粉，澀腸止痢，功同橡子。

木皮苦澀無毒。蘇恭云：煎服除蟲及漏，甚效。漢藥實驗談。

作收斂藥，多作外用。如肌肉紅腫，搗爛外敷。又如患膿瘡等症。

將此藥浸水洗之，其功能止血，治久痢症。

栗。栗屬，生於山地，產區頗廣。落葉喬木，莖高四五丈，葉互生。



披針形，有鋸齒，與櫟之葉相酷似。夏月開花，單性而小。雌雄同株。雄花長穗狀花序，雌花常三花集生，包以總苞。果實為堅果，有二三枚，在囊狀之殼斗內。其



出爾爾傳  
瘰癧及骨  
鯢在咽

全面被刺，成熟後則裂開，散出果實，其大小因種類而不一，種子供食用。

效用 實味鹹溫無毒，別錄主治益氣厚腸胃，補腎氣，令人耐

飢。栗楔一紐三顆其中大明本草云：活血尤效，每日生食七

枚，破冷瘰癧，又生嚼，置惡刺，出箭頭，傳瘰癧腫毒痛。栗內薄

皮治骨鯢在咽，燒存性研末，吹入咽中，即下。

栗之黑殼反胃，消渴者，汁飲之。

柯樹 柯樹屬，暖地甚多，常綠

喬木，高至三四十尺餘，葉長橢

圓形，而厚，有粗鋸齒，其下面灰

褐色，夏月開單性花，雌雄同株，

雄花有花被，其所成穗狀花序，

稍向上面，雌花結成堅果，橢圓



用 築器具及薪炭之料、或用以培養香蕈、樹皮為染料、種子供食

效用 白皮、辛平、有小毒、藏器主治大腹水病、采皮煮汁、去滓、煎令可丸、梧子大、平旦空心飲下三丸、須臾又一丸、氣水並從小便出也。

### 楊柳科

柳 楊柳屬、自生於溪岸、或栽培於庭園、落葉喬木、高至三四十尺、枝細長而下垂、葉互生、披針形、如線狀、有鋸齒、春日先葉開花、花單性、排成穗狀花序、雌雄異株、雄花有二雄蕊、雌花子房有柄甚短、其絮飛散如雪、木材供器具及薪料。

效用 柳絮、苦寒、無毒、本草經主治風水黃疸、面熱黑、柳實

風水苦痘  
瘰癧淋疾



治潰癰、逐膿血。枝及根白皮。  
蘇恭主：治瘰癧、熱淋疾，可為浴湯。  
洗風腫、瘰癧，煮酒漱齒痛。  
白楊：白楊屬，生於山野，落葉喬木，高至數十尺，樹皮暗灰色，初平滑，後生裂紋，葉互生，卵形，或長橢圓形而尖，緣邊有鋸齒。春月開單性花，雌雄異株，悉排為穗狀花序，雄花穗長二寸五六分，雌花穗長一寸五六分，花後成熟至六七寸，果實着生於花軸上，疎而不密，熟則四裂，散